

АРОМАТА / AROMATA

Impala x BRU 93 136

- Отлична устойчивост на картофени цистообразуващи нематоди
- Средно ранен сорт, с жълта месеста част и многофункционален
- Ниски изисквания към азотно торен



СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики

Цвят на кожата	Жълт
Цвят сърцевина	Жълт
Качество за пържене	Добро
Форма на клубените	Овална
Клубени на растение	10 - 12
Зрялост	Средно ранен
Период на покой	Дълъг
Семенни плодове	Малко
Тип за готвене	АВ
Средна дължина клубени	88
Възможност за измиване	Добра
Подводно тегло	345 - 385
Съдържание на суха маса	19 - 21%

Чувствителност

Натъртване	Слабо чувствителен
Механични повреди	Слабо чувствителен
Пукнатини при растеж	Чувствителен
Вторичен растеж	Слабо чувствителен
Сенкор (Метрибузин)	Слабо чувствителен
Суша	Доста чувствителен
Кухи сърцевини	Слабо чувствителен

Устойчивост

Y-вирус	Възприемчив
Yntn вирус	Възприемчив
Спрейнг	Слабо възприемчив
Мана по клубените	Слабо възприемчив
Мана по листата	Доста възприемчив
Фузариум	Слабо възприемчив
Обикновена краста	Слабо възприемчив
Рак по картофите F1	Устойчив / 10
Рак по картофите F2	- / -
Рак по картофите F6	Устойчив / 9
Рак по картофите F18	- / -
KЦН Ro1	Устойчив / 9
KЦН Ro2/3	Устойчив / 9
KЦН Pa2	Устойчив / 9
KЦН Pa3	Устойчив / 8
Сребриста краста	Доста възприемчив
Ранен пригор	- / -
Листно завиване	- / -

АРОМАТА / AROMATA

Impala x BRU 93 136

- Отлична устойчивост на картофени цистообразуващи нематоди
- Средно ранен сорт, с жълта месеста част и многофункционален
- Ниски изисквания към азотно торен



СЪВЕТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ КАРТОФИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

При следване на съветите за отглеждане вземете в предвид местните условия като тип почва и климат.

Предварителна обработка и засаждане

Съхранявайте семенните картофи с механична охладителна система, за да предотвратите физиологично стареене. Аклиматизирайте преди засаждане.

Почвена температура от поне 10°C е от съществено значение за успешно начало.

Приложете третиране срещу Ризоктония, Сребриста краста и Черни петна по време на засаждане.

Засадете на повърхностното ниво.

Разстояния при засаждане

Размер 30/35 мм	разстояние на засаждане около 20 см × 75 см, около 1,425 кг/ха (67,000 растения/ха)
Размер 35/50 мм	разстояние на засаждане около 27 см × 75 см, около 2,850 кг/ха (49,000 растения/ха)
Размер 50/55 мм	разстояние на засаждане около 30 см × 75 см, около 4,700 кг/ха (44,000 растения/ха)

Торене

- N AROMATA изисква приблизително 125-150 кг/ха (включително почвените запаси). Използвайте бавно освобождаваща се форма на азот: 2/3 преди засаждане и 1/3 на няколко пъти след формиране на клубените.
- P Стандартни местни препоръки.
- K Агрия изисква приблизително 250 кг/ха нискохлорен калий.
- Прилагайте Mg, Mn, Ca и B като листни торове.

Прибиране на реколтата

- Започнете унищожаването на стъблата преди кожицата да потъмнее.
- Започнете прибирането на реколтата най-малко три седмици след унищожаване на стъблата.

Съхранение

- Колебанията в температурата, комбинирани с конденз, могат да доведат до ранно покълване и увеличават риска от сребриста краста.
- Започнете зарастването на раните при 14°C.