

ЖЕРОНА / GERONA

Belana x Gala

- Голям брой клубени
- Висок потенциал за добив
- Подходящ за промишлено белене и производство на малки картошки



СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики

Цвят на кожата	Жълт
Цвят сърцевина	Жълт
Качество за пържене	Средно
Форма на клубените	Кръгло-овална
Клубени на растение	20 - 30
Зрялост	Основен сезон
Период на покой	Среден
Семенни плодове	Малко
Тип за готвене	AB
Средна дължина клубени	56
Възможност за измиване	Средна до добра
Подводно тегло	325 - 365
Съдържание на суха маса	18 - 20%

Чувствителност

Натъртване	Слабо чувствителен
Механични повреди	Слабо чувствителен
Пукнатини при растеж	Слабо чувствителен
Вторичен растеж	Слабо чувствителен
Сенкор (Метрибузин)	Слабо чувствителен
Суша	Слабо чувствителен
Кухи сърцевини	Слабо чувствителен

Устойчивост

Y-вирус	Доста възприемчив
Yntn вирус	Доста възприемчив
Спрейнг	Слабо възприемчив
Мана по клубените	Слабо възприемчив
Мана по листата	Доста възприемчив
Фузариум	Доста възприемчив
Обикновена краста	Слабо възприемчив
Рак по картофите F1	Устойчив / 10
Рак по картофите F2	- / -
Рак по картофите F6	Устойчив / 8
Рак по картофите F18	- / -
KЦН Ro1	Устойчив / 9
KЦН Ro2/3	- / -
KЦН Pa2	- / -
KЦН Pa3	- / -
Сребриста краста	Слабо възприемчив
Ранен пригор	Слабо възприемчив
Листно завиване	Слабо възприемчив

ДЖЕРОНА / GERONA

Belana x Gala

- Голям брой клубени
- Висок потенциал за добив
- Подходящ за промишлено белене и производство на малки картофи



СЪВЕТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ КАРТОФИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

При следване на съветите за отглеждане вземете в предвид местните условия като тип почва и климат.

Предварителна обработка и засаждане

Съхранявайте семенните картофи с механична охладителна система, за да предотвратите физиологично стареене. Аклиматизирайте преди засаждане.

Почвена температура от поне 10°C е от съществено значение за успешно начало.

Приложете третиране срещу Ризоктония, Сребриста краста и Черни петна по време на засаждане.

Засадете на повърхностното ниво.

Разстояния при засаждане

Размер 30/40 мм	Разстояние 18 см × 75 см (около 80,000 растения/ха, 2,300 кг/ха)
Размер 40/50 мм	Разстояние 22 см × 75 см (около 67,000 растения/ха, 4,100 кг/ха)
Размер 50/55 мм	Разстояние 24 см × 75 см (около 53,000 растения/ха, 5,300 кг/ха)

Торене

N Приблизително 225 кг/ха, разделено 2/3 преди засаждане и 1/3 след образуване на клубените.

P Стандартни местни препоръки.

K 350 кг/ха, разделено на три етапа: 200 кг през пролетта, 75 кг по време на формиране и 75 кг месец след това.

- Прилагайте Mg, Mn, Ca и B като листови торове.

Прибиране на реколтата

- Започнете да унищожаването на стеблата, когато се достигне желания размер и качество на кожицата.
- Започнете прибирането на реколтата най-малко три седмици след унищожаване на стеблата и се уверете, че клубените са готови за прибиране.

Съхранение

- Използвайте Talent (S-Карвон) по време на съхранение, за да подобрите броя и разпределението на клубените.
- Препоръчва се температура от поне 14°C по време на зарастване на раните. След това постепенно намалете температурата на съхранение до минимум 6°C.