


АГРИЯ

Quarta x Semlo

- Подходящ за пържени картофи
- Сравнително устойчив на Y-вирус
- Почти без обезцветяване



СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики

Цвят на кожата	Жълт
Цвят сърцевина	Жълт
Качество за пържене	Отлично
Форма на клубените	Овално-продълговата
Клубени на растение	8 - 9
Зрялост	Късна
Период на покой	Дълъг
Семенни плодове	Многобройни
Тип за готвене	ВС
Средна дължина клубени	107
Възможност за измиване	Доста добра
Подводно тегло	390 - 410
Съдържание на суха маса	21 - 22 %

Чувствителност

Натъртване	Слабо чувствителен
Механични повреди	Чувствителен
Пукнатини при растеж	Слабо чувствителен
Вторичен растеж	Слабо чувствителен
Сенкор (Метрибузин)	Слабо чувствителен
Суша	Слабо чувствителен
Кухи сърцевини	Доста чувствителен

Устойчивост

Y-вирус	Слабо възприемчив
Yntn вирус	Слабо възприемчив
Спрейнг	Слабо възприемчив
Мана по клубените	Слабо възприемчив
Мана по листата	Възприемчив
Фузариум	Слабо възприемчив
Обикновена краста	Възприемчив
Рак по картофите F1	Устойчив / 9
Рак по картофите F2	- / -
Рак по картофите F6	Неустойчив / 6
Рак по картофите F18	- / -
КЦН Ro1	Устойчив / 9
КЦН Ro2/3	- / -
КЦН Pa2	Възприемчив / 2
КЦН Pa3	Възприемчив / 2
Сребриста краста	Възприемчив
Ранен пригор	- / -
Листно завиване	- / -

АГРИЯ

Quarta x Semlo

- Подходящ за пържени картофи
- Сравнително устойчив на Y-вирус
- Почти без обезцветяване



СЪВЕТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ КАРТОФИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

При следване на съветите за отглеждане вземете в предвид местните условия като тип почва и климат.

Предварителна обработка и засаждане

Съхранявайте семенните картофи с помощта на механична охладителна система, за да предотвратите физиологично стареене.

Аклиматизирайте преди засаждане.

Почвена температура от поне 10°C е от съществено значение за успешно начало.

Приложете третиране срещу Ризоктония, Сребриста краста и Черни петна по време на засаждане

Засадете 2 см под повърхностното ниво

Разстояния при засаждане

Размер 28/35 мм	разстояние на засаждане около 24 см × 75 см около 1.600 кг/ха (60.000 растения/ха)
Размер 35/50 мм	разстояние на засаждане около 28 см × 75 см около 3.100 кг/ха (47.000 растения/ха)
Размер 50/55 мм	разстояние на засаждане около 33 см × 75 см около 4.600 кг/ха (44.000 растения/ха)

Торене

N Агрия изисква приблизително 200 кг/ха (включително почвени запаси).
Внесете 2/3 преди засаждане и 1/3 по време на клубенообразуване.

P Стандартни местни препоръки.

K Агрия изисква приблизително 250 кг/ха нискохлорен калий.

- Прилагайте Mg, Mn, Ca и B като листни торове.

Прибиране на реколтата

- Започнете прибирането на реколтата най-малко три седмици след унищожаване на стъблата.
- Агрия е чувствителна към натъртване, причинено от механични повреди.

Съхранение

- Поради дългия си период на покой, Агрия може да се съхранява за дълги периоди.
- Препоръчва се температура от поне 14°C по време на зарастване на нараняванията.
- След това постепенно намалете температурата на съхранение до минимум 7 - 8°C