

АЛЕКСИЯ / ALEXIA

ВН 93 30 x Bildtstar

- Висок потенциал за добив
- Хомогенно разпределение на размера
- Отлична измиваемост



СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики

Цвят на кожата	Светложълт
Цвят сърцевина	Жълт
Качество за пържене	Прилично
Форма на клубените	Овално-кръгла
Клубени на растение	12-14
Зрялост	Ранна
Период на покой	Дълъг
Семенни плодове	Малко
Тип за готвене	АВ
Средна дължина клубени	86
Възможност за измиване	Добра
Подводно тегло	364
Съдържание на суха маса	19,5%

Чувствителност

Натъртване	Чувствителен
Механични повреди	Слабо чувствителен
Пукнатини при растеж	Слабо чувствителен
Вторичен растеж	Слабо чувствителен
Сенкор (Метрибузин)	Слабо чувствителен
Суша	Чувствителен
Кухи сърцевини	Слабо чувствителен
Ризоктония	Слабо чувствителен


Устойчивост

Y-вирус	Възприемчив
Yntn вирус	Възприемчив
Спрейнг	Слабо възприемчив
Мана по клубените	Слабо възприемчив
Мана по листата	Възприемчив
Фузариум	Възприемчив
Обикновена краста	Слабо възприемчив
Рак по картофите F1	Устойчив / 10
Рак по картофите F2	- / -
Рак по картофите F6	- / -
Рак по картофите F18	- / -
КЦН Ro1	Устойчив / 9
КЦН Ro2/3	- / -
КЦН Pa2	- / -
КЦН Pa3	- / -
Сребриста краста	Слабо възприемчив
Ранен пригор	Слабо възприемчив
Листно завиване	- / -

АЛЕКСИЯ / ALEXIA

ВН 93 30 x Bildtstar

- Висок потенциал за добив
- Хомогенно разпределение на размера
- Отлична измиваемост



СЪВЕТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ КАРТОФИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

При следване на съветите за отглеждане вземете в предвид местните условия като тип почва и климат.

Предварителна обработка и засаждане

Аклиматизирайте преди засаждане. Не засявайте директно от хладилно съхранение

Почвена температура от поне 12°C е от съществено значение за успешно начало

Приложете третиране срещу Ризоктония, Сребриста краста и Черни петна по време на засаждане

Засаждайте на нивото на повърхността

Разстояния при засаждане

Размер 30/40 мм	разстояние пригл. 16 см × 75 см пригл. 3.600 кг/ха (83.000 растения/ха)
Размер 40/50 мм	разстояние пригл. 18 см × 75 см пригл. 6.600 кг/ха (74.000 растения/ха)
Размер 50/55 мм	разстояние пригл. 20 см × 75 см пригл. 9.800 кг/ха (67.000 растения/ха)

Торене

N Alexia изисква приблизително 80 кг/ха (включително почвените запаси)

P Стандартни местни препоръки.

K Приложете 150 кг/ха еднократно преди засаждане.

- Приложете Mg, Mn, Ca и Bo като листни торове

Прибиране на реколтата

- Започнете прибирането на реколтата най-малко три седмици след унищожаване на стъблата.
- Агрис е чувствителна към натъртване, причинено от механични повреди.

Съхранение

- Започнете зарастването на раните при 14°C.
- След това постепенно намалете температурата на съхранение до минимум 6°C