

Logiske udsagn

Kristoffer Klokke

2021

Contents

1	Logiske udsagn	7
2	Logiske operatore - 1/9/2021	7
2.1	Logiske tabeller	7
2.2	Implimentation	8
2.3	Bi implikation	9
2.4	Exclusive or / XOR	9
2.5	Ydeligere ækvivalenser	9
2.5.1	De Morgan's law	10
2.5.2	Distributive law (mulitply into a parenthese)	10
2.5.3	Conditionaldisjunction equivalence	10
2.5.4	Further equivalences	11
2.5.5	Applying equivalences	11
2.6	Logic gates	12
2.7	Tal grupperinger	12
2.8	Kvantorer	12
2.8.1	De Morgans love for kvantorer	13
2.8.2	Indlejrede kvantorer	13
3	Bevismetoder	13
3.1	Direkte bevis	14
3.2	Kontrapositionsbevis	14
3.3	mod stidsbevis	14
3.4	Ikke konstruktiv eksistensbevis	15
3.5	Induktions bevis	15
3.6	Stærkt induktion	15
3.7	Strukturel induktion	16
3.7.1	Eksempel	16
4	Mængder	17
4.1	Mængde-bygger-notation	17
4.2	Delmængde	18
4.3	Kardinalitet	18
4.4	Potensmængde	18
4.5	Karteisisk produkt	18
4.6	Intervaller	19
4.7	Foreningsmængde	19
4.8	Fællesmængde	19
4.9	Fraregnet	20

4.10	Komplementet	20
4.11	Disjunkte	20
4.12	Mængde love	20
4.12.1	De Morgans love	21
4.13	Ydeligere notation	22
5	Funktion	22
5.1	Injektive funktioner	22
5.2	Surjektiv	22
5.3	Bijektiv	22
5.4	Invers funktion	23
5.5	Operationer på funktioner	23
5.6	Sammensat funktion	23
5.7	Monotoniforhold	23
5.8	Tællelige mængder	23
5.9	Overtællelige mængder	23
6	Relationer	24
6.1	Matriar	24
6.2	Orienterede grafer	24
6.3	Egenskaber	25
6.3.1	Refleksiv	25
6.3.2	Symmetrisk	25
6.3.3	Anti-symmetrisk	25
6.3.4	Transitiv	26
6.4	Kombination af relationer	26
6.5	Lukninger	27
6.6	Refleksive lukninger	27
6.7	Symmetriske lukninger	27
6.8	Transitiv lukning	27
7	Ækvivalensrelationer	27
7.1	Partitionær	28
7.1.1	$aRb \rightarrow [a]_R = [b]_R$	28
7.1.2	$[a]_R = [b]_R \rightarrow [a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$	28
7.1.3	$[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset \rightarrow aRb$	28
7.2	Ækvivalensklasserne dækker hele A	29
8	Partiel ordning	29
8.1	Hassediagrammer	30
8.2	Total ordning	30

8.3	Leksikografisk ordning	31
8.4	Binært træ	31
8.4.1	Bevis for højde på binært træ	32
9	Tal teori	32
9.1	Delelighed	32
9.1.1	Bevis $a b \wedge a c \iff a (b+c)$	33
9.1.2	Bevis for division i af delelighed	33
9.2	Kongruence	33
9.2.1	$\exists k \in \mathbb{Z} : a = b + km \iff a \equiv b \pmod{m}$	34
9.2.2	Bevis for modulo ind i parentes	34
9.2.3	Bevis for division ved kongruencer	34
9.3	Linære kongruenser	34
9.4	Primtal	35
9.4.1	greatest common divider	35
9.4.2	Least common multiplum	35
9.5	Euklids Algoritme	35
9.5.1	Bevis	36
9.6	gcd(a,b) på linearkombination	36
9.7	Kinessisk Restklasse	37
9.7.1	Eksempel	38
9.7.2	Bevis	39
9.8	Fermats lille sætning	40
9.8.1	Eksempel	40
10	Matricer	40
10.1	Addition	40
10.2	Multiplikation	41
10.3	Neutrale matrice	41
10.4	Identitets matricen	41
10.5	Transponering	41
10.6	Symmetriske matricer	42
10.7	Binær matricer	42
10.8	Boolsk produkt	42
10.9	Matricers grafiske repræsentation	43
11	Grafer	43
11.1	Terminologi	43
11.1.1	Ikke orientede grafer	44
11.1.2	Orientede grafer	45
11.2	Matching	45

11.3	Grafklasser	45
11.3.1	Komplette grafer	45
11.3.2	kredse	46
11.3.3	Hjul	46
11.3.4	Hypercubes	47
11.3.5	Todelte grafer	47
11.3.6	Komplette todelte grafer	47
11.4	Repræsentation af grafer	48
11.4.1	Adjacenslister	48
11.5	Isomorfi	48
11.6	Graf stier og kredse	48
11.7	Graf sammenhænge	49
11.8	Træer	49
11.8.1	Bevis G er et træ $\iff \forall u, v \in V : \exists!$ sti mellem u og v	49
11.8.2	Et træ med n knuder har altid $n - 1$ kanter	50
12	Følger	50
12.1	Geometrisk følge	50
12.2	Aritmetisk følge	50
12.3	Mandelbrot-fraktalen	50
12.3.1	i tilhøre Mandelbrot mængden	51
13	Rækker	51
13.1	Eksempel $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$	51
13.2	Summation af rækker	52
13.3	Geometriske række	52
13.4	Aritmetisk række	53
13.4.1	Eksempel $1 + 3 + 5 + \dots + 2k - 1$	53
13.5	Rækker i loops	53
13.6	Notation	54
13.7	Uendelige rækker	54
14	Følger og konvergens	55
14.1	Notation	55
14.2	Konvergens	55
14.3	Konvergen kriterier	56
14.3.1	Sammenlignings-kriteriet	56
14.3.2	Grænse-sammenlignings-kriteriet	56
14.3.3	Kvotient-kriteriet	57
14.3.4	Konvergens kriterier for ultimative positive rækker	57
14.3.5	Harmoniske rækker / divigerns & konvergens test	57

14.4	Divergens	58
14.5	p-rækker	58
14.5.1	bevis	58
14.6	Regneregler for grænseværdi	59
14.6.1	Bevis	59
14.6.2	Bevis	60

1 Logiske udsagn

Proposition - is a declarative sentence, either true or false.

Senital variables - variables presenting propositions, most used letters: p, q, r, s

True propositions are denoted T and false are denoted F

Atomic propositions - the most simple version of a proposition

2 Logiske operatore - 1/9/2021

Tegn — navn — betydning

\neg — negation — Invers

\wedge — conjunction — Og

\vee — disjunction — Eller

\rightarrow — conditional — Implementere

\iff — biimplimentation — To ens udtryk

\oplus Exclusive or / XOR — sand ved én sand

Præcedens hieraki: $\neg \wedge \vee \rightarrow \iff$

\oplus har ikke en specifik plads og derfor skal altid have parentes.

2.1 Logiske tabeller

Logiske tabeller kan bruges, til at overskueligegøre logiske udtryk.

De kan også være til gavn for at ækvivalenser.

P	$\neg P$
S	F
F	S

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
S	S	S	S
S	F	F	S
F	S	F	S
F	F	F	F

2.2 Implimentation

$$P \rightarrow Q$$

P hypotense/antagelse

Q konklusion

eks. $x > 0 \rightarrow 2x \geq x$

$$x = 1 \rightarrow ss$$

$$x = 0 \rightarrow fs$$

$$x = -1 \rightarrow ff$$

I alle tre tilfælde er implikationen sand.

P	Q	$P \rightarrow Q$
S	S	S
S	F	F
F	S	S
F	F	S

For the proposition $p \rightarrow q$ are the following:

converse: $q \rightarrow p$

Contrapositive: $\neg q \rightarrow \neg p$

Inverse: $\neg p \rightarrow \neg q$

example:

The home team wins whenever it is raining.

p = if it is raining

q = then then home team wins

converse: If the home team wins, then it is raining

contrapositive: If the home team does not win, then it is not raining.

inverse: If it is not raining, then the home team does not win.

eksempler på implikation.

b: Du har købt en billet

t: Du kan tage toget

$$b \rightarrow t$$

$$\neg t \rightarrow \neg b$$

Som det kan ses i tabellen ses det at

$$P \rightarrow Q \equiv \neg P \rightarrow \neg Q$$

Altså implikationen er ækvivalent til den negeriske implikation.

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg Q$	$\neg P$	$\neg Q \rightarrow \neg P$
S	S	S	F	F	S
S	F	F	S	F	F
F	S	S	F	S	S
F	F	S	S	S	S

2.3 Bi implikation

$$p \iff q$$

p og q har samme sandhedsværdi

Bliver kaldt hviss/iff

P	Q	$P \iff Q$
S	S	S
S	F	F
F	S	F
F	F	S

$$P \iff Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

2.4 Exclusive or / XOR

$$P \oplus Q$$

P og Q har forskellge sandhedsværdier

P	Q	$P \oplus Q$
S	S	F
S	F	S
F	S	S
F	F	F

2.5 Ydeligere ækvivalenser

Compound proposition - a collection of logic operators

Tautology - an always true compound $p \vee \neg p$

Contradiction - an always false compound $p \wedge \neg p$

Contingency - neither a tautology or contradiction

$$P \oplus Q \equiv \neg(P \iff Q)$$

2.5.1 De Morgan's law

$$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$$

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
S	S	S	F	F	F	F
S	F	S	F	F	S	F
F	S	S	F	S	F	F
F	F	F	S	S	S	S

2.5.2 Distributive law (multiply into a parenthese)

$$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$	$P \vee Q$	$P \vee R$	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	F	F	S	S	S	S
S	F	S	F	S	S	S	S
S	F	F	F	S	S	S	S
F	S	S	S	S	S	S	S
F	S	F	F	F	S	F	F
F	F	S	F	F	F	S	F
F	F	F	F	F	F	F	F

2.5.3 Conditional disjunction equivalence

$$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg P$	$\neg P \vee Q$
S	S	S	F	S
S	F	F	F	F
F	S	S	S	S
F	F	S	S	S

2.5.4 Further equivalences

TABLE 7 Logical Equivalences Involving Conditional Statements.	TABLE 8 Logical Equivalences Involving Biconditional Statements.
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$
$p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
$p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$	$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$
$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$	
$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$	
$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$	
$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$	
$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$	

Figure 1: Equivalences of conditional and biconditional statements

2.5.5 Applying equivalences

By applying equivalences it is possible to show $\neg(P \vee (\neg P \wedge Q)) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

$$\begin{aligned}
 \neg(P \vee (\neg P \wedge Q)) &\equiv \neg P \wedge \neg(\neg P \wedge Q) && \text{second De Morgan law} \\
 &\equiv \neg p \wedge \neg(\neg P) \vee \neg Q && \text{first De Morgan Law} \\
 &\equiv \neg P \wedge (P \wedge \neg Q) && \text{double negation law} \\
 &\equiv (\neg P \wedge P) \vee (\neg P \vee \neg Q) && \text{second distributive law} \\
 &\equiv F \vee (\neg P \vee \neg Q) \\
 &\equiv \neg P \wedge \neg Q
 \end{aligned}$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q)$$

$$\begin{aligned}
 \neg(P \rightarrow Q) &\equiv \neg(\neg P \vee Q) && P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \\
 &\equiv \neg(\neg P) \wedge \neg Q && \text{ifølge De Morgan} \\
 &\equiv P \wedge \neg Q && \neg(\neg P) \equiv P
 \end{aligned}$$

2.6 Logic gates

The following is translations of logic operators to gates




Figure 2: Gates and logical operations

2.7 Tal grupperinger

\mathbb{Z} heltal $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$

\mathbb{Z}^+ Positive heltal $1, 2, 3, \dots$

\mathbb{Z}^- Negative heltal $-1, -2, -3, \dots$

\mathbb{N} Naturlige tal $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ - 0 er ikke altid inkluderet

\mathbb{Q} Rationale tal $\frac{m}{n} | m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}^+$ \mathbb{R} Reelle tal

2.8 Kvantorer

Åbent udsagn - ukendt variable

Har altid den højeste precedens og tages altid først.

$P(x) : 2x > x$

Ukendt variable - fri variabel

Herfra fungere det som funktion

$p(-2) : 2 \cdot (-2) > -2$ - F

\forall alkvaritor/universal quantifier - for alle
eks.

$\forall x \in \mathbb{Z}^+ : 2x > x$ - S

Alle positive heltal vil være sandt.

Ydelgiere notations eksempel:

$\forall x \in \mathbb{Z} : (x \leq 5 \rightarrow 2x > x + 4)$

\exists Eksistenskvantor/Existential quantifier

Påkræver kun at der eksistere et x i intervallet som opfylder udsagnet.

$\exists x \in \mathbb{Z}, x \leq 10 : Q(x)$

$\exists x \in \mathbb{Z} : (x \leq 10 \wedge Q(x))$

$\exists!$ Eksistere kun 1 variable værdi som passer, mere gør den falsk

$\neg \forall x \in s : P(x) \equiv \exists x \in S : \neg P(x)$

$$\neg \forall x \in \mathbb{Z} : 2x > x \iff \exists x \in \mathbb{Z} : 2x \leq x$$

$$\nexists \equiv \neg \exists$$

2.8.1 De Morgans love for kvantorer

$$\neg \forall x : P(x) \equiv \neg \exists x : \neg P(x)$$

$$\neg \exists x : P(x) \equiv \forall x : \neg P(x)$$

$$\neg \exists x, y : (x \neq y \wedge P(x) \wedge P(y))$$

Eksempel:

$$\neg \forall x \in \mathbb{Z} : (x < 4 \vee x > 4)$$

$$\exists x \in \mathbb{Z} : \neg(x < 4 \vee x > 4)$$

$$: (\neg(x < 4) \wedge \neg(x > 4))$$

$$: (x \geq 4 \wedge x \leq 4)$$

$$: x = 4$$

$$\neg \forall \equiv \exists$$

$$\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)$$

negering af operator

Simplificering af udtrykket

2.8.2 Indlejrede kvantorer

Eksempel:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : x + y = 0 \text{ — Sandt } (x = -y)$$

For alle x findes 1 y som vil resultere i additionen giver 0

Rækkefølgen er vigtig for forskellige kvantorer, ved ens kvantorer er rækkefølgen ikke vigtig.

$$\forall y \in \mathbb{Z} : \forall x \in \mathbb{Z} \equiv \forall x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z}$$

I samme univers kan det også forkortes.

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}$$

Eksempel på én negering af indlejrede kvantorer

$$\neg \exists x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z} : x > y$$

$$\forall x \in \mathbb{Z} : \neg \forall y \in \mathbb{Z} : x > y$$

$$\forall x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : \neg(x > y)$$

$$\forall x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : x \geq y$$

3 Bevismetoder

Beviser typer

- Direkte bevis - Klassisk udledningsbevis

- Kontra positionsbevis - Bevis det mod satte
- mod stidsbevis - Starte med den mod satte antagelse og finde en mod strid

3.1 Direkte bevis

Eksempel på direkte bevis

$$\text{lige tal} = \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k \quad (1)$$

$$\text{ulige tal} = \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k + 1 \quad (2)$$

$$\exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k + 1 \quad (3)$$

$$: n^2 = 4k^2 + 1 + 4k \quad (4)$$

$$: n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1 \quad (5)$$

$$n^2 = \text{ulige} \quad (6)$$

Det kan konkluderes ud fra (5) at det i parentesen kan beskrive alt i domænet \mathbb{Z} og dermed fåes definitionen på ulige tal. Dermed bliver det her bevist $n \text{ ulige} \rightarrow n^2 \text{ ulige}$.

3.2 Kontrapositionsbevis

Eksempel som efterfølger sidste bevis For at kunne bevis at $n^2 \text{ ulige} \iff n \text{ ulige}$ skal følgende også kunne siges $n^2 \text{ ulige} \rightarrow n \text{ ulige}$

$$\exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k \quad (1)$$

$$: n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2 \quad (2)$$

$$n^2 = \text{lige} \quad (3)$$

Der tages her udgangspunkt i de lige tal n hvorfra det kan omskrives til, at n^2 er lige

Med dette udgangspunkt vil det betyde det kun kan passe at $n^2 \text{ ulige} \iff n \text{ ulige}$

3.3 mod stidsbevis

Eksempel

For enhver retvinklet trekant gælder $c < a + b$

Bevis: Antag til mod stad, at der eksisterer en trekant med $\geq a + b$

$$\begin{aligned}c &\geq a + b \\c^2 &\geq (a + b)^2 \\c^2 &\geq a^2 + b^2 + 2ab\end{aligned}$$

Det kan her ses at mod striden er forkert da den er i mod strid med Pythagoras sætning.

3.4 Ikke konstruktiv eksistensbevis

Eksempel

For en funktion $f(x) = x^4 - x^2 - 1$ vides det at når x er 0 er y -1 og ved x er 2 er y 11 og da den er kontinuert vil der være et nul punkt imellem.

3.5 Induktions bevis

Bevis $P(n)$ for alle $n \geq m$

Basis: $n_0 \geq m_0$

Induktionsskridt: Bevis at $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ for alle $k \geq m$

Induktionsantagelse: $P(k)$

3.6 Stærkt induktion

Basis: $P(m), P(m + 1), \dots, P(m + l), l \geq 0$

Induktionsskridt: $P(m) \wedge P(m + 1) \wedge \dots \wedge P(k) \rightarrow P(k + 1)$, for alle $k \geq m + l$

Eks.

Bevis $f_n > \phi^{n-2}, n \geq 3$

$$\phi^2 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{1+5+2\sqrt{5}}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = 1 + \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$\phi \approx 1.618$$

$$\phi^2 = 1 + \phi$$

$$\text{Basis : } f_3 = 2$$

$$\phi^{3-2} = \phi < f_3$$

$$f_4 = 3$$

$$\phi^{4-2} = 1 + \phi < f_4$$

Induktionsantagelse

$$f_{k-1} > \phi^{k-3} \text{ og } f_k > \phi^{k-2}$$

Induktionsskridt $k \geq 4$

$$\begin{aligned} f_{k+1} &= f_k + f_{k-1} \\ &> \phi^{k-2} + \phi^{k-3} \\ &= \phi^{k-5}(\phi + 1) \\ &= \phi^{k-3} \cdot \phi^2 \\ &= \phi^{k-1} \end{aligned}$$

3.7 Strukturel induktion

Induktion baseret på rekursion.

3.7.1 Eksempel

Bevis for at $S_n = S_{n-1} \cup \{x + y | x, y \in S_{n-1}\}$, $n \geq 2$ hvor mængden er kaldet S er lig med mængden $A = \{3n | n \in \mathbb{Z}^+\}$

Bevis med simpel induktion at $A \subseteq S$:

$$\text{Basis: } 3 \cdot 1 \in S_1 \subseteq S$$

$$\text{Ind. ant: } 3k \in s, \text{ for et } k \geq 1$$

Ind. skridt: For $k \geq 1$ gælder

$$3(k+1) = 3k + 3$$

$$3(k+1) \in S$$

begge i S

Ifølge rek. skridt

Dermed er alle multiple i S dermed skal det blot vises at $S \subseteq A$ med strukturel induktion.

Basis: $S_1 \subseteq A$

Ind. ant: $S_k \subseteq A$

Ind. skridt: For $S_k \subseteq A \rightarrow S_{k+1} \subseteq A$:

$$S \in S_{k+1} - S_k$$

$$S = x + y, x, y \in S_k \quad \text{ifølge rek. skridt}$$

$$S = 3a + 3b, a, b \in \mathbb{Z}^+ \quad \text{ifølge ind. ant.}$$

$$S = 3(a + b), a + b \in \mathbb{Z}^+$$

$$S \in A$$

4 Mængder

En mængde/set er en uordnet samling af forskellige objekter kaldet elementer

$$A = \{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\} = \{3, 1, 1, 2, 3\}$$

$$2 \in A - True$$

$$B = \{1, \{2, 4\}, a\}$$

$$\{2, 4\} \in B - True$$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

4.1 Mængde-bygger-notation

$$L = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$$

$$= \{2n | n \in \mathbb{N}\}$$

$$= \{n | \exists k \in \mathbb{N} : n = 2k\}$$

$$= \{n \in \mathbb{N} | n/2 \in \mathbb{N}\}$$

$|$ = "hvorom der gælder"

$$\emptyset = \{\}$$

4.2 Delmængde

Delmængde $A \subset B$ $A = \{1, 2\}$ $B = \{1, 2, 3, 4\}$

\subseteq bruges hvis mængderne også må være lig hinanden. En ægte delmængde er en delmængde som ikke er lig med.

$$\subset \iff A \subseteq B \wedge A \neq B$$

$$\emptyset \subseteq A$$

$$\forall x \in \emptyset : x \in A$$

$$\forall x \in U : x \in \emptyset \rightarrow x \in A$$

4.3 Kardinalitet

Kardinaliteten er mængden af unikke elementer i en liste

$$|\{2, 2, 4, 6, 4\}| = 3$$

4.4 Potensmængde

Potensmængden er alle mængder som er delmængder eller lig med mængden.

$$C = \{1, 2\}$$

$$P(C) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

Potenslængden på mængden med i elementer vil være 2^i

4.5 Karteisisk produkt

To mængders kartesiske produkt er en mængde bestående af 2 elementer fra hver mængde. Længden på 2 elementer kaldes også 2-tupler

Ikke kommutativ ($A \times B \neq B \times A$)

$$A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}$$

$$A \times B = \{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Kardinaliteten af et kartesisk produkt er kardinaliteten af de to mængder multipliceret sammen.

4.6 Intervaller

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\} \quad (1)$$

$$]a, b[/ (a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\} \quad (2)$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x < b\} \quad (3)$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a < x \leq b\} \quad (4)$$

1. Lukket mængde
2. Åben mængde
3. Halvåben mængde
4. Halvåben mængde

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3, 4\}$$


$$U = \mathbb{Z}$$

4.7 Foreningsmængde

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$A \cup B = A + B + Y$$




4.8 Fællesmængde

$$A \cap B = \{x | x \text{ in } A \wedge x \in B\}$$

$$A \cap B = \{2, 3\}$$

$$A \cap B = Y$$




4.9 Fraregnet

$$A \setminus B \equiv A - B$$

$$A \setminus B = \{x | x \in A \vee \notin B\}$$

$$A \setminus B = \{1\}$$

$$A \setminus B = \text{Kun helt røde}$$



4.10 Komplementet

$$\bar{A} = u - A$$

4.11 Disjunkte

To mængder er disjunkte hvis

$$A \cup B = \emptyset$$

$$\neg \exists x : x \in A \wedge x \in B$$

$$A \subseteq \bar{B}$$

$$B$$

$$A = B$$

4.12 Mængde love

For at overbevise sig selv om love kan venn diagrammer bruges som sandhedstabeller kunne bruges tidligere.

TABLE 1 Set Identities.	
<i>Identity</i>	<i>Name</i>
$A \cap U = A$ $A \cup \emptyset = A$	Identity laws
$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	Domination laws
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	Idempotent laws
$\overline{(\overline{A})} = A$	Complementation law
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	Commutative laws
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Associative laws
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Distributive laws
$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	De Morgan's laws
$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	Absorption laws
$A \cup \overline{A} = U$ $A \cap \overline{A} = \emptyset$	Complement laws

4.12.1 De Morgans love

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} = U - (A \cap B)$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

4.13 Ydeligere notation

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$
$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$$

Alfabet - mulige tegn i en mængde eks. $\Sigma = \{0, 1\}$ for bit strings

Yderligere gælder det Σ^* ligesom i regulære udtryk er en samling af tegn i alfabetet, hvor der er 0 eller flere tegn.

5 Funktion

En funktion er en translation af elementer fra en definitions-mængde, hvor hvert element i A har en tilsvarende element i B.

Definitionsmængde $Dm(f)$

Dispositions-mængde Overmængden som definitionsmængden afbilder

Værdimængde

$$\begin{aligned}Vm(f) &= y \in B \exists x \in A : f(x) = y \\ &= f(x) | x \in A \\ &= f(A)\end{aligned}$$

5.1 Injektive funktioner

$$\forall x_1, x_2 \in Dm(f) : f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$$

Alle x værdier vil have sin egen y værdi.

5.2 Surjektiv

$$\forall y \in B : \exists x \in A : f(x) = y$$

Der findes en x i definitionsmængden så alle værdimængder / y værdier bliver ramt.

5.3 Bijektiv

Funktionen er både injektiv og surjektiv

Alle punkter i y bliver ramt én gang. 1 til 1 korrestance

5.4 Invers funktion

Isolering af x .

Ved afbilledring vil akserne byttes rundt

Ikke det samme som f^{-1} som er bare $\frac{1}{f(x)}$

Hvis et punkt i funktionen f^{-1} ikke er defineret er funktionen ikke defineret

Ved afbilledring vil akserne byttes rundt

5.5 Operationer på funktioner

Her vil blot de funktioerne indsættes med parentes rundt om og udregnes.

5.6 Sammensat funktion

Bruger 1 funktion som værdi til funktionen.

$$(g \cdot f)(x) = g(f(x))$$

5.7 Monotoniforhold

Strengt voksende, påkræver det at hvis x er større end tidligere skal y være større.

Voksende kan næste x værdi og være lig med y .

Monoton - voksende eller aftagende.

5.8 Tællelige mængder

Mængden \mathbb{Z} er en tællelig mængde og beskrives ved \aleph_0 .

Ikke tællelige mængder kaldes overtællelige mængder.

Kardinaliteten kan her bruges så hvis \mathbb{Z} kan mappes til en ny mængde er den tællelig.

Tællig uendelig er blot tællelig men mere specifikt

En tællelig mængde krydset med en tællelig mængde giver en tællig mængde

Mængden $Q = \frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}$ er en tællelig mængde.

Da der blot mappes en sammenhæng hvor alle \mathbb{Z} kan mappes på tæller og nævner, således alle rationelle tal kan opstå og dermed er \aleph_0 .

5.9 Overtællelige mængder

Reelle tal \mathbb{R} er en overtællelig mængde og kan vises via argumentet. At selv ved delmængden mellem 0 og 1 vil et nyt decimal altid kunne findes ved at tage diagonalen af allerede nævnte reelle tal.

6 Relationer

Relationer bruges til at finde elementer som opfylder en relation i mængder. Der er to typer af relationer kvartær og binære relationer. Binær er når der er en direkte relation, hvor kvartær har interne relationer.
Eks.

$$\begin{aligned} R_{inv} &= \{(a, b) \in \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{R}^+ | b = \frac{1}{a}\} \\ &= \{(1, 1), (2, \frac{1}{2}), (3, \frac{1}{3}), \dots\} \\ (2, \frac{1}{2}) &\in R_{inv} \\ (\frac{1}{2}, 2) &\notin R_{inv} \\ 5R_{inv} &\frac{1}{5} \end{aligned}$$

En relation på mængden A er en relation fra A til A , dvs $(a, b) \in A \times A | \dots$

6.1 Matrirar


Her bruges en matrix med række og collonner som repræsentere de forskellige elementer hvor 0 er falsk og 1 er sandt.

$$\begin{aligned} A = \{1, 2, 3\} - R_{<} &= \{(a, b) \in A \times A | a < b\} = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\} \\ &\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

6.2 Orienterede grafer

Her bruges en graf, hvor relationer er repræsenteret som en kant og hvert element er en knude.

$$\begin{aligned} A &= \{1, 2, 3, 4\} - R_p \\ &= \{(a, b) | a \text{ og } b \text{ har samme paritet}\} \\ &= \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), \dots\} \end{aligned}$$



6.3 Egenskaber

6.3.1 Refleksiv

Mængden R relation på A er kun refleksiv hvis

$$(a, a) \in R$$

, for alle $a \in A$

$\{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ på $\{1, 2, 3\}$ er sand

$\{(1, 1), (2, 2)\}$ på $\{1, 2, 3\}$ er falsk

Følgende diagonal skal være sand hele vejen for refleksiv i en matrise. Et diagram påkræver alle knuder har en lykke til sig selv.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6.3.2 Symmetrisk

Mængden R relation på A er kun symmetrisk hvis

$$(a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R$$

, for alle $a, b \in A$

$\{(1, 3), (3, 1)\}$ og = sand

> falsk

På et diagram skal alle kanter vende begge retninger. På en matrise kan det genkendes ved at der skal være en spejling på diagonalen således:

$$\begin{bmatrix} \diagdown & 0 & 0 \\ 0 & \diagdown & 0 \\ 0 & 0 & \diagdown \end{bmatrix}$$

6.3.3 Anti-symmetrisk

Mængden R relation på A er kun anti-symmetrisk hvis

$$(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \rightarrow b = a$$

, for alle $a, b \in A$

< & = sand

\neq falsk

På en matrise må der ikke være en spejling på akserne.

$$\begin{bmatrix} \searrow & 0 & 0 \\ 0 & \searrow & 0 \\ 0 & 0 & \searrow \end{bmatrix}$$

6.3.4 Transitiv

Mængden R relation på A er transitiv hvis

$$(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R$$

, for alle $a, b, c \in A$

$\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ og $<$ sand

$\{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 4)\}$ og \neq falsk

På et diagram er det nemt at se om der mangler direkte kanter efter to kanter.

6.4 Kombination af relationer

Mængde operationer kan udføres på relationer.

Herudover kan sammensættes os funktioner.


R : relation fra A til B

S : relation fra B til C

$$S \circ R = \{(a, c) | \exists b : (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}$$


$$R = \{(1, 2), (3, 1)\}$$

$$S = \{(1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$$



$$S \circ R = \{(1, 1), (2, 1)\}$$

$$R \circ S = \{(1, 2), (1, 3), (3, 3)\}$$



Sammensat kan findes ved at følge den første relations kanter efterfulgt af den andens relations kanter.

6.5 Lukninger

Lukninger bruges til at gøre relationer for en given egenskab.
Følgende former for lukning vil eksemplerne tage udgangspunkt i

$$R = \{(1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}$$

Lukninger er de originale par og de nye lukningspar.

6.6 Refleksive lukninger

Eksempelvis. Den refleksive lukning af R er $r(R) = R \cup \{(a, a) | a \in A\}$

$$r(R) = R \cup \{(1, 1), (4, 4)\}$$

Eksempel på en uendelig tællelig mængde:

$$R_{<} = \{(a, b) | a < b\}$$

$$r(R_{<}) = R \cup \{(a, b) | a = b\}$$

6.7 Symmetriske lukninger

R er en relation på A gælder det at den symmetriske lukning er:

$$s(R) = R \cup \{(a, b) \in A \times A | (b, a) \in R\}$$

$$s(R_{<}) = R_{<} \cup R_{>} = R_{\neq}$$

$$(s(R)) = R \cup \{(3, 2)\}$$

6.8 Transitiv lukning

Den transitive lukning vil indeholde kan defineres ved

$$t(R) = R^* = \bigcup_{i=1}^{|A|} R^i \text{ Hvis } A \text{ er endelig}$$

her tages fællesmængden af relationen og relationen sammensat med sig selv
og relationen sammensat med sig selv 3 gange osv.

$$t(R) = R \cup \{(2, 1)\}$$

For R^2 hentydes til nye par og for R^* hentydes til den alle samlet par.

7 Ækvivalensrelationer

En ækvivalensrelation er refleksiv, symmetrisk og transitiv.

Eks. paritet, = og den tomme relation er en ækvivalens

a og b som tilhøre en ækvivalens relation er ækvivalente

Ækvivalensklassen for a er $[a]_R = \{b | (a, b) \in R\}$ D.V.S alle elementer som

er relateret til a for R som er en ækvivalens relation på A
 En relation ækvivalensklasser vil altid være dækket af hele relationen også kaldet **partitionær**.

7.1 Partitionær

For den ækvivalente relation da gælder:

- aRb
- $[a]_R = [b]_R$
- $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$

D.V.S to relateret elementer, må være i samme ækvivalens klasse og de to klassers overlap ikke må være tomt.

Det vil her bevises at $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (1)$ dermed alle 3 udtryk er ækvivalente.

7.1.1 $aRb \rightarrow [a]_R = [b]_R$

Et mod stridsbevis kan her opstilles.

Et punkt som er relateret til a og ikke er relateret til b er ikke mulig, da R ikke længere vil være transitiv.

7.1.2 $[a]_R = [b]_R \rightarrow [a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$

Den eneste måde hvorpå at overlappet kan være tomt påkræver at $[a]_R = \emptyset$
 Dette kan dog ikke lade sig gøre, da a er en del af sættet og pr. definition er ækvivalensklassen reflektiv og dermed er elementet (a, a) altid i $[a]_R$.

7.1.3 $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset \rightarrow aRb$

Efter at overlappet ikke er tomt, vil det betyde der et et punkt c som er relativ til a og b . Dermed da ækvivalensklassen er transitiv vil det medføre at a er relateret til b

7.2 Ækvivalensklasserne dækker hele A

Dette ville påkræve at to ækvivalensklasser ikke overlapper hinanden.

For ækvivalens klassen vides det at $\forall a \in A : a \in [a]$

Dermed vides det at klassen ikke er tom og da for to klasse som er ens $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

Det kan så vendes rundt (negeres) at hvis deres overlap er tomt $[a] \cap [b] = \emptyset$ vil det medføre $\neg([a] = [b])$ altså $[a] \neq [b]$.

Dermed kan to ækvivalensklasser ikke overlappe.


8 Partiel ordning

Refleksive, transitive og antisymmetrisk.

Partielt ordnet mængde (A, R) hvor R er en mængde på A som er en partiel ordning.


Eks. = og \geq

$(\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, |)$ hvor $|$ er går op i.



8.1 Hassediagrammer

Med underforståelsen at det er en partiel ordning er det ikke nødvendigt at vise alle direkte kanter



Maskimale elementer er elementer som ikke har nogle elementer relateret over sig. $\nexists b \in A : b < a$

Minimale elementer er elementer som ikke har nogle andre elementer som går op i dem. $\forall b \in A : a < b$

Er der kun 1 element som er maksimal eller minimal er det den største ($\forall v \in A : b < a$) eller mindste ($\nexists b \in A : a < b$).

8.2 Total ordning

Den partielle ordning for R er hvor aRb eller bRa er gældende. Her vil a og b være sammenlignelige.

Dvs. at en total ordning er refleksiv, transitiv, antisymmetrisk og den givende relation er gældende for enten aRb eller bRa

Dermed en total ordning på et sæt, hvor ingen relation er angivet tages der blot udgangspunkt i transitiv, antisymmetrisk, refleksiv og at for ethvert element a og b skal a, b eller b, a optræde.

Er alle par $a, b \in A$ sammenlignelige med relationen R er det en total ordning. Eks.

$R = \{(a, b) | a \leq b\}$ på $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ er en total ordning

8.3 Leksikografisk ordning

En måde hvorpå en sortering kan foregå.


$$(a_1, a_2) < (b_1, b_2)$$

Først tjekkes om $a_1 < b_1$ i det tilfælde står det i leksikografisk ordning

Hvis $a_1 = b_1$ så er den leksikografisk hvis $a_2 < b_2$

8.4 Binært træ

Et binært træ er et træ hvorledes hvert udkom opdeles i to muligheder. Et fuldt binært træ skal altid have to muligheder.



De sorte punkter er kaldet knuder.

For et binært træ er højden defineret rekursivt således:

$$h(\circ) = 0, \quad h\left(\begin{array}{c} \cdot \\ / \quad \backslash \\ T_1 \quad T_2 \end{array}\right) = \max\{h(T_1), h(T_2)\}$$

8.4.1 Bevis for højde på binært træ

n antal knuder, h højden og T træ

$$\text{Basis: } S_1 = \{\circ\} = 2^{h+1} - 1 = 1 = n$$

$$\text{Ind. ant: } n(T) = 2^{h(T)+1} - 1, \quad \text{for alle } T \in S_{k-1} \ (k \geq 2)$$

$$\text{Ind. skridt: } T \in S_k - S_{k-1}, \quad \text{hvor } k \geq 2$$

$$\begin{aligned} n(T) &= 1 + n(T_1) + n(T_2) \\ &\leq 1 + (2^{h(T_1)+1} - 1) + (2^{h(T_2)+1} - 1) \quad \text{da induktions ant.} \\ &= 2^{h(T_1)+1} + 2^{h(T_2)+1} - 1 \\ &\leq 2^{h(T)} + 2^{h(T)} - 1 \quad \text{da } h(T_1) \leq h(T) \geq h(T_2) \\ &= 2^{h(T)+1} - 1 \end{aligned}$$

9 Tal teori

9.1 Delelighed

Heltals division kaldes $a \text{ div } b$, ved negativ div rundes ned, da rest altid skal være mellem 0 og divisor.

For $a|b$ er udsagnet korrekt hvis $\frac{b}{a} \in \mathbb{Z}$

For dette kan det observeres at

- $a|b \wedge a|c \rightarrow a|(b+c)$
- $a|b \rightarrow \forall k_1, k_2 \in \mathbb{Z} : a|k_1 \cdot b + a \cdot k_2$
- $a|b \wedge b|c \rightarrow a|c$
- $a|b \wedge a|c \rightarrow \forall m, n \in \mathbb{Z} : a|(mb + nc)$
- $a|bc \wedge \gcd(a, b) = 1 \rightarrow a|c$
- $a|b = a| - b$
- $a|b \vee a|c \rightarrow a|bc$

9.1.1 Bevis $a|b \wedge a|c \iff a|(b+c)$

$$\begin{aligned}
 & a|b \wedge a|c \\
 & b = k \cdot a \wedge c = l \cdot a, & k, l \in \mathbb{Z} \\
 & b + c = k \cdot a + l \cdot a = (k + l)a, & k + l \in \mathbb{Z} \\
 & a|(b + c)
 \end{aligned}$$

Division kan udføres hvis $a|bc \wedge \gcd(a, b) = 1 \rightarrow a|c$

9.1.2 Bevis for division i af delelighed

$$\begin{aligned}
 & a|bc \wedge \gcd(a, b) = 1 \\
 & \exists s, t \in \mathbb{Z} : sa + tb = \gcd(a, b) \\
 & \quad : sa + tb = 1 \\
 & \quad : sac + tbc = c \\
 & \quad : sac = c - tbc
 \end{aligned}$$

Dermed da b er delelig med a vil det betyde for at venstre side kan være et multiplum af a skal c være delelig med a .

9.2 Kongruence

To kongruente tal skrives som $a \equiv b \pmod{m}$ dvs. $m|(a-b)$

- $a \equiv b \pmod{m} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : a = b + mk$
- $a \equiv b \pmod{m} \rightarrow a \equiv b + mk \pmod{m}$
- $a \equiv b \pmod{m} \rightarrow ka \equiv kb + km \pmod{m}$
- $a \equiv a \pmod{m}$
- $a \equiv b \pmod{m} \iff b \equiv a \pmod{m}$
- $a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m} \rightarrow a \equiv c \pmod{m}$
- $a \equiv b \pmod{m} \wedge c \equiv d \pmod{m} \rightarrow a + c \equiv b + d \pmod{m}$
- $a \equiv b \pmod{m} \wedge c \equiv d \pmod{m} \rightarrow ac \equiv bd \pmod{m}$
- $a \equiv b \pmod{m} \rightarrow a^k \equiv b^k \pmod{m}$
- $a \equiv b \pmod{m} \rightarrow \gcd(a, m) = \gcd(b, m)$

$$9.2.1 \quad \exists k \in \mathbb{Z} : a = b + km \iff a \equiv b \pmod{m}$$

$$\begin{aligned} m &| (a - b) \\ a - b &= km, k \in \mathbb{Z} \\ a &= b + km \end{aligned}$$

Den muligmængde af $a \pmod{m}$ vil være $\mathbb{Z}_m = 0, 1, 2, \dots, m-1$

Dermed kan der udføres addition og multiplikation på begge sider af \equiv hvis den er sand, herudover kan der mod'en ligges til og fra på en side.

Her gælder det også at hvis $c \equiv d$ vil $a + c \equiv a + d$ og $a \cdot c \equiv a \cdot d$

Ved $(a + b) \pmod{m}$ eller $(a \cdot b) \pmod{m}$ kan modulo udføres ind i parentesens hvorefter operationen kan foregå.

9.2.2 Bevis for modulo ind i parentes

$$\begin{aligned} a &\equiv a \pmod{m} \pmod{m} \\ b &\equiv b \pmod{m} \pmod{m} \\ a + b &\equiv (a \pmod{m}) + (b \pmod{m}) \pmod{m} \\ (a + b) \pmod{m} &= ((a \pmod{m}) + (b \pmod{m})) \pmod{m} \\ ab &\equiv (a \pmod{m})(b \pmod{m}) \pmod{m} \\ ab \pmod{m} &= ((a \pmod{m})(b \pmod{m})) \pmod{m} \end{aligned}$$

Division kan foregå ved $ac \equiv ab \pmod{m} \rightarrow a \equiv b$ hvis $\gcd(c, m) = 1$

9.2.3 Bevis for division ved kongruencer

$$\begin{aligned} ac &\equiv bc \pmod{m} \\ m &| (bc - ac) \\ m &| (b - a)c \\ m &| (b - a) & \text{Da } \gcd(c, m) = 1 \\ a &\equiv b \pmod{m} \end{aligned}$$

9.3 Linære kongruenser

Ligninger som indebære kongruenser fremfor ligheder. $ax \equiv b \pmod{m}$

Eks. $4x \equiv 5 \pmod{11}$, her er en løsning $x = 4$

Det ses at løsningerne vil have differensen m . En ligning har altid en løsning hvis $\gcd(a, m) = 1$, og nogle gange hvis ikke det er opfyldt.

For isolering af x kan den inverse til a modulo m bliver multipliceret på begge sider.

Den inverse er fundet ved $a \cdot \bar{a} \pmod{m} = 1$. Eks. $3 \cdot x \pmod{11}$ Vil $x = 4$ Dermed vil det kun være en multiplikativ invers hvis $\gcd(a, m) = 1$, dog kan der stadig være muligheder.

Euklids algoritmen kan her bruges til at finde multiplikative invers.

9.4 Primaltal

$p \in \mathbb{Z}^+ - 1$ hvis $\forall a|p \mid a \in \mathbb{Z} = 1, p$ er p et primaltal. Ellers er det sammensat. Et hvert tal $n \geq 2$ har en måde hvor det er produktet af primaltal, kaldet primtals faktore

9.4.1 greatest common divider

def. $\gcd(a, b) = \max\{d|d|a \wedge d|b\}$

Det kan også ses at \gcd af et tal er produktet af de primtals faktore de har tilfældes

Hvis $\gcd(a, b) = 1$ er a og b indbyrdes primiske (relatively prime).

9.4.2 Least common multiplum

def. $\text{lcm}(a, b) = \min\{m|m|a \wedge m|b\}$

Kan også findes ved at tage primfaktorerne og multiplicere sammen. Ved ens primfaktore tages mængden med højst eksponent.

Dermed $\text{lcm}(a, b) = \frac{a \cdot b}{\gcd(a, b)}$

9.5 Euklids Algoritme

For $a = bq + r \rightarrow \gcd(a, b) = \gcd(b, r)$

Eksempel på brug:

$$\begin{aligned} &\gcd(287, 91) \\ 287 &= 91 \cdot 3 + 14 \\ 91 &= 14 \cdot 6 + 7 \\ 14 &= 7 \cdot 2 \end{aligned}$$

Dermed er $\gcd(287, 91) = 7$ da det er den sidste rest før 0.

9.5.1 Bevis

For dette skal følgende bevises $d|a \wedge d|b \iff d|b \wedge d|r$ for $a = bq + r$

Først højre medføre venstre:

$$d|b \wedge d|r \quad (1)$$

$$d|(bq + r) \quad (2)$$

$$d|a \quad (3)$$

(1) medføre (2) da det er blot et helt tal multipleceret med b som er deleligt med d og r er også deleligt. Dermed fås def. på a

Venstre medføre højre

$$d|a \wedge d|b \quad (4)$$

$$d|(a - bq) \quad (5)$$

$$d|r \quad (6)$$

(4) medføre (5) med samme argument som før, som er den samme def på den isoleret r.

9.6 gcd(a,b) på linearkombination

Tages der udgangspunkt i eksemplet fra tidligere:

$$\gcd(35, 78)$$

$$78 = 35 \cdot 2 + 8$$

$$35 = 8 \cdot 4 + 3$$

$$8 = 3 \cdot 2 + 2$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1$$

Isolering af konstatnerne

$$1 = 3 - 2 \cdot 1$$

$$2 = 8 - 3 \cdot 2$$

$$3 = 35 - 8 \cdot 4$$

$$8 = 78 - 35 \cdot 2$$

Indsæt konstanterne i udtrykket

$$\begin{aligned}
 1 &= 1 \cdot 3 - 1 \cdot 2 \\
 1 &= 1 \cdot 3 - 1 \cdot (8 - 3 \cdot 2) \\
 1 &= 1 \cdot 3 - (8 - 3 \cdot 2) \\
 1 &= 1 \cdot 3 - 8 + 3 \cdot 2 \\
 1 &= 3 \cdot 3 - 1 \cdot 8 \\
 1 &= -1 \cdot 8 + 3 \cdot 3 \\
 1 &= -1 \cdot 8 + 3 \cdot (35 - 8 \cdot 4) \\
 1 &= -1 \cdot 8 + 3 \cdot 35 - 8 \cdot 12 \\
 1 &= -13 \cdot 8 + 3 \cdot 35 \\
 1 &= 3 \cdot 35 - 13 \cdot 8 \\
 1 &= 3 \cdot 35 - 13 \cdot (78 - 35 \cdot 2) \\
 1 &= 3 \cdot 35 - 78 \cdot 13 + 35 \cdot 26 \\
 1 &= 29 \cdot 35 - 78 \cdot 13
 \end{aligned}$$

9.7 Kinessisk Restklasse

For $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$

Hvor $m_1, m_2, \dots, m_n \in \mathbb{Z}^+$ som er parvis indbyrds primiske

Vil

$$\begin{aligned}
 x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\
 x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\
 &\vdots \\
 x &\equiv a_n \pmod{m_n}
 \end{aligned}$$

Har en unik løsning modulo m som $m = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$

9.7.1 Eksempel

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 1 \pmod{7}$$

$$x \equiv 6 \pmod{8}$$

$$a_1 = 3$$

$$a_2 = 1$$

$$a_3 = 6$$

$$M_1 = 7 \cdot 8 = 56$$

$$M_2 = 5 \cdot 8 = 40$$

$$M_3 = 7 \cdot 5 = 35$$

$$M = 5 \cdot 7 \cdot 8 = 280$$

Herfra findes den multiplative invers i udtrykket $M_k y_k \equiv 1 \pmod{m_k}$

$$56y_1 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$y_1 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$40y_2 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$5y_2 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$y_2 \equiv 3 \pmod{7}$$

$$35y_3 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$3y_3 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$y_3 \equiv 3 \pmod{8}$$

Dermed vil

$$b_1 = M_1 \cdot y_1 = 56 \cdot 1 = 56$$

$$b_2 = M_2 \cdot y_2 = 40 \cdot 3 = 120$$

$$b_3 = M_3 \cdot y_3 = 35 \cdot 3 = 105$$

Dermed er x

$$\begin{aligned}
 x &= \sum_{k=1}^n M_k y_k a_k \\
 x &= \sum_{k=1}^n b_k a_k \\
 x &= 56 \cdot 3 + 120 \cdot 1 + 105 \cdot 6 \\
 x &= 168 + 120 + 630 \\
 x &= 918 \\
 x &\equiv 918 \pmod{M} \\
 x &\equiv 918 \pmod{280} \\
 x &\equiv 78 \pmod{280}
 \end{aligned}$$

9.7.2 Bevis

For at bevise at der findes én løsning skal det vises at $x = \sum_{k=1}^n b_k a_k$ der

findes en række af b_k som opfylder at $b_k \equiv \begin{cases} 1 \pmod{m_k} \\ 0 \pmod{m_i} \end{cases}$

Dette vil nemlig betyde at ved summationen, at når $b_k a_k$ vil kun have betydning for den k 'ene ækvivalens, da den giver 1 og ved de andre ingen ting da de giver 0.

Det vides herudover at ved $M_k = \frac{m}{m_k}$ vil

$M_k \equiv 0 \pmod{m_i}$ hvor $i \neq k$, da M_k vil altid være m_i multipliseret med konstanter.

Dermed kan der multipliseres endnu en konstant på nemlig $M_k y_k \equiv 0 \pmod{m_i}$, $i \neq k$. Således vides det at der findes en $b_k = M_k y_k$ som opfylder $b_k \equiv 0 \pmod{m_i}$

I tilfældet med m_k skal der eksistere en y_k som vil medføre at $M_k y_k \equiv 1 \pmod{m_k}$.

Det vil der da alle mod fra ligningerne skal være indbyrdes primiske og dermed vil $\gcd(M_k, m_k) = 1$

Dermed vil der findes en multiplikativ invers. Dette er også hvorfor der kan findes en løsnign i nogle tilfælde selv alle mod ikke er indbyrdes primiske.

Dermed da y_k kan være en multiplikativ invers til M_k modulo m_k vil det kunne gælde at $M_k y_k \equiv 1 \pmod{m_k}$

Således vides det at $b_k = M_k y_k$ også er en løsning således $b_k \equiv 1 \pmod{m_k}$

9.8 Fermats lille sætning

$a, p \in \mathbb{Z}$ og p er primtal gælder det at:

- $P \nmid a \rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$
- $a^P \equiv a \pmod{p}$

9.8.1 Eksempel

$7^{222} \bmod 11$

11 er primtal og $11 \nmid 7$

Dermed vil $7^{11-1} \equiv 1$

Det kan bruges til $7^{222} = 7^{22 \cdot 10 + 2} = (7^{10})^{22} \cdot 7^2$

Dermed $7^{222} \bmod 11 = 1^{22} \cdot 7^2 \bmod 11 = 49 \bmod 11 = 5$

10 Matricer

For matricen $A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{bmatrix}$ har den 3 søjler og 2 rækker og dermed er en 2×3 matrice.

Matrice index er i, j eller blot ij hvor i er række nummer og j er søjle nummer.

10.1 Addition

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 6 & 8 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & 6 & 4 \\ 4 & 8 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+8 & 4+6 & 8+4 \\ 4+6 & 8+8 & 6+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 10 & 12 \\ 10 & 16 & 15 \end{bmatrix}$$

$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

10.2 Multiplikation

For multiplikation kan lade sig gøre skal antallet af rækker på den første matrice være lig med antallet af søjler på den anden matrice.

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ D &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ E = A \cdot D &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 & 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 & 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \end{bmatrix} \\ E &= \begin{bmatrix} 13 & 7 & 7 \\ 5 & 2 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Generelt for to matrixer f og g vil produktet h være $h_{ij} = \sum_{l=1}^m f_{il}g_{lj}$. Her har h samme mængder rækker som f og søjler som g . Multiplikation er ikke kommutativt og kan ikke byttes rundt på. Det er dog associativt så rækkefølgen på $f \cdot g \cdot h$ er ligegyldig.

10.3 Neutrale matrice

En matrice hvor alt indhold er 0

10.4 Identitets matricen

En kvadratisk matrice hvis størrelse er angivet i subtekst ved I_n og har 1 på diagonalen fra øverst højre hjørne til nederst venstre hjørne.

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ved multiplikation af en identitetsmatrice forbliver den første matrice ens.

10.5 Transponering

Ombytning af søjler og rækker

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$m_{ij}^T = m_{j,i}$ Dermed ved kvadratiske matricer vil det bare spejles på diagonalen.

10.6 Symmetriske matricer

Symmetriske matricer er hvor $m = m^T$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$



10.7 Binær matricer

Har kun 0 og 1 som indhold og operationer som \vee og \wedge på sammevis som addition.

10.8 Boolsk produkt

$M_1 \odot M_2$ beregnet ligesom multiplikation af matricer hvor addition udskiftes med \vee og multiplikation udskiftes med \wedge


Ved en matrice multipliceres med sig selv vil det i grafen ses at kanter med længde 2 vil blive tilbage. Dette kommer af at det kan ses under beregningen af kun hvis der er en kant som går ind og ud af en knude vil det i beregningen kunne give en ny kant. Ligesådan tjekkes der ved flere højere potenser for veje i tilsvarende længde.



10.9 Matricers grafiske repræsentation

Her er en kant repræsenterbar ved den går fra række nummer til søjle nummer.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



11 Grafer

Simple grafer består af en mængde af knuder og kanter. Den har ingen kredse/loop og flere kanter mellem 2 knuder

Orienterede grafer har en angivet kant vej.

Ikke orienterede grafer står ud ved at et kant par kan stå i vilkårlig rækkefølge.

Multigrafer er hvor der er parrallele kanter, dvs flere kanter i samme retning mellem to knuder.

Dette kan både lade sig gøre på orienterede og ikke orienterede grafer.

Grader - antallet af kanter som rammes af en knude


Samlet antal grader er lig med den dobbelte mængde af kanter.

11.1 Terminologi

Del grafer kan undermængder af grafer som kan indeholde nogle af knuderne og kanter. Delgraf induceret er en mængde af knuder og alle kanter imellem dem


11.1.1 Ikke orientede grafer

- e_1 forbinder d og d
- e_1 er incident til b og d
- e_1 har endepunkterne b og d
- b og d er naboer
- b og d er adjacente
- e_1 og e_2 er adjaente
- e_2 og e_3 er parallelle
- $N(b) = \{c, d\}$ er b's nabomængde
- $N(\{b, d\}) = N(b) \cup N(d)$



11.1.2 Orienterede grafer

- e_1 og e_2 er antiparallelle
- e_1 har startknode a og slutknode b
- e_1 er incident fra a og incident til b
- d er b[de start og slutknode for e_5
- $\deg^-(a) = 1$ (indgrad)
- $\deg^+(a) = 1$ (udgrad)
- Underliggende ikke orienterede graf er grafen uden retning



11.2 Matching

Matching er en mængde af ikke adjacente kanter.

Maksimal matching er mængden af kanter således der ikke er andre muligheder.

Maksimum matching er mængden af kanter således der er flest uden andre muligheder.


11.3 Grafklasser

11.3.1 Komplette grafer


En graf hvor alle kanter er naboer.

$k_1 = \bigcirc$


$k_2 = \bigcirc \text{---} \bigcirc$




11.3.2 kredse



11.3.3 Hjul




11.3.4 Hypercubes




11.3.5 Todelte grafer

Todelte grafer er hvor grafen kan deles op således at 1 gruppering ikke har interne knuder men kun kanter til en anden gruppering. Dermed hvis grafen indeholder en ulige kreds kan den ikke todeles.



11.3.6 Komplette todelte grafer


Grafer som er baseret på todelte grafer som gøres så komplet som muligt. Her vil grafen $K_{m,n}$ have $m + n$ knuder og $m \cdot n$ kanter.



11.4 Repræsentation af grafer

11.4.1 Adjacenslister

En listem ed nabo til alle punkter. Ved orienterede grafer er det punkter som den givende knude går til. Kan også repræsenteres som matricer, hvor ikke orienterede vil være symmetriske.



- a: b,c,d
- b: a,c
- c: a,b,d
- d: a,c

11.5 Isomorfi

Beskriver om to grafer er ens. Tjekkes ved bijektion, hvor man mapper knuder på knuder på den anden graf således de får ens naboer på begge grafer.

11.6 Graf stier og kredse

Sti - en sekvens af knuder med en kant orienteret i korrekt retning, angivet i rækkefølge af knuder og længden er mængden af kanter

En ikke simpel sti passere en knuder flere gange. (kan være hvis en kant blvier brugt flere gange)

Kredse - stier som starter og slutter i samme knude


11.7 Graf sammenhænge

En graf er sammenhængende hvis der er en sti mellem ethvert par af knuder
Sammenhængskomponenter er mængden af maksimal sammenhængende delgrafer. DVS mængden af steder hvor grafen adskiller delgraferne.

Ved orienteret grafer så er der to typer af sammenhænge

- Svagt sammenhængende - Bruger underliggende graf
- Stærk sammenhængende - Her skal stien tage højde for orientering

For en stærk sammenhængende graf skal punkter i et komponent være sammenhængende til alle andre punkter i komponentet.



Det kan eksempelvis ses her hvordan 1,2,3,4 danner en stærk smh.komp. 5 gør også og 6,7,8 gør.

Dermed er der 3 stærk smh. komp.

11.8 Træer

Ikke orienteret sammenhængende, acyklisk (ingen kredse) graf.

For ethvert træ eksistere der kun én sti mellem to punkter

11.8.1 Bevis G er et træ $\iff \forall u, v \in V : \exists! \text{ sti mellem } u \text{ og } v$

Pr. Def er et træ sammenhængende, dermed er der en sti mellem alle punkter

Pr. Def er et træ acyklisk, som medføre at der kun kan være 1 sti, da hvis der skal være to stier påkræver det en kreds. Ligesådan bevis i den anden retning

Hvis der altid er en sti og der ikke er mere end 1 sti er den sammenhængende

og acyklisk

Dette er def. på et træ.

11.8.2 Et træ med n knuder har altid $n - 1$ kanter

Induktionsbevis

Basis $n = 1$ roden har ingen kanter

Ind.ant $n = k \geq 1$

Ind. skridt: Ved tilføjelsen af en knude på en rod eller anden knude vil det give 1 kant

12 Følger

Sequence/Følge en ordnet mængde. Eks. fibonacci-tallene

Notation:

$$a_n = \frac{1}{n}, n \geq 1$$

For dette vil $\{a_n\}$ betyde hele følgen.

12.1 Geometrisk følge

Følger som går ud fra formen $a_n = cr^n$, $n \in \mathbb{N}$

Her er c begyndelsesled og r er fælles faktor

Eks for den rekursive def. $a_0 = 1$, $a_n = \frac{1}{2} \cdot a_{n-1}$ vil den være $a_n = 1 \cdot \frac{1}{2}^n$

12.2 Aritmetisk følge

$a_n = b + nd$ b begyndelsesled og d fælles forskel.

eks. 1, 3, 5, 7 vil $b = 1$ og $d = 2$

12.3 Mandelbrot-fraktalen

def: $x_0 = 0$, $x_n = x_{n-1}^2 + c$ hvor c er et kompleks tal

Hvis følgen er begrænset er c en del af mandelbrot mængden.

Hvis $|x_n| > 2$ vil den ikke være begrænset og kaldes Escape condition og desto hurtigere det opnåes vil det illustreres ved at være lysere.

12.3.1 i tilhøre Mandelbrot mængden

$$x_0 = 0$$

$$x_1 = 0^2 + i = i$$

$$x_2 = i^2 + i = -1 + i \qquad i = \sqrt{-1} \rightarrow i^2 = -1$$

$$x_3 = (-1 + i)^2 + i = 1 - 1 - 2i + i = -i$$

$$x_4 = (-i)^2 + i = -1 + i$$

$$x_5 = x_3$$

Dermed er mængden begrænset og en del af mandelbrot mængden. Det vil blive vist ved det komplekse tal er y komponenten dermed er dette (0,1) koordinatet. Dermed er koordinatet sort

13 Rækker

Rækker er sum af et (uendeligt) antal led.

13.1 Eksempel $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$

$$n = 0 : \qquad 1 = 2 - 1$$

$$n = 1 : \qquad 1 + \frac{1}{2} = 2 - \frac{1}{2}$$

$$n = 2 : \qquad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 2 - \frac{1}{4}$$

$$n = 3 : \qquad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 2 - \frac{1}{8}$$

$$n = n : \qquad \sum_{i=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^i = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$n = \infty : \qquad \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i = 2$$

13.2 Summation af rækker

$$\begin{array}{ll}
 \sum_{k=0}^n ar^k (r \neq 0) & \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1}, r \neq 1 \\
 \sum_{k=1}^n k & \frac{n(n+1)}{2} \\
 \sum_{k=1}^n k^2 & \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
 \sum_{k=1}^n k^3 & \frac{n^2(n+1)^2}{4} \\
 \sum_{k=1}^{\infty} x^k, |x| < 1 & \frac{1}{1-x} \\
 \sum_{k=1}^n x^{k-1}, |x| < 1 & \frac{1}{(1-x)^2}
 \end{array}$$

13.3 Geometriske række

$\sum_{i=0}^n ar^i$ Det ses her at hvis man sætter $(r-1)$ får man:

$$\begin{aligned}
 (r-1) \sum_{i=0}^n r^i &= (r-1)(r^0 + r^1 + \dots + r^n) \\
 &= r^1 + r^2 + \dots + r^{n+1} - (r^0 + r^1 + \dots + r^n) \\
 &= r^{n+1} - r^0 \\
 \sum_{i=0}^n r^i &= \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}
 \end{aligned}$$

Her blev begyndelsesledet undladt da det blot kan sættes på efterfølgende.

For $r = 1$ vil det blot gælde at $\sum_{i=0}^n r^i = n+1$

13.4 Artmetisk række

$$\sum_{i=0}^n (b + id)$$

Genrealt kan det findes at:

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^n (b + id) &= \sum_{i=0}^n b + \sum_{i=0}^n id \\ &= \sum_{i=0}^n b + d \sum_{i=0}^n i \\ &= (n+1)b + d \\ &= \frac{n(n+1)}{2}\end{aligned}$$

Den sidste omskrivning kommer ved at hvis man udleder udtrykket ses det at der dannes parvis led bortset fra det sidste og det første som er lig med $\frac{n(n+1)}{2}$

13.4.1 Eksempel $1 + 3 + 5 + \dots + 2k - 1$

$$\sum_{i=0}^{k-1} 1 + 2i = k + (k-1)k = k^2$$

13.5 Rækker i loops

Det kan også bruges til at finde antal gennemgang i for loops:
eks.

```
for i=1 to 20
    for j=1 to i
        ...
```

Dette vil køre $\frac{20(20+1)}{2} = 210$ gange

Ved summer som starter højere kan det omskrives

$$\sum_{i=11}^{20} i = \sum_{i=1}^{20} i - \sum_{i=1}^{10} i$$

For 3 nested loops:

```
for i=1 to 20
    for j=1 to i
        for k=1 to j
```

Vil den køre

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{20} \sum_{j=1}^i j &= \sum_{i=1}^{20} \frac{i(i+1)}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{20} (i^2 + i) \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{20} i^2 + \sum_{i=1}^{20} i \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{20 \cdot 21 \cdot (2 \cdot 20 + 1)}{6} + \frac{20(20 + 1)}{2} \right) \\
 &= 1540
 \end{aligned}$$

Ved i^2 kunne en tabel fra s.176 i bogen bruges.

13.6 Notation

$$\sum_{i=1}^n i = \sum_{i \leq i \leq n} i = \sum_{i \in A} i, \text{ hvor } A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

13.7 Uendelige rækker

For den uendelige række $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, vil $s_n = \sum_{i=1}^n a_i$ være den n 'te partielle sum.

hvis $\exists s \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ siges det at rækken konvergere mod s

Dvs. at hvis en partiel række af en uendelig række konvergere, vil den uendelige række konvergere.

Ligesådan må man også gerne starte på et vilkårligt punkt for at undersøge om rækken konvergere

Hvis en ultimativ positiv følge er begrænset ovenfra vil den altid konvergere, da den aldrig vil blive negativ og blot nå det begrænset punkt og konvergere.

Hvis $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ og $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ da gælder:

- $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = cA$
- $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = A + B$
- $a_n \leq b_n \rightarrow A \leq B$, for alle $n \geq 1$

Dermed er den harmoniske serie divergerende, da integralet bliver uendeligt.

14 Følger og konvergens

14.1 Notation

Hvis $a_n \geq L$ for $n \in \mathbb{N}^+$ siges:

- $\{a_n\}$ er begrænset nedefra fra L
- L er en nedre grænse for $\{a_n\}$

Hvis $a_n \leq M$ for $n \in \mathbb{N}^+$, siges:

- $\{a_n\}$ er begrænset ovenfra af M
- M er en øvre grænse for $\{a_n\}$

Når n er $1, 2, 3, 4, \dots$

Hvis $\{a_n\}$ er begrænset både ovenfra og nedefra er den begrænset.

Hvis alle elementer er større eller lig med 0 er den positiv

Hvis den er mindre eller lig med 0 er den negativ.

Hvis alle elementer $a_{n+1} \geq a_n$ er den voksende

Hvis alle elementer $a_{n+1} \leq a_n$ er den aftagende

Hvis ikke den vokser eller aftager er den monoton

Hvis alle elementer $a_n a_{n+1} < 0$ er den alternerende, dvs skiftende mellem positiv og negativ

En følge kan være ultimativ egenskab som betyder at den efter et punkt n , vil have den givende egenskab såsom ultimativ positiv eller ultimativ begrænset.

14.2 Konvergens

Hvis en række går mod en given værdi når rækken bliver uendelig.

$$\forall \epsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{Z} : \forall n \geq N : |a_n - L| < \epsilon$$

Dvs. for alle værdier ϵ som er større end 0, vil der eksistere et punkt i rækken hvor alle efterfølgende punkter vil være mindre end alle ϵ værdier.

Grænseværdien L bliver her bare brugt hvis et tal konvergerer til 1, vil $L = 1$.

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ Eks. $\{\frac{n-1}{n}\} = 0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots$ vil konvergere mod 1

Hvis $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergerer vil det sige at $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Det kan ses da $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1})$ som medføre ud fra sætningen $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = S - S = 0$

Kan bruges ved eks $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}}$ hvor brøkken er a_n hvor grænseværdien er $\frac{1}{2}$ og dermed divergere det originale udtryk mod uendeligt

Hvis en række konvergere, vil man kunne undlade start og slut af en række.

14.3 Konvergen kriterier

14.3.1 Sammenlignings-kriteriet

Hvis $0 \leq a_n \leq K \cdot b_n$ ultimativt, vil det gælde at:

- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ (konv.) $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (konv.)
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$ (div.) $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty$ (div.)

Det kan nemlig ses at det første udtryk, egentlig blot er definitionen på konvergens, og det andet udtryk er egentlig det første udtryk negeret.

Eks. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^{n+1}}$ kan sammenlignes med $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$, hvor det andet udtryk er større eller lig med når der multipliceres med en konstant her 4

Her vides det at det andet udtryk konvergere, og dermed vil det første udtryk konvergere.

Ligesådan vil $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ divergere, da $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergere og er mindre.

14.3.2 Grænse-sammenlignings-kriteriet

Bygger på grænseværdien og tjekker om en konstant eksistere.

Hvis $\{a_n\}$ og $\{b_n\}$ er positive følger og $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ da gælder:

- $(L < \infty \text{ og } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ konv.}) \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ konv.}$
- $(L > 0 \text{ og } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty) \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$

Bevis bygger på omskrivning af sammenlignings-kriteriet, hvor L er en isolering af k

Eks. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2-3n+1}{5n^3+4n^2}$ sammenlignes med harmoniske række $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Dermed bliver $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^2-3n+1}{5n^3+4n^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3-3n^2+n}{5n^3+4n^2} = \frac{2}{5} = L$

Således vil eksemplet divergere, da sammenligningen divergere og $L > 0$

14.3.3 Kvotient-kriteriet

Hvis en ultimativ række, hvor $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ vil det gælde at:

- $0 \leq \rho < 1 \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergere
- $\rho > 1 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$
- $\rho = 1$ ingen information

14.3.4 Konvergens kritiere for ultimative positive rækker

Hvis $a_n = f(n)$ hvor f er positiv, kontinuert og aftagende, vil integralet af funktionen enten divergere eller konvergere og ligesådan vil $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ dividere eller konverger ens med funktionen.

Dette kan bevises ved at lave en nedre grænse for integralet som er summen af a_n fra $n+1$ og øvre grænse af summen a_n fra n

14.3.5 Harmoniske rækker / divergens & konvergens test

Den harmoniske serie er beskrevet som $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$

Det kan her ses at divergens test viser $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ dermed kan det ikke siges om den konvergere eller divergere. Hvis det gav over 0 ville det vides at den divergere.

Det kan dog ses ved en integral test at integralet konvergere og således må serien også konvergere eller ligesådan ved divergering

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \ln x|_1^a$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \ln a - \ln 1 = \infty - 0 = \infty$$

14.4 Divergens

Divergering er hvis en række ikke divergere.

En række kan mere specifikt divergere mod ∞ eller $-\infty$ Eks. $\{(-1)^n\} = -1, 1, -1, 1, \dots$ vil blot divergere

14.5 p-rækker

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^P}$$

Hvis $P \leq 1$ divergere mod ∞

Hvis $P > 1$ konvergere.

14.5.1 bevis

$$P \leq 1$$

$$n^P \leq n \tag{1}$$

$$\frac{1}{n^P} \geq \frac{1}{n} \tag{2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^P} = \infty \tag{3}$$

(3) da $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$ og da $\frac{1}{n} \geq \frac{1}{n^P}$
 $P > 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^P} \tag{4}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^P} dx = \int_1^{\infty} x^{-P} dx \tag{5}$$

$$= \left[\frac{x^{-P+1}}{1-P} \right]_1^{\infty} \tag{6}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{1-P}}{1-P} + \frac{1}{1-P} \tag{7}$$

$$= 0 + \frac{1}{1-P} \tag{8}$$

Da det vides at integralet for $\frac{1}{1-P}$ vil konvergere vil P-rækken også konvergere.

14.6 Regneregler for grænseværdi

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot a_n = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

Eks.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - n - 1}{5n^2 + n - 3} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}{5 + \frac{1}{n} - \frac{3}{n^2}} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}{5 + \frac{1}{n} - \frac{3}{n^2}} \\ \frac{2 - 0 - 0}{5 + 0 + 0} \\ \frac{2}{5} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0, \text{ hvis } |x| < 1$$

14.6.1 Bevis

$$\forall \epsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{Z}^+ : \forall n \geq N : |x^n| < \epsilon \quad (1)$$

$$|x^n| < \epsilon \quad (2)$$

$$|x|^n < \epsilon \quad (3)$$

$$n \ln |x| < \ln \epsilon \quad (4)$$

$$n > \frac{\ln \epsilon}{\ln |x|} \quad (5)$$

$$N = \left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln |x|} \right\rceil + 1 \quad (6)$$

$$(7)$$

Det sidste del af udtrykket kan omskrives og det ses at ved det sidste $\ln|x|$ bliver divideret vender relationstegnet, da det er negativt.

Det kan ud fra dette beskrives at N kan være den givende værdi og det dermed eksistere således at den altid vil konvergere mod 0.

Hvis x er 0 gælder beviset ikke men er ikke nødvendigt da det allerede er 0 fra starten

Dette giver også god mening at brøkker mindre end 1 vil efter nok gange multiplisering går mod 0. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$, for alle $x \in \mathbb{R}$

14.6.2 Bevis

Da $n!$ er hurtigere voksende end x^n vil det altid gå mod 0.

Selv hvis $x = \infty$ vil den stadig bliver mindre da $\infty!$ er større og dermed vil den gå mod 0.