

Một số bệnh hại chính trên cây cà phê

Bệnh gỉ sắt (*Hemileia vastatrix*)

Triệu chứng gây hại

Quan sát mặt dưới của lá cà phê bị bệnh sẽ có những chấm màu vàng lợt. Càng về sau lớp bột này có màu

vàng cam sáng và làm cháy khô tế bào lá tại vị trí có vết bệnh. Các vết cháy liên kết lại với nhau và làm cháy

toàn bộ lá, lá khô rụng.

Thư Viện(<https://primecoffea.com/thu-vien>)

Tài Nguyên(<https://primecoffea.com/tai-nguyen>)

0 đ

(<https://primecoffea.com>)

+

BLUE HARVEST EL SALVADOR

(<https://www.flickr.com/photos/133532810@N04/25207193980/in/pool2662851@N21/>)

Tác nhân gây hại

Bào tử của nấm gây bệnh *H. vastatrix* chỉ nảy mầm ký sinh gây bệnh trên lá trong điều kiện ẩm ướt, có hạt

sương – mưa.

Sự phát sinh phát triển của bệnh

Bệnh gỉ sắt (<https://primecoffea.com/tong-quan-ve-benh-gi-sat-tren-ca-phe-hemileia-vastatrix/>) chủ yếu gây

hại trên lá, rất ít khi thấy ở trên thân và quả. Bệnh phát sinh gây hại quanh năm. Tuy nhiên thời điểm gây bệnh

hại nặng nhất từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm.

Bào tử nấm bệnh *H. vastatrix* nảy mầm ở nhiệt độ 15 – 28°C (khoảng nhiệt độ thích hợp nhất 20 – 240°C) và

trong điều kiện tối, ẩm độ cao.

Biện pháp phòng trừ

Biện pháp hiệu quả nhất hiện nay là sử dụng các giống cà phê có khả năng kháng bệnh gỉ sắt cao như:

Cartimor, TR4, TR5, TR6, TR9, TR13. Cần loại bỏ ngay các cây con bị nhiễm bệnh gỉ sắt trong vườn ươm cây

giống. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất sau để phun như: Difenconazole + Propiconazole, Propiconazole, Diniconazole, Hexaconazole, Tebuconazole + Trifloxystrobin, Tetraconazole... để

phòng trừ bệnh.

Xem thêm cách phòng trừ bệnh gỉ sắt trên cà phê (<https://bacsicayxanh.vn/cay-trong/caphe/benh/benh-ri-sat-tren-ca-phe/177>)

Thư Viện(<https://primecoffea.com/thu-vien>)

Tài Nguyên(<https://primecoffea.com/tai-nguyen>)

0 đ

(<https://primecoffea.com>)

+

Bệnh thán thư (cháy lá, khô cành, khô quả, thối cuống quả)

Triệu chứng gây hại

Vết bệnh trên lá là những đốm cháy đen từ mép ngoài lá lan dần vào bên trong, có vàng tròn xếp lớp rất rõ

nét. Các vết cháy lá liên kết lại làm cho lá cháy khô hoàn toàn khi bệnh nặng. Trên quả vết bệnh có thể bắt gặp

ở bất kỳ vị trí nào trên bề mặt quả cà phê (thường gặp nhất là ở vị trí cuống quả). Cuống quả bị bệnh thường

thối đen làm rụng quả. Trong trường hợp bệnh phát triển nhanh và không phòng trị kịp thời sẽ dẫn tới hiện

tượng khô cành – khô quả.

Cây cà phê bị bệnh thán thư (cháy lá, khô cành, khô quả, thối cuống quả)

(<https://www.flickr.com/photos/195853457@N03/53310426433/in/album-72177720305384843/>)

Tác nhân gây bệnh

Nấm gây bệnh thán thư là nấm *Colletotrichum* sp – là một chi nấm cộng sinh với thực vật dưới dạng nội sinh

(sống trong thực vật) hoặc thực vật gây bệnh. Nhiều loài trong chi này là mầm bệnh thực vật, nhưng một số

loài có thể có mối quan hệ tương hỗ với vật chủ. Nó gây thối đắng trong nhiều loại cây trồng trên toàn thế giới,

đặc biệt là cây lâu năm ở các vùng nhiệt đới.

Sự phát sinh phát triển gây hại của bệnh.

Bệnh thán thư (khô quả – khô cành) thường phát sinh – phát triển trong khoảng thời gian tháng 5 – 12 hàng

năm. Gây hại nặng nhất vào tháng 9 – 11. Ban đầu, vết bệnh chỉ là chấm đen nơi cuống quả cà phê hoặc ở bất

kỳ vị trí nào của quả, sau đó lan dần và làm quả đen khô. Vết bệnh lan từ quả này sang quả khác trên chùm

quả. Thậm chí làm chùm quả khô cháy hoàn toàn. Nấm bệnh phát triển rất nhanh trong điều kiện nóng ẩm và

ở những vườn cà phê không thông thoáng.

Biện pháp phòng trừ

Thư Viện(<https://primecoffea.com/thu-vien>)

Tài Nguyên(<https://primecoffea.com/tai-nguyen>)

0 đ

(<https://primecoffea.com>)

+

Thực hiện tốt biện pháp canh tác như: làm cỏ, cắt cành tạo tán, rong tỉa cây chắn gió – che bóng,... tạo thông

thoáng vườn cây. Bón phân cân đối và hợp lý để tránh hiện tượng kiệt sức và dễ bị nhiễm bệnh trong thời kỳ

cây nuôi quả.

Trường hợp bệnh gây hại quá nặng, nên áp dụng biện pháp phun thuốc hóa học với một trong các loại thuốc

có hoạt chất như: Propineb, Tebuconazole + Trifloxystrobin, Azoxystrobin + Difenconazole, Carbendazim,

Copper Hydroxide, Difenconazole + Propiconazole... Thời điểm phun thuốc phòng bệnh thích hợp tháng 6 – 8,

phun 2 – 3 lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày.

Xem thêm cách phòng trừ bệnh thán thư trên cà phê (<https://bacsicayxanh.vn/cay-trong/caphe/benh/benh-kho-can-kho-qua-tren-cay-ca-phe/179>)

Bệnh tảo đỏ (Cephaleuros sp)

Triệu chứng gây hại

Cành cà phê bị bệnh “tảo đỏ” gây hại thường có rất nhiều chấm loang lổ (chấm bi, chấm lớn vòng tròn không

đều) xuất hiện trên mặt phía trên của cành. Quan sát kỹ có thể thấy rất nhiều hệ sợi xếp sát nhau, màu sắc của

vết bệnh có thể là xanh rêu hoặc đỏ gạch.

Tác nhân gây hại

Do tảo *Cephaleuros* sp – một chi tảo ký sinh bao gồm khoảng 14 loài. Tảo ký sinh trên một số cây trồng có giá

trị kinh tế quan trọng của vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như chè, cà phê, xoài, ổi,... gây thiệt hại giới hạn ở

diện tích tảo phát triển trên lá (đốm lá tảo), hoặc làm chết chồi non, hoặc làm biến dạng quả.

Sự phát sinh phát triển gây hại của bệnh

Bệnh “tảo đỏ” thường xuất hiện và gây hại nặng trong các tháng mùa mưa trên thân và các cành cà phê bánh

tẻ, chủ yếu ở vườn cà phê kinh doanh. Sau những ngày “mưa dầm” bệnh phát triển mạnh.

Thư Viện(<https://primecoffea.com/thu-vien>)

Tài Nguyên(<https://primecoffea.com/tai-nguyen>)

0 đ

(<https://primecoffea.com>)

+

Biện pháp phòng trừ bệnh

Thực hành tốt các biện pháp canh tác trên đồng ruộng (làm cỏ sạch, cắt cành tạo tán thích hợp, rong tủa cây

che bóng – chắn gió...) để làm thông thoáng vườn cây trong mùa mưa. Cắt bỏ các cành cà phê bị bệnh “tảo

đỏ” gây hại nặng làm khô cành. Trong trường hợp bệnh “tảo đỏ” xuất hiện và gây hại > 30% tán cây, cần phải

áp dụng biện pháp phun thuốc hóa học để phòng trị bệnh. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt

chất như: Copper Hydroxide...

Bệnh nấm hồng (*Corticium salmonicolor*)

Triệu chứng gây hại

Bệnh nấm hồng thường gây hại trên cành cà phê mang quả. Vết bệnh đầu tiên là những chấm rất nhỏ màu

trắng giống như bụi phấn. Số lượng chấm nhỏ nhiều lên và tạo thành một lớp phấn mỏng có màu hồng. Vết

bệnh thường phát triển chạy dọc theo mặt dưới của cành, cuống quả và làm cành cà phê chết khô, quả héo

rồi rụng rất nhanh.

Bệnh nấm hồng trên cành cà phê mang quả

(<https://www.flickr.com/photos/195853457@N03/53310178671/in/album-72177720305384843/>)

Tác nhân gây bệnh

Nấm gây bệnh nấm hồng là *Corticium salmonicolor*.

Sự phát sinh phát triển gây hại của bệnh nấm hồng

Nấm bệnh phát triển nhanh trong điều kiện ẩm độ cao nhưng lại yêu cầu nhiều ánh sáng. Vị trí cành cà phê bị

bệnh thường xuất hiện ở tầng giữa và tầng trên của tán cà phê. Ở Tây Nguyên, bệnh phát sinh phát triển gây

hại từ tháng 6 hàng năm và cao điểm là tháng 9 – 10. Bệnh nấm hồng thường gây hại nặng trên cà phê chè

hơn là cà phê vối.

Thư Viện(<https://primecoffea.com/thu-vien>)

Tài Nguyên(<https://primecoffea.com/tai-nguyen>)

0 đ

(<https://primecoffea.com>)

+

Biện pháp phòng trừ

Thường xuyên kiểm tra vườn cà phê để phát hiện cây bị bệnh sớm và cắt bỏ, tiêu hủy các cành bệnh kịp thời.

Có thể dùng một trong các loại thuốc có hoạt chất để phun phòng trừ bệnh như: Validamycin (Validamycin A),

Hexaconazole, Copper Hydroxide... pha theo nồng độ khuyến cáo của nhà sản xuất.

Bệnh thối nứt thân (*Fusarium* sp.)

Triệu chứng gây hại

Cây cà phê bị bệnh thối nứt thân thường phát triển kém, lá héo rũ nhanh rồi chết khô. Vết bệnh trên thân

thường bị thối nhũn, rất dễ bóc rời khỏi phần thân gỗ, mạch gỗ bị khô làm tắc đường vận chuyển nước và

dinh dưỡng trong cây. Vết bệnh có thể phát hiện ở bất cứ vị trí nào trên thân cây.

Cây cà phê bị bệnh thối nứt thân

(<https://www.flickr.com/photos/195853457@N03/53310178676/in/album72177720305384843/>)

Tác nhân gây hại

Nấm gây bệnh thối nứt thân (*Fusarium* sp.) phát tán dễ dàng trong không khí và được lan truyền nhanh nhờ

gió, nước, côn trùng,

động vật...

Sự phát sinh phát triển gây hại của bệnh

Bệnh thối nứt thân thường xuất hiện gây hại nặng trên các vườn cà phê kinh doanh không thông thoáng, ẩm

thấp, độ ẩm không khí cao trong các tháng mùa mưa. Nấm bệnh phát triển và gây hại nặng trong tháng 5 – 9

hàng năm. Nấm bệnh xâm nhập gây hại và lan truyền từ cây này sang cây khác rất nhanh.

Biện pháp phòng trừ

☞ Thư Viện(<https://primecoffea.com/thu-vien>)

☞ Tài Nguyên(<https://primecoffea.com/tai-nguyen>)

0 đ ☞

(<https://primecoffea.com>)

✚ ☞

Áp dụng tốt các biện pháp làm cành, rong tủa cây che bóng – chắn gió, làm cỏ... để vườn cây thông thoáng,

hạn chế nấm bệnh phát triển. Đầu mùa mưa hàng năm (tháng 4 – 5) nên áp dụng biện pháp quét vôi lên thân

cây cà phê cách mặt đất 40 – 60cm để phòng tránh bệnh phát triển và lây lan. Một số chế phẩm sinh học của

nấm *Trichoderma* cũng có thể được dùng để phun lên thân cây vào đầu mùa mưa để phòng tránh bệnh phát

triển và lây lan.

Kiểm tra vườn cây thường xuyên để phát hiện bệnh sớm. Nếu thấy có các vết thối trên thân dễ bóc vỏ

thân gỗ thì phải tiến hành cạo sạch phần vỏ thân bị bệnh thu gom tiêu hủy và quét thuốc hóa học lên vết cạo

để phục hồi cây. Nên dùng một trong các loại thuốc có hoạt chất như: Copper Hydroxide, Cuprous Oxide... pha

với nồng độ 1%.

Xem thêm cách phòng trừ bệnh thối/nứt thân cây cà phê (<https://bacsicayxanh.vn/cay-trong/caphe/benh/benh-nut-than-tren-cay-ca-phe/180>)

Bệnh lở cổ rễ (Rhizoctonia solani)

Triệu chứng gây hại

Bệnh lở cổ rễ xuất hiện và gây hại nhiều trên cây cà phê trong vườn ươm và cà phê kiến thiết cơ bản. Triệu

chứng điển hình của bệnh là phần cổ rễ cây cà phê thường bị thối đen và thối lại, cây héo rũ – chết.

Bệnh lở cổ rễ trên cây cà phê non

(<https://www.flickr.com/photos/195853457@N03/53310536154/in/album72177720305384843/>)

Tác nhân gây bệnh

Nấm ký sinh gây bệnh là Rhizoctonia solani.

Sự phát sinh phát triển gây hại của bệnh

Thư Viện(<https://primecoffea.com/thu-vien>)

Tài Nguyên(<https://primecoffea.com/tai-nguyen>)

0 đ

(<https://primecoffea.com>)

+

Trong vườn ươm cây giống, bệnh thường xuất hiện và gây hại nặng ở các vườn ươm có ẩm độ đất cao, ít thông

thoáng, đất trong bầu bị dít chặt và nhiều cỏ dại. Trên đồng ruộng, bệnh thường xuất hiện và gây hại nặng

trong mùa mưa (tháng 5 – 10), ở những vùng trồng cà phê trũng, ẩm thấp, đất ít được xới xáo. Nguồn bệnh có

thể bắt đầu từ các cây con đã bị bệnh trong vườn ươm hoặc từ đất trồng. Cà phê trồng trên đất pha cát dễ bị

nhễm bệnh hơn trên đất đỏ bazan. Cà phê chè mẫn cảm với nấm bệnh này hơn cà phê vối và cà phê mít.

Biện pháp phòng trừ

Trong vườn ươm cần phải lưu ý một số biện pháp kỹ thuật như: (1) Không nên tưới nước quá ẩm; (2) Không che

vườn ươm quá dày, dùng lưới che 50% ánh sáng; (3) Xới xáo bằng việc bóp bầu, luân chuyển bầu để tạo thông

thoáng trong bầu; (4) Kiểm tra và nhổ bỏ sớm các cây bị nhiễm bệnh; (5) Nên sử dụng một số chế phẩm sinh

học có nấm đối kháng Trichoderma để phun định kỳ. Khi cần sử dụng thuốc hóa học để phun, nên dùng một

trong các loại thuốc có hoạt chất: Copper Hydroxide, Cuprous Oxide...; pha theo nồng độ khuyến cáo trên bao

bì.

Trên đồng ruộng cần áp dụng một số biện pháp kỹ thuật canh tác như sau: (1) Chọn vùng đất trồng cà phê

phải có tầng canh tác dày, thoát nước tốt, mực nước ngầm thấp; (2) Sử dụng cây giống tốt không có triệu

chứng của bệnh lở cổ rễ; (3) Tránh tạo vết thương trên phần gốc cây trong quá trình làm cỏ và đánh chồi vượt

sát gốc; (4) Kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để phát hiện cây vừa chớm bị bệnh và tưới thuốc hóa học như

trên để phục hồi cây.

Bệnh vàng lá thối rễ

Triệu chứng gây hại

Bệnh vàng lá thối rễ có thể gây hại cây cà phê trong vườn ươm cho đến cà phê trưởng thành. Cây cà phê bị

nhễm bệnh có biểu hiện sinh trưởng rất kém, lá vàng úa và khô đầu lá. Triệu chứng chung trên rễ của các cây

bị bệnh là rễ có các vết thối đen hoặc rễ có những nốt sưng từ nhỏ tới lớn. Những cây cà phê bị tuyến trùng

Thư Viện(<https://primecoffea.com/thu-vien>)

☞ Tài Nguyên(<https://primecoffea.com/tai-nguyen>)

0 đ ☞

(<https://primecoffea.com>)

➤ ☞

gây hại nặng thường bị mất rễ cọc và dễ bị đổ gãy khi gặp gió. Các triệu chứng trên thường xuất hiện cục bộ

thành từng vùng trên vườn cà phê (khác với triệu chứng vàng lá toàn vườn do cây bị thiếu dinh dưỡng).

Bệnh tuyến trùng

(<https://www.flickr.com/photos/195853457@N03/53310536164/in/album72177720305384843/>)

Tác nhân gây hại

Bệnh vàng lá thối rễ cà phê được xác định nguyên nhân là do tuyến trùng (*Pratylenchus coffeae*, *Meloidogyne*

sp.,...) và nấm ký sinh gây bệnh (*Fusarium solani*, *Fusarium oxysporum*, *Rhizoctonia solani*,...). Các vết thương

hay nốt sưng trên rễ do tuyến trùng gây ra sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các loài nấm ký sinh gây bệnh tấn

công làm thối rễ cà phê.

Sự phát sinh phát triển gây hại bệnh

Bệnh vàng lá thối rễ phát sinh gây hại nặng vào thời điểm cuối mùa khô đầu mùa mưa hàng năm. Cây cà phê

trong vườn ươm thường xuất hiện bệnh gây hại ở giai đoạn 3 – 4 tháng tuổi.

Các loài tuyến trùng ký sinh gây hại cà phê chủ yếu sống trong đất và rễ cây. Trứng của tuyến trùng có thể tồn

tại rất lâu trong đất khi gặp điều kiện không thuận lợi. Ấm độ đất cao tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến trùng

phát triển mạnh. Tuy nhiên, đất quá khô hay quá ẩm cũng làm chết tuyến trùng. Đa số tuyến trùng chết ở

nhệt độ 50 – 55°C. Tưới tràn làm tuyến trùng lây lan nhanh, khó kiểm soát.

Biện pháp phòng trừ

Sử dụng một số chế phẩm sinh học có nấm *Trichoderma*, nấm *Paecilomyces lilacinus* để phòng tránh sự bùng phát gây hại bệnh vàng lá thối rễ.

Không được sử dụng đất nhiễm tuyến trùng để vào bầu ươm cây giống. Phải thay đổi vị trí của vườn ươm qua

các năm. Đất dùng vào bầu cần được xử lý để tiêu diệt nguồn tuyến trùng trong đất.

Thư Viện(<https://primecoffea.com/thu-vien>)

Tài Nguyên(<https://primecoffea.com/tai-nguyen>)

0 đ

(<https://primecoffea.com>)

+

B

Trồng cây cà phê giống khỏe mạnh và sạch nguồn tuyến trùng ký sinh. Trong trường hợp giống cây không rõ

nguồn gốc cần phải được xử lý thuốc hóa học để đảm bảo tính sạch bệnh của nguồn giống và để tiết kiệm chi

phí xử lý thuốc sau khi trồng. Xử lý các bầu cây giống bằng biện pháp tưới dung dịch thuốc trị tuyến trùng với

một trong các hoạt chất sau: Ethoprophos, Abamectin... Sau đó 2 ngày tiến hành tưới roa dung dịch thuốc trị

nấm, với một trong các loại thuốc có hoạt chất như: Copper Hydroxide, Cuprous Oxide... pha theo nồng độ

theo khuyến cáo trên bao bì. Biện pháp xử lý này cần được tiến hành 2 lần cách nhau 10 ngày.

Vườn cà phê kinh doanh bị nhiễm bệnh cần được phát hiện và xử lý thuốc hóa học kịp thời để tránh hiện

tượng lây lan. Xử lý các loại thuốc hóa học để phòng trị tuyến trùng và trị nấm như đã nói ở trên với lượng

dung dịch thuốc tưới là khoảng 3 – 4 lít/gốc cà phê, nếu thuốc trị tuyến trùng bằng hạt thì rải 50g thuốc hạt/hố trồng cà phê, rải quanh mép tán cà phê.

Nhổ bỏ cây cà phê có triệu chứng vàng lá và rễ cọc bị thối hoàn toàn. Đào và phơi hố trong mùa khô sau đó xử

lý hố trồng bằng các loại thuốc hóa học như đã nói ở trên trước khi trồng dặm 45 ngày.