

6.3.1. Bệnh lở cổ rễ

Ø Biện pháp phòng trừ

Ỗ Không tưới nước cho vườn ươm quá nhiều;

Ỗ Không che vườn quá dày ;

Ỗ Thường xuyên xới đất trong bầu để

đảm bảo thông thoáng;

Ỗ Sử dụng loại đất thoát nước tốt cho các

bầu ươm;

Ỗ Chọn lựa giống kháng bệnh đủ tiêu chuẩn;

Ỗ Thường xuyên kiểm tra vườn ươm và

vườn cây để phát hiện sớm và nhổ bỏ

cây bị bệnh;

Ỗ Tưới/phun Ginkgoic acid 425 g/lit + Corilagin 25 g/lit +

M-pentadecadienyl resorcinol 50 g/lit 2 - 3 lần, cách nhau 15 ngày.

6.3.2. Bệnh thán thư

Ø Biện pháp phòng trừ

Ỗ Biện pháp canh tác: Bón

phân đầy đủ và hợp lý cung

cấp đầy đủ dinh dưỡng cho

cây. Trồng cây che bóng với

mật độ thích hợp: Ví dụ: cây bơ,

sầu riêng trồng với khoảng

cách 20 m x 15 m. Cắt và gom

những đoạn cành bị bệnh để

tiêu hủy.

Ỗ Biện pháp sinh học: Sử dụng

một trong các loại thuốc như

Validamycin...

Ỗ Biện pháp hóa học: Sử dụng

các thuốc được phép sử dụng

trên cà phê như: Propineb;

Azoxystrobin 200 g/lit + Difenoconazole 125 g/lit; Copper

Oxychloride (min Cu 55%).

Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phê chè (Arabica) bền vững tại Việt Nam 31

6. Q

U

ẢN LÝ S

ÂU BỆNH H

AI

6.3. Các loại bệnh hại cà phê

6.3.3. Bệnh rỉ sắt

Ø Biện pháp phòng trừ

Ý Chọn giống cà phê kháng bệnh như:

TN1, TN2, THA1,...;

Ý Ghép cải tạo thay thế cây bị bệnh bằng

các giống mới có khả năng kháng bệnh

rỉ sắt;

Ý Biện pháp hóa học chỉ nên sử dụng

trong trường hợp phát sinh thành dịch;

Ý Không sử dụng những loại thuốc cấm

hoặc độc hại cao; chỉ sử dụng những loại

thuốc nằm trong danh mục cho phép

của Bộ NN&PTNT như: Hexaconazole;

Difenoconazole + Propiconazole;

Azoxystrobin+ Difenoconazole;...

6.3.4. Bệnh nấm hồng

Ø Biện pháp phòng trừ

Ý Thường xuyên tạo

hình vườn cây

thông thoáng;

Ỗ Kiểm tra thường

xuyên vườn cây

trong thời gian

mưa nhiều;

Ỗ Cắt bỏ và tiêu hủy

những cành bệnh;

Ỗ Chỉ sử dụng thuốc BVTV trong trường hợp đã phát sinh thành

dịch;

Ỗ Không sử dụng những loại thuốc cấm hoặc độc hại cao; chỉ sử

dụng những loại thuốc nằm trong danh mục cho phép của Bộ

NN&PTNT;

Ỗ Dùng thuốc “Gốc đồng” hoặc thuốc có hoạt chất Azoxystrobin

phun vào vùng bệnh 2 lần, cách nhau 7 - 10 ngày.

32 Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phê chè (Arabica) bền vững tại Việt Nam

6. Q

U

ẢN LÝ S

ÂU BỆNH H

ẠI

6.3. Các loại bệnh hại cà phê

6.3.5. Bệnh vàng lá thối rễ

Ỗ Do tuyến trùng

(*Pratylenchus coffeae*,

Pratylenchus spp.,

Meloidogyne sp.,...) và nấm

ký sinh gây bệnh (*Fusarium*

solani, *Fusarium oxysporum*,

Rhizoctonia solani,...) gây ra.

Ø Biện pháp phòng trừ

Ý Sau khi nhổ bỏ cà phê phải

cày, thu gom rễ, tiêu hủy và

luân canh cây trồng;

Ý Không sử dụng đất có nguồn

tuyến trùng để ươm cây

giống và đất cần được xử lý

bằng nhiệt (phơi, phủ ni-lon...)

hoặc thuốc sinh học, hóa học;

Ý Trong vườn ươm, cây giống cần

chăm sóc để cây sinh trưởng và phát

triển tốt, cần xử lý thuốc 2 - 3 lần,

cách nhau 1 tháng trước khi xuất

vườn 2 - 3 tháng;

Ý Trồng cây cà phê giống khỏe mạnh

và không có tuyến trùng;

Ý Sau khi trồng, bón phân đầy đủ, cân đối đồng thời tăng cường

bón phân hữu cơ, phân bón lá, nhất là các vườn liên tục cho năng

suất cao;

Ý Hạn chế xới xáo trong vườn cây bị bệnh để tránh làm tổn thương

bộ rễ, không tưới tràn;

Ý Thường xuyên kiểm tra vườn cây phát hiện kịp thời các cây bị

bệnh để có biện pháp xử lý sớm.

Ý Sử dụng kết hợp cá loại thuốc có hoạt chất như: Abamectin,

Abamectin + Thiamethoxam kết hợp với các loại thuốc trừ nấm

chứa hoạt chất như Hexaconazol, Metalaxy M 40 g/kg +

Mancozeb 640 g/kg.

Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phê chè (Arabica) bền vững tại Việt Nam 33

6. Q

U

ẢN LÝ S

ÂU BỆNH H

AI

6.3. Các loại bệnh hại cà phê

6.3.6. Bệnh thối nứt thân, cành

Ø Biện pháp phòng trừ

Ý Kiểm tra vườn thường xuyên và
phát hiện bệnh kịp thời;

Ý Nếu cây cà phê bị nhẹ, thì cạo bỏ
phần nhiễm bệnh (chú ý thu
gom và đem ra ngoài vườn tiêu
hủy);

Ý Dùng các loại thuốc gốc đồng
quét (hoặc bôi) vào vùng bệnh 2
lần (lần 2 cách lần 1 từ 7 - 10 ngày);

Ý Trường hợp cây chỉ bị khô thân
phía trên thì cưa, quét thuốc "gốc
đồng" 2 lần, cách nhau 7 - 10 ngày;

Ý Trường hợp cây bị nặng, chết khô thì nhổ bỏ đem ra khỏi lô và tiêu
hủy.

Ý Tác động phòng trừ sâu bệnh hại ảnh hưởng đến biến đổi khí
hậu?

- Sử dụng quá mức sẽ gây ô nhiễm môi trường;

- Các hoạt động lao động sản xuất sẽ sản sinh ra CO₂.

Ý Biện pháp giảm thiểu

- Áp dụng IPM trong phòng trừ sâu bệnh gây hại cà phê;

- Thực hiện Nguyên tắc 4 đúng (Đúng thuốc - Đúng lúc - Đúng

liều lượng và nồng độ - Đúng cách);

- Sử dụng giống cây kháng bệnh;

- Phương châm Phòng để Trừ.