



1. [6 Punkte] Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

- a) Zeigen Sie, dass die Spaltenvektoren von A orthogonal sind.
- b) Zeigen Sie, dass die Spaltenvektoren von A linear unabhängig sind.
- c) Geben Sie eine QR-Zerlegung von A an.

2. [6 Punkte]

- a) Finden Sie die Eigenwerte und entsprechende Eigenvektoren der Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

- b) Ist die Matrix A diagonalisierbar?

3. [6 Punkte] Sei die Matrix A gegeben durch ihre Singularwertzerlegung $A = U\Sigma V^T$ mit

$$U = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad V^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

- a) Was sind die Dimensionen, der Rang und die 2-Norm der Matrix A ?
- b) Schreiben Sie A als Summe von Rang-1-Matrizen.
- c) Geben Sie orthonormale Basen von $\text{Kern}(A)$ und $\text{Bild}(A)$ an.
- d) Lösen Sie das lineare Ausgleichsproblem $Ax = b$ mit

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$



4. [3 Punkte] Seien $\mathcal{G} = \text{span}\{1, t^2\}$ und $\mathcal{U} = \text{span}\{t, t^3\}$ zwei Vektorräume von Polynomen. Betrachten Sie die folgende Abbildung \mathcal{A} von \mathcal{G} nach \mathcal{U} :

$$\begin{aligned}\mathcal{A}: \mathcal{G} &\longrightarrow \mathcal{U} \\ x(t) &\longmapsto t \cdot x(0) + t^2 \cdot x'(t),\end{aligned}$$

das heisst, für $x \in \mathcal{G}$ ist $\mathcal{A}x \in \mathcal{U}$ gegeben durch $(\mathcal{A}x)(t) = t \cdot x(0) + t^2 \cdot x'(t)$.

- Zeigen Sie, dass \mathcal{A} eine lineare Abbildung ist.
- Durch welche Matrix A wird \mathcal{A} beschrieben bezüglich der Monomialbasis in den beiden Räumen \mathcal{G} und \mathcal{U} ?
- Zeigen Sie, dass $\{p_1, p_2\}$ und $\{q_1, q_2\}$ Basen von \mathcal{G} beziehungsweise \mathcal{U} sind, wobei

$$p_1(t) = 1 - t^2, \quad p_2(t) = 1 + t^2,$$

und

$$q_1(t) = t - t^3, \quad q_2(t) = t + t^3.$$

- Welches ist die neue Matrix B , durch die \mathcal{A} nach dem Basiswechsel in die neuen Basen $\{p_1, p_2\}$ und $\{q_1, q_2\}$ aus Teilaufgabe c) beschrieben wird?

5. [6 Punkte] Seien $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ und $B \in \mathbb{C}^{n \times m}$ beliebig, und $I_m \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $I_n \in \mathbb{C}^{n \times n}$ Identitätsmatrizen.

- Berechnen Sie

$$\begin{bmatrix} I_m & -A \\ 0 & \lambda I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix}$$

und

$$\begin{bmatrix} I_m & 0 \\ -B & \lambda I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix}.$$

- Verwenden Sie die Ergebnisse aus Teilaufgabe a) und Determinanten, um zu zeigen, dass AB und BA dieselben nicht-nullen Eigenwerte mit derselben Multiplizität haben.