

# 重庆大学《线性代数 II》课程

● A 卷

○ B 卷

2021 — 2022 学年 第 2 学期

开课学院: 数统 课程号: MATH10862 考试日期: 2022 年 06 月

考试方式: ○ 开卷 ● 闭卷 考试时间: 120 分

考试提示: 1. 严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试; 2. 考试作弊, 留校察看, 毕业当年不授学位; 请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等, 属严重作弊, 开除学籍。

温馨提示: 您所有客观题(用 2B 铅笔)和主观题的答案均应填涂或者写在答题卡指定位置, 不在指定位置答题将不会计分, 敬请您在答题卡上作答时注意字体尽量小, 节约能够使用的空间! 在该试卷纸上作答均不会计分!

一、单项选择题(客观题, 请用铅笔在答题卡方格中填涂)(每小题 3 分, 共 18 分)

1. (B) 2. (B) 3. (A) 4. (D) 5. (D) 6. (C)

二、填空题(主观题, 每小题 3 分, 共 18 分)

7. -11 8. 1 9. -1 10. 1

11. 0

12. (-3, 3)

三、判断并简述(主观题。判断对错, 若正确请给出简单证明, 若错误请给出反例或说明理由, 每小题 5 分, 共 10 分)

13. 错误(3 分), 如  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ , 但是  $AB = \begin{pmatrix} 8 & 13 \\ 19 & 31 \end{pmatrix}$

不是对称矩阵, 故不正定(5 分)。

14. 正确(3 分), 理由如下:

取  $X_1 = (1 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0)^T$ ,  $X_2 = (0 \ 1 \ 0 \ \dots \ 0)^T$ ,  $\dots$ ,  $X_n = (0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 1)^T$ ,

有  $AX_1 = AX_2 = \dots = AX_n = 0$ , 所以 A 的任一列均为零向量, 所以 A 是零矩阵(5 分)。

四、计算题(主观题, 共四题, 共 40 分)

15. (8 分)

解:

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1+a \end{vmatrix} = (4 \text{ 分}) (n+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+a & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1+a \end{vmatrix} = (6 \text{ 分}) (n+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a \end{vmatrix} = (8 \text{ 分}) a^{n-1} (n+a)$$

16. (8 分)

解: 由  $A^{-1}XA = E - A^{-1}X$  得到:

$X = E - XA^{-1}$  (注意有可能有另外的解析式出来) (2 分),

$$\text{于是, } X = (E + A^{-1})^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 \\ -3 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

17. (12 分)

解: 由于有三个线性无关的解, 那么齐次方程组有两个线性无关的解, 故  $4 - R(A) \geq 2$ , 则  $R(A) \leq 2$ , 由于 A 中有一个二阶子

式不为零, 则  $R(A) \geq 2$ , 故  $R(A) = 2$  (4 分)

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & a+1 \end{pmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 4-2a & b+4a-5 & 4-2a \end{pmatrix}$$

由方程组有解且  $R(\bar{A}) = R(A) = 2$ , 得到  $a = 2, b = -3$  (10 分)

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (11 \text{ 分})$$

$$\text{同解方程组为} \begin{cases} x_1 = -2x_3 + 4x_4 + 2 \\ x_2 = x_3 - 5x_4 - 3 \end{cases}$$

则通解为  $(2, 3, 0, 0)^T + k_1(-2, 1, 1, 0)^T + k_2(4, -5, 0, 1)^T$  (12 分)

18. (12 分)

解 : ( 1 ) 因 为

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 i \cdot j x_i x_j = x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2 + 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + 12x_2x_3$$

$$\text{故 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \text{----- (2 分)} \quad (\text{注意: 方法正确二次型第一部写}$$

错了也要给一半的方法分数)

$$(2) |A - \lambda E| = -\lambda^2(\lambda - 14)$$

故特征值为 14, 0, 0----- (6 分)

$\lambda_1 = 14$  对应的特征向量为  $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$

$\lambda_2 = \lambda_3 = 0$  对应的特征向量为  $\alpha_2 = (-2, 1, 0)^T$ ,  $\alpha_3 = (-3, 0, 1)^T$

----- (9 分)

$$\text{正交化单位化后: } e_1 = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3)^T, e_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0)^T,$$

$$e_3 = \frac{1}{\sqrt{70}}(-3, -6, 5)^T \text{----- (10 分)}$$

正交矩阵  $Q = (e_1, e_2, e_3)$ ---- (11 分),  $f$  的标准型为  $14y_1^2$ ---- (12 分)

五、证明题 (请在主观题指定区域解答) (每小题 7 分, 共 14 分)

19. (7 分)

证明: (1) 因  $\vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \vec{\alpha}_4$  线性无关, 故  $\vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$  也线性无关, 又  $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$

线性相关, 所以  $\vec{\alpha}_1$  能由  $\vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$  线性表示。

(4 分)

(2) 反证, 若  $\vec{\alpha}_4$  能由  $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$  线性表示, 利用 (1), 则  $\vec{\alpha}_4$  能由  $\vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$

线性表示，这与  $\vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \vec{\alpha}_4$  线性无关的已知矛盾。

(7 分)

20. (7 分) 证明：因为 A 正定，其特征值都是实数且为正数，  
又因为 A 为正交矩阵，那么 A 的特征值只能是  $\pm 1$  (4 分)，因此 A 相似于对角矩阵。即存在可逆矩阵

$$P, \text{使得 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} = E \quad (6 \text{ 分})$$

故  $A = P^{-1}EP = E$  (7 分)