

# 重庆大学《高等数学1》(工学类)评分参考

● A卷

○ B卷

2020—2021 学年 第1 学期

开课学院: 数统 课程号: MATH10013 考试日期: 202101

考试方式: ○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他 考试时间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

## 考试提示

1. 严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;
2. 考试作弊, 留校察看, 毕业当年不授学位; 请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等, 属严重作弊, 开除学籍。

### 一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 已知函数  $f(x)$  连续, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos[xf(x)]}{(e^{x^2} - 1)f(x)} = 1$ , 则  $f(0) =$  ( B )  
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
2. 曲线  $y = \frac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x^2)$  的斜渐近线方程为 ( A )  
A.  $y = x + \frac{\pi}{2}$ . B.  $y = x - \frac{\pi}{2}$ .  
C.  $y = -x + \frac{\pi}{2}$ . D.  $y = -x - \frac{\pi}{2}$ .
3. 设函数  $f(x)$  具有二阶连续导数, 且  $f'(0) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$ , 则 ( B )

- A.  $f(0)$  是  $f(x)$  的极大值.
- B.  $f(0)$  是  $f(x)$  的极小值.
- C.  $(0, f(0))$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点.
- D.  $f(0)$  不是  $f(x)$  的极值,  $(0, f(0))$  也不是曲线  $y = f(x)$  的拐点.

4. 设在区间  $[a, b]$  上,  $f(x) > 0$ ,  $f'(x) < 0$ ,  $f''(x) > 0$ , 令  $S_1 = \int_a^b f(x)dx$ ,  $S_2 = f(b)(b-a)$ ,  $S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$ , 则 ( C )  
A.  $S_1 < S_2 < S_3$ . B.  $S_3 < S_1 < S_2$ .  
C.  $S_2 < S_1 < S_3$ . D.  $S_2 < S_3 < S_1$ .

5. 设奇函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上具有连续导数, 则 ( A )  
A.  $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)]dt$  是奇函数. B.  $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)]dt$  是偶函数.  
C.  $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)]dt$  是奇函数. D.  $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)]dt$  是偶函数.

6. 设  $f(x)$  是闭区间  $[0, 1]$  上的连续函数, 则下列等式中, 正确的是 ( D )  
A.  $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)dx = \int_0^{\pi} f(|\cos x|)dx$ . B.  $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|\cos x|)dx$ .  
C.  $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)dx = \pi \int_0^{\pi} f(|\cos x|)dx$ . D.  $\int_0^{2\pi} f(|\cos x|)dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|\cos x|)dx$ .

### 二、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] =$  .1
2. 已知函数  $f(x)$  连续, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ , 则曲线  $y = f(x)$  上对应  $x = 0$  处的切线方程是 \_\_\_\_\_ .  $y = 2x$
3. 曲线  $y = x^2 + x (x < 0)$  曲率为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  的点的坐标是 \_\_\_\_\_ .  $(-1, 0)$

命题人:

组题人:

审题人:

命题时间:

教务处制

4. 设函数  $y = f(x)$  由方程  $\cos(xy) + \ln y - x = 1$  确定, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = \underline{\quad 2 \quad}$

5.  $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} \, dx = \underline{\quad -4\pi \quad}$

6. 设曲线  $L$  的极坐标方程为  $r = \cos 3\theta$  ( $-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$ ), 则  $L$  所围平面图形的面积为  $\underline{\quad \frac{\pi}{12} \quad}$

$\frac{\pi}{12}$

### 三、计算题 (每小题 7 分, 共 28 分)

1. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} \, dt}{x^5}$ .

解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} \, dt}{x^5} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\sin^3(1-\cos x)} \sin x}{5x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1-\cos x)^{\frac{3}{2}} x}{5x^4} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{20}. \end{aligned}$$

2. 求不定积分  $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$ .

解 令  $\sqrt{x} = t$ , 则  $x = t^2$ ,  $dx = 2t dt$ , 所以

$$\begin{aligned} \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx &= 2 \int \frac{t \arcsin t}{\sqrt{t^2(1-t^2)}} dt \\ &= 2 \int \frac{\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= 2 \int \arcsin t \, d \arcsin t \\ &= \arcsin^2 t + C \\ &= \arcsin^2 \sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

3. 求曲线  $y = xe^{-\frac{x^2}{2}}$  的拐点及凹凸区间.

解 函数  $y = xe^{-\frac{x^2}{2}}$  的定义域为  $(-\infty, +\infty)$ ,

$$y' = (1-x^2)e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad y'' = x(x^2-3)e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

令  $y'' = 0$ , 得  $x = 0$  及  $x = \pm\sqrt{3}$ .

列表讨论如下:

$x$	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, 0)$	0	$(0, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
$y''$	-	0	+	0	-	0	+
$y$	$\cap$		$\cup$		$\cap$		$\cup$

由此可知, 曲线  $y = xe^{-\frac{x^2}{2}}$  在区间  $(-\sqrt{3}, 0)$  及  $(\sqrt{3}, +\infty)$  内是凹的,

在区间  $(-\infty, -\sqrt{3})$  及  $(0, \sqrt{3})$  内是凸的.

又  $y(0) = 0$ ,  $y(-\sqrt{3}) = -\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}}$ ,  $y(\sqrt{3}) = \sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}}$ ,

所以曲线  $y = xe^{-\frac{x^2}{2}}$  的拐点为  $(0, 0)$ ,  $(\sqrt{3}, \sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$ ,  $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$ .

4. 计算无穷积分  $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$ .

解 任给  $A > 1$ , 有

$$\int_1^A \frac{\arctan x}{x^2} dx = -\frac{\arctan x}{x} \Big|_1^A + \int_1^A \frac{dx}{x(1+x^2)}.$$

其中

$$\begin{aligned}\int_1^A \frac{dx}{x(1+x^2)} &= \int_1^A \left( \frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx \\ &= \left[ \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_1^A \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{A^2}{1+A^2}.\end{aligned}$$

于是, 有

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx &= \lim_{A \rightarrow \infty} \int_1^A \frac{\arctan x}{x^2} dx \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\arctan A}{A} + \ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{A^2}{1+A^2} \right) \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.\end{aligned}$$

#### 四、综合题 (每小题 8 分, 共 16 分)

1. 设函数  $f(x)$  连续, 且  $\int_0^x tf(2x-t)dt = \frac{1}{2} \arctan x^2$ , 已知  $f(1)=1$ , 求  $\int_1^2 f(x)dx$  的值.

解 令  $u=2x-t$ , 则  $t=2x-u$ ,  $dt=-du$ .

$$\int_0^x tf(2x-t)dt = -\int_{2x}^x (2x-u)f(u)du = 2x \int_x^{2x} f(u)du - \int_x^{2x} uf(u)du,$$

于是

$$2x \int_x^{2x} f(u)du - \int_x^{2x} uf(u)du = \frac{1}{2} \arctan x^2,$$

两边对  $x$  求导得

$$2 \int_x^{2x} f(u)du = \frac{x}{1+x^4} + xf(x),$$

令  $x=1$ , 得  $\int_1^2 f(x)dx = \frac{3}{4}$ .

2. 设函数  $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt (x > 0)$ , 求  $f'(x)$ , 并求  $f(x)$  的最小值.

解 当  $0 < x \leq 1$  时,

$$\begin{aligned}f(x) &= \int_0^x |t^2 - x^2| dt + \int_x^1 |t^2 - x^2| dt \\ &= \int_0^x (t^2 - x^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt \\ &= \frac{4}{3} x^3 - x^2 + \frac{1}{3}\end{aligned}$$

当  $x > 1$  时,  $f(x) = \int_0^1 (x^2 - t^2) dt = x^2 - \frac{1}{3}$ ,

所以

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{3} x^3 - x^2 + \frac{1}{3}, & 0 < x \leq 1 \\ x^2 - \frac{1}{3}, & x > 1 \end{cases}$$

而

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{4}{3} x^3 - x^2 + \frac{1}{3} - \frac{2}{3}}{x-1} = 2, \quad f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - \frac{1}{3} - \frac{2}{3}}{x-1} = 2$$

$$\text{故 } f'(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x, & 0 < x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

由于  $f'(x) = 0$  求得唯一驻点  $x = \frac{1}{2}$ , 又  $f''\left(\frac{1}{2}\right) > 0$ , 从而  $x = \frac{1}{2}$  为  $f(x)$  的最小值点, 最小

值为  $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ .

#### 五、证明题 (每小题 7 分, 共 14 分)

1. 设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内二阶可导, 并且有  $f''(x) > 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ . 证明:

$$f(x) \geq 2x + \frac{x^2}{2}.$$

【证】 构造辅助函数

$$F(x) = f(x) - 2x - \frac{x^2}{2}.$$

由已知条件可知函数  $f(x)$  连续, 从而由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2 \Rightarrow f(0) = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 2 \Rightarrow f'(0) = 2.$$

于是对  $F(x)$  求一阶、二阶导数, 得

$$F'(x) = f'(x) - 2 - x,$$

$$F''(x) = f''(x) - 1.$$

由于  $f''(x) > 1 \Rightarrow F''(x) > 0$ , 函数  $F(x)$  为凹函数, 并且有

$$F'(0) = f'(0) - 2 = 0, \quad F(0) = 0,$$

所以  $x = 0$  是函数  $F(x)$  的极小值点, 也是最小值点, 故结论成立.

2. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上二阶连续可导, 证明: 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^3.$$

【证】 令  $x_0 = \frac{a+b}{2}$ , 设  $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$ , 则  $F(x_0) = 0$ , 且有

$$F(a) = f(x_0)(a - x_0) + \frac{f'(x_0)}{2!}(a - x_0)^2 + \frac{f''(\xi_1)}{3!}(a - x_0)^3, \text{ 其中 } \xi_1 \in (a, x_0).$$

$$F(b) = f(x_0)(b - x_0) + \frac{f'(x_0)}{2!}(b - x_0)^2 + \frac{f''(\xi_2)}{3!}(b - x_0)^3, \text{ 其中 } \xi_2 \in (x_0, b).$$

$$F(b) - F(a) = f(x_0)(b - a) + \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{48}(b - a)^3.$$

由  $f''(x)$  在  $[\xi_1, \xi_2] \subset (a, b)$  上连续, 由介值定理得  $\exists \xi \in [\xi_1, \xi_2] \subset (a, b)$ , 使得

$$f''(\xi) = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2}, \text{ 代入即可知结论成立.}$$

## 六、应用题 (共 6 分)

1. 一个容器可以看成是由  $y = x^2$  绕  $y$  轴旋转而成, 其容积为  $72\pi \text{ m}^3$ , 其中盛满水, 水的密度为  $\gamma$ , 现将水从容器中抽出  $64\pi \text{ m}^3$ , 问需要作多少功?

解 建立坐标系, 设容器的深度为  $h$ .

任取小区间  $[y, y + dy] \subset [0, h]$ , 于是体积元素

$$dV = \pi x^2 dy = \pi y dy$$

故容器的体积为

$$V = \pi \int_0^h y dy = \frac{\pi}{2} h^2.$$

当  $V = 72\pi \text{ m}^3$  时, 由  $72\pi = \frac{\pi}{2} h^2$  可得  $h = 12$ ;

当  $V = 72\pi - 64\pi = 8\pi \text{ m}^3$  时, 由  $8\pi = \frac{\pi}{2} h^2$  可得  $h = 4$ ;

于是功元素  $dW = g\gamma(12 - y)\pi y dy$ , 故所求的功为

$$W = g\gamma\pi \int_4^{12} y(12 - y) dy = \frac{640}{3} \pi g\gamma.$$