

重庆大学《高等数学 II-2》课程试卷

● A卷

○ B卷

2022 — 2023 学年 第 2 学期

开课学院: 数统 课程号: MATH10822 考试日期: 2023.06

考试方式: ○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他 考试时间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1. 严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;
2. 请人代考、替他人考试、使用通讯设备作弊情节严重、两次及以上作弊等, 属严重作弊, 开除学籍。

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为非零向量, 则与 \vec{a} 不垂直的向量是 (D)

- A. $(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$. B. $\vec{b} - \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \vec{a}$.
- C. $\vec{a} \times \vec{b}$. D. $\vec{a} + (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{a}$

2. 已知 $f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^4}$, 则 (C)

- A. $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 都存在 B. $f'_x(0, 0)$ 存在但 $f'_y(0, 0)$ 不存在
- C. $f'_x(0, 0)$ 不存在但 $f'_y(0, 0)$ 存在 D. $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 都不存在

3. 设 C 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其周长为 L , 则 $\oint_C (bx + ay)^2 ds =$ (A)

- A. $a^2 b^2 L$. B. $(a+b)L$. C. $(a^2 + b^2)L$. D. abL .

4. 设 $f(x)$ 有连续的导数, $f(0) = 0$, 区域 Ω 由柱面 $x^2 + y^2 = t^2 (t > 0)$ 和两

平面 $z = 0, z = 1$ 所围成, 则 $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{t^4} \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2) dv =$ (B)

- A. $\frac{\pi}{3} f'(0)$ B. $\frac{\pi}{2} f'(0)$ C. $\frac{2\pi}{3} f'(0)$ D. $\frac{4\pi}{5} f'(0)$

5. 设 $u_n = (-1)^n \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$, 则级数 (C)

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛 B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散
- C. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散 D. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

6. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则极坐标二次积分

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr =$ (C)

- A. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$. B. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.
- C. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$. D. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$.

二、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

7. 设 \vec{n} 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处的指向外侧的法向量, 则函数

命题人:

组题人:

审题人:

命题时间:

教务处制

$u = \frac{xy}{z}$ 在此处沿方向 \vec{n} 的方向导数为_____ . $\frac{4}{\sqrt{14}} = \frac{2}{7}\sqrt{14}$

8. 函数 $f(x) = \arctan x$ 展开式为 x 的幂级数为_____ . $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, x \in (-1, 1)$

(若为批注收敛域也给分)

9. 函数 $f(x, y) = 2x - y + 1$ 满足方程 $x^2 + y^2 = 5$ 的条件极大值为_____ . 6

10. 设 L 为逆时针圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 则曲线积分

$$\int_L xdy - 2ydx = \frac{3\pi}{2}$$

11. 设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 则 $\oiint_{\Sigma} (x+y)dS = \frac{0}{1}$

12. 已知一阶线性方程 $y' + p(x)y = 2xe^x$ 有特解 $y = x^2e^x$, 则该微分方程的

通解为_____ . $y = e^x(c + x^2) = ce^x + x^2e^x$

三、计算题 (每小题 7 分, 共 28 分)

13. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处切线和法平面方程.

解: 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处法向量为 $\vec{n}_1 = \{1, -2, 1\}$,

曲面 $x + y + z = 0$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 1, 1\}$,

则 $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \{-3, 0, 3\} = 3\{-1, 0, 1\}$ 为曲线的切向量, 故

$$\text{切线方程为 } \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{1}$$

法平面方程为 $-(x-1) + 0(y+2) + (z-1) = 0$, 即 $x - z = 0$.

14. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1}$ 的收敛域及和函数.

解: 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^n}{(n+1)2^{n+1}} \cdot \frac{n2^n}{x^{n-1}} \right| = \frac{1}{2}|x| < 1$ 知, 幂级数在 $|x| < 2$ 内收敛.

当 $x = -2$ 时, 原级数 $= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} (-2)^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n}$ 收敛,

当 $x = 2$ 时, 原级数 $= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} \cdot 2^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n}$ 发散, 故收敛域为 $[-2, 2)$.

当 $x = 0$ 时, $S(0) = \frac{1}{2}$.

当 $x \neq 0$ 时,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} x^n = \frac{1}{x} S(x)$$


$$S'(x) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} x^n \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} x^{n-1} = \frac{1}{2-x},$$

$$\text{于是 } S(x) = \int_0^x \frac{dt}{2-t} = \ln 2 - \ln(2-x)$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = 0 \\ \frac{\ln 2 - \ln(2-x)}{x}, & x \neq 0 \end{cases}$$

15. 求 $\iint_D |\sin(x-y)| dx dy$, 其中 $D = \left\{ (x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq \frac{\pi}{2} \right\}$.

解: 如图, 用直线 $x-y=0$ 将区域 D 划分 D_1, D_2 , 则

$$\begin{aligned} \iint_D |\sin(x-y)| dx dy &= \iint_{D_1} \sin(x-y) dx dy \\ &\quad - \iint_{D_2} \sin(x-y) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} dy \int_y^{\frac{\pi}{2}-y} \sin(x-y) dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} dx \int_x^{\frac{\pi}{2}-x} \sin(x-y) dy \\ &= -\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(x-y) \Big|_y^{\frac{\pi}{2}-y} dy - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(x-y) \Big|_x^{\frac{\pi}{2}-x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \sin 2y) dy + \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \sin 2x) dx \\ &= 2 \left[y + \frac{1}{2} \cos 2y \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$


16. 设 $f(u)$ 具有连续的二阶导数, 函数 $z = f(e^y \sin x)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{3y} \sin x$, 求

$f(u)$ 的表达式。

解: 记 $u = e^y \sin x$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) e^y \cos x, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u) e^{2y} \cos^2 x - f'(u) e^y \sin x$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) e^y \sin x, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) e^{2y} \sin^2 x + f'(u) e^y \sin x$$

代入 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{3y} \sin x$, 可得

$$e^{2y} f''(u) = e^{3y} \sin x \Rightarrow f''(u) = u \Rightarrow f'(u) = \frac{1}{2} u^2 + C_1 \Rightarrow f(u) = \frac{1}{6} u^3 + C_1 u + C_2$$

四、综合题 (每小题 9 分, 共 18 分)

17. 设 $f(x)$ 具有连续的二阶导数, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 若使得曲线积分

$$\int_C [2f(x) + 3f'(x) - xe^{-2x}] y dx - f'(x) dy$$
 与路径无关, 求函数 $f(x)$.

解: 由已知 $2f(x) + 3f'(x) - xe^{-2x} = -f''(x)$

$$\text{即 } f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) = xe^{-2x}$$

对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = -1, \lambda = -2$

对应齐次方程的通解为 $f(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$

因 $\alpha = -2$ 是特征方程的单根, 方程的特解可设为 $f^*(x) = x(ax+b)e^{-2x}$, 代入原方程

可得 $a = -\frac{1}{2}, b = -1$, 即特解为 $f^*(x) = -(\frac{1}{2}x^2 + x)e^{-2x}$

于是 $f(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} - (\frac{1}{2}x^2 + x)e^{-2x}$ 。

由初始条件, 可得 $C_1 + C_2 = 0, -C_1 - 2C_2 - 1 = 0 \Rightarrow C_1 = 1, C_2 = -1$

从而满足题设条件的 $f(x) = e^{-x} - e^{-2x} - (\frac{1}{2}x^2 + x)e^{-2x}$ 。

18. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy$, 其中 Σ 是曲面

$z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧。

解: 取 Σ_1 为 xoy 面上被圆 $x^2 + y^2 = 1$ 所围部分的下侧, 记 Ω 是由 Σ 与 Σ_1 所围的空间区域, 则

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma + \Sigma_1} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy \\ &= \iint_{\Sigma_1} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy \end{aligned}$$

由高斯公式得

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2-1) dxdy &= \iiint_{\Omega} (6x^2 + 6y^2 + 6z) dxdydz \\ &= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{1-\rho^2} (\rho^2 + z) dz \\ &= 12\pi \int_0^1 \left[\frac{1}{2} \rho(1-\rho^2)^2 + \rho^3(1-\rho^2) \right] d\rho = 2\pi \end{aligned}$$

$$\text{而 } \iint_{\Sigma_1} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2-1) dxdy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-3) dxdy = 3\pi$$

$$\text{故 } I = 2\pi - 3\pi = -\pi.$$

五、证明题（共 9 分）

19. 设 L 是圆周 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = 1$ 的逆时针方向, $f(x)$ 恒正且连续, 试证

$$\oint_L xf(y)dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi.$$

证: 设 L 所围成的平面区域为 D , 并注意 D 关于直线 $y=x$ 对称, 先用格林公式, 再用对称性。有

$$\begin{aligned} \oint_L xf(y)dy - \frac{y}{f(x)} dx &= \iint_D \left[f(y) + \frac{1}{f(x)} \right] dxdy \\ &= \iint_D f(y) dxdy + \iint_D \frac{1}{f(x)} dxdy = \iint_D f(x) dxdy + \iint_D \frac{1}{f(x)} dxdy \\ &= \iint_D \left[f(x) + \frac{1}{f(x)} \right] dxdy \geq \iint_D 2 dxdy = 2\pi. \end{aligned}$$

六、应用题（共 9 分）

20. 设物体占有区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz, R > 0\}$, 物体的体密度

$$\mu = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \text{ 求物体的质心.}$$

解: 物体的质量

$$\begin{aligned} m &= \iiint_{\Omega} \mu dv = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2R\cos\varphi} r \cdot r^2 \sin\varphi dr \\ &= 8\pi R^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi \sin\varphi d\varphi = \frac{8}{5} \pi R^4 \end{aligned}$$

对 xoy 面的静力矩

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iiint_{\Omega} z \mu dv = \iiint_{\Omega} z \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dv \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2R\cos\varphi} r \cos\varphi \cdot r \cdot r^2 \sin\varphi dr \\ &= \frac{64}{5} \pi R^5 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 \varphi \sin\varphi d\varphi = \frac{64}{35} \pi R^5 \end{aligned}$$

设质心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性知 $\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = \frac{M_{xy}}{m} = \frac{8}{7} R$ 。