

Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla celów globalnych



Nazwa wskaźnika	3.8.1 Wskaźnik pokrycia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
Cel Zrównoważonego Rozwoju	Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia
Zadanie	3.8 Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych cenowo lekarstw i szczepionek
Definicja wskaźnika	Pokrycie podstawowych usług zdrowotnych jest definiowane jako średni zakres podstawowych usług opartych na wybranych rodzajach interwencji, które obejmują: zdrowie reprodukcyjne, macierzyństwo, noworodki i dzieci, choroby zakaźne, choroby niezakaźne oraz możliwości i dostęp do usług w populacji ogólnej i znajdującej się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.
Jednostka prezentacji	[0 – 100]
Dostępne wymiary	
Wyjaśnienia metodologiczne	Wskaźnik jest prezentowany w skali od 0 do 100 i jest obliczany jako średnia geometryczna z 14 wskaźników dot. pokrycia świadczeń zdrowotnych. Wskaźniki te są uporządkowane według czterech kategorii pokrycia usług:
	I. Zdrowie reprodukcyjne, zdrowie matki, noworodka i dziecka
	 Planowanie rodziny: Odsetek kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) zamężnych lub pozostających w związkach, których potrzeba planowania rodziny jest satysfakcjonująca, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod. Ciąża i opieka w trakcie porodu: Odsetek kobiet w wieku 15-49 lat, które urodziły żywe dziecko i które otrzymały opiekę przedporodową cztery lub więcej razy. Szczepienia dzieci: Odsetek niemowląt, które otrzymały trzy dawki szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi. Leczenie dzieci: Odsetek dzieci w wieku poniżej 5 roku życia z podejrzeniem zapalenia płuc (kaszel i trudności w oddychaniu, które nie są spowodowane problemami klatki piersiowej i zatkanego nosa) w ciągu 2 tygodni poprzedzających badanie, skierowanych do odpowiedniej placówki służby zdrowia lub świadczeniodawcy.
	II. Choroby zakaźne
	 Gruźlica: Odsetek przypadków gruźlicy, które są wykrywane i skutecznie leczone. HIV/AIDS: Odsetek osób żyjących z HIV, objętych obecnie terapią antyretrowirusową. Malaria: Odsetek ludności na obszarach zagrożonych malarią, która poprzedniej nocy spała pod siatką nasączoną środkami owadobójczymi (dotyczy tylko krajów o wysokiej zachorowalności na malarię). Woda i kanalizacja: Odsetek gospodarstw domowych, korzystających co najmniej z podstawowych urządzeń sanitarnych.
	III. Choroby niezakaźne
	 Nadciśnienie tętnicze: Występowanie niedociśnienia tętniczego u osób dorosłych (w wieku 18 lat i starszych), standaryzowane pod względem wieku. Cukrzyca: Standaryzowany względem wieku średni poziom glukozy w osoczu na czczo (mmol/l) dla osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych. Tytoń: Standaryzowane pod względem wieku rozpowszechnienie wśród osób dorosłych w wieku 15 lat i więcej niepalenia tytoniu w ciągu ostatnich 30 dni.
	IV. Wydajność i dostęp do usług
	12. Dostęp do szpitali: Liczba łóżek szpitalnych na jednego mieszkańca, w odniesieniu



Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla celów globalnych



	do maksymalnego progu 18 łóżek na 10 tys. mieszkańców. 13. Pracownicy służby zdrowia: Liczba pracowników służby zdrowia (lekarze, psychiatrzy i chirurdzy) na jednego mieszkańca, w odniesieniu do maksymalnych progów dla każdej kadry. 14. Bezpieczeństwo zdrowotne: Wskaźnik zdolności podstawowej wg Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (International Health Regulations - IHR), będący średnią z atrybutów 13 podstawowych zdolności, które zostały osiągnięte.
Źródło danych	Światowa Organizacja Zdrowia
Częstotliwość i dostępność danych	Dane co kilka lat, od 2010 r. (w zależności od dostępu danych)
Uwagi	'Dane szacunkowe, obliczone przez WHO.'

Ostatnia aktualizacja: 15-03-2022, 10:26