

## Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla celów globalnych



| Nazwa wskaźnika                      | 3.b.1 Odsetek ludności objętej docelowo wszystkimi szczepieniami przewidzianymi w krajowym programie szczepień   |
|--------------------------------------|--|
| Cel Zrównoważonego<br>Rozwoju        | cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia  |
| Zadanie                              | 3.b Wspierać badania nad oraz opracowanie nowych szczepionek i lekarstw przeciwko chorobom zakaźnym i niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnić dostęp do podstawowych lekarstw i szczepionek po przystępnej cenie, zgodnie z Deklaracją z Doha dotyczącą Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej i Zdrowia Publicznego (Doha Declaration on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Public Health), które potwierdza prawo krajów rozwijających się do korzystania w pełni z postanowień Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS Agreement) w zakresie swobody ochrony zdrowia publicznego i w szczególności zapewnienia wszystkim dostępu do lekarstw.  |
| Definicja wskaźnika                  | Odsetek ludności objętej docelowo wszystkimi szczepieniami przewidzianymi w krajowym programie szczepień.  |
| Jednostka prezentacji                | procent [%]  |
| Dostępne wymiary                     | rodzaj szczepienia   |
| Wyjaśnienia<br>metodologiczne        | Wskaźnik pozwala na ocenę dostępu do szczepionek, w tym do szczepionek nowo dostępnych lub niewykorzystywanych na poziomie krajowym.  Pod uwagę brane są następujące szczepionki:  • DTP3 - trzecia dawka szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi; dane prezentują odsetek niemowląt, które otrzymały 3. dawkę szczepionki zgodnie z harmonogramem zalecanym w kraju w ramach rutynowych szczepień w danym roku,  • MCV2 - druga dawka szczepienia preparatami zawierającymi wirusa odry; dane dot. odsetka dzieci, które otrzymały dwie dawki szczepionki przeciw odrze zgodnie z harmonogramem zalecanym w kraju w ramach rutynowych szczepień w danym roku,  • PCV3 - trzecia, ostatnia dawka szczepienia przeciw pneumokokom; dane prezentują odsetek niemowląt, które otrzymały zalecane na poziomie krajowym trzy dawki skoniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom w danym roku,  • HPV - szczepionka (ostatnia dawka w harmonogramie) przeciwko HPV (wirus brodawczaka ludzkiego); dane prezentują odsetek dziewcząt w wieku 15 lat, które otrzymały zalecane dawki szczepionki przeciwko HPV. |
| Źródło danych                        | WHO  |
| Częstotliwość<br>i dostępność danych | Dane roczne; od 2010 r. (dla PCV3 – od 2018 r.).   |
| Uwagi                                | Dane szacunkowe, obliczone przez WHO. Dla szczepienia przeciwko HPV, brak szacunków dla Polski.  |

Ostatnia aktualizacja: 25-10-2022, 11:46