

## Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla celów globalnych



| Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia   |
|---|
| 3.8 Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym, dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz bezpiecznych, skutecznych, wysokiej jakości, przystępnych cenowo lekarstw i szczepionek   |
| Pokrycie podstawowych usług zdrowotnych jest definiowane jako średni zakres podstawowych usług opartych na wybranych rodzajach interwencji, które obejmują: zdrowie reprodukcyjne, macierzyństwo, noworodki i dzieci, choroby zakaźne, choroby niezakaźne oraz możliwości i dostęp do usług w populacji ogólnej i znajdującej się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.   |
| [0 – 100]   |
|   |
| Wskaźnik jest prezentowany w skali od 0 do 100 i jest obliczany jako średnia geometryczna z 14 wskaźników dot. pokrycia świadczeń zdrowotnych. Wskaźniki te są uporządkowane według czterech kategorii pokrycia usług:  |
| I. Zdrowie reprodukcyjne, zdrowie matki, noworodka i dziecka  |
| <ol> <li>Planowanie rodziny: Odsetek kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) zamężnych lub pozostających w związkach, których potrzeba planowania rodziny jest satysfakcjonująca przy wykorzystaniu nowoczesnych metod.</li> <li>Ciąża i opieka w trakcie porodu: Odsetek kobiet w wieku 15-49 lat, które urodziły żywe dziecko i które otrzymały opiekę przedporodową cztery lub więcej razy.</li> <li>Szczepienia dzieci: Odsetek niemowląt, które otrzymały trzy dawki szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi.</li> <li>Leczenie dzieci: Odsetek dzieci w wieku poniżej 5 roku życia z podejrzeniem zapalenia płuc (kaszel i trudności w oddychaniu, które nie są spowodowane problemami klatki piersiowej i zatkanego nosa) w ciągu 2 tygodni poprzedzających badanie, skierowanych do odpowiedniej placówki służby zdrowia lub świadczeniodawcy.</li> </ol> |
| II. Choroby zakaźne   |
| <ol> <li>Gruźlica: Odsetek przypadków gruźlicy, które są wykrywane i skutecznie leczone.</li> <li>HIV/AIDS: Odsetek osób żyjących z HIV, objętych obecnie terapią antyretrowirusową.</li> <li>Malaria: Odsetek ludności na obszarach zagrożonych malarią, która poprzedniej nocyspała pod siatką nasączoną środkami owadobójczymi (dotyczy tylko krajów o wysokiej zachorowalności na malarię).</li> <li>Woda i kanalizacja: Odsetek gospodarstw domowych, korzystających co najmniej z podstawowych urządzeń sanitarnych.</li> </ol>   |
| III. Choroby niezakaźne   |
| <ol> <li>Nadciśnienie tętnicze: Występowanie niedociśnienia tętniczego u osób dorosłych (w wieku 18 lat i starszych), standaryzowane pod względem wieku.</li> <li>Cukrzyca: Standaryzowany względem wieku średni poziom glukozy w osoczu na czczo (mmol/l) dla osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych.</li> <li>Tytoń: Standaryzowane pod względem wieku rozpowszechnienie wśród osób dorosłych w wieku 15 lat i więcej niepalenia tytoniu w ciągu ostatnich 30 dni.</li> </ol>  |
|   |
| IV. Wydajność i dostęp do usług   |
|   |



## Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla celów globalnych



|                                      | do maksymalnego progu 18 łóżek na 10 tys. mieszkańców.  13. Pracownicy służby zdrowia: Liczba pracowników służby zdrowia (lekarze, psychiatrzy i chirurdzy) na jednego mieszkańca, w odniesieniu do maksymalnych progów dla każdej kadry.  14. Bezpieczeństwo zdrowotne: Wskaźnik zdolności podstawowej wg Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych ( <i>International Health Regulations</i> - IHR), będący średnią z atrybutów 13 podstawowych zdolności, które zostały osiągnięte. |
|--------------------------------------|---|
| Źródło danych                        | WHO   |
| Częstotliwość<br>i dostępność danych | Dane co kilka lat, od 2010 r. (w zależności od dostępu danych)  |
| Uwagi                                | 'Dane szacunkowe, obliczone przez WHO.'   |

Ostatnia aktualizacja: 25-07-2023, 10:50