# Тест к воркшопу по аналитической геометрии

- 1. Дать определение:
  - а) ЛНЗ система: \_\_\_\_\_
  - b) ЛЗ система: \_\_\_\_\_
  - с) базис: \_\_\_\_\_
  - d) система координат: \_\_\_\_\_
- 2. Запишите условия компланарности и коллинеарности векторов  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)^T$ и  $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)^T$  (с помощью детерминанта):

3. Является ли система векторов базисом в пространстве (а) / на плоскости (b, c)?

(a) 
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$
,  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  (b)  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  (c)  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 

(b) 
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 

(c) 
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
,  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 

- 4. Известно, что система векторов  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  состоит из трех попарно неколлинеарных компланарных векторов. Выберите верные утверждения:
  - а) система  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  линейно зависима;
  - b) система  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  линейно независима;
  - с) система  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  образует базис в пространстве;
  - d) система  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  образует базис на плоскости, образованной векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ ;
  - е) система  $\vec{a}, \vec{c}$  образует базис на плоскости, образованной векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}.$
- 5. Определите, являются ли компланарными векторы

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

## Задания к воркшопу по аналитической геометрии

#### Базовые обязательные задания

1. Вычислить линейные комбинации:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

2. Найти произведения матриц:

$$\begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}^{10} =$$

3. Найдите транспонированные матрицы:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n-1} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{1} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{2}$$

4. Вычислите детерминанты:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 8000 & 1 & -1 \\ -101 & 1 & 0 \\ 10 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

5. Решите систему линейных уравнений, пользуясь правилом Крамера:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ 3x + y - 2z = 3 \\ x + z = 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ x + y + z = 0 \\ y + z = 1 \end{cases}$$

6. Вычислите:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad (A^3 - 4B) =$$

7. Используя свойства детерминанта, вычислите:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

### Дополнительные индивидуальные задания

1. Вычислите детерминант выражения:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\det(A^3 - A^2B + ABA - AB^2) =$$

2. Найдите количество решений системы линейных уравнений при различных  $\alpha$ :

$$\begin{cases} \alpha x + 4y = 2 + \alpha \\ x + \alpha y = 2 \end{cases}$$

# Тест к воркшопу по аналитической геометрии

- 1. Дать определение:
  - а) ЛНЗ система: \_\_\_\_\_
  - b) ЛЗ система: \_\_\_\_\_
  - с) базис: \_\_\_\_\_
  - d) система координат: \_\_\_\_\_
- 2. Запишите условия компланарности и коллинеарности векторов  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)^T$ и  $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)^T$  (с помощью детерминанта):

3. Является ли система векторов базисом в пространстве (а) / на плоскости (b, c)?

(a) 
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$
,  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  (b)  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  (c)  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 

(b) 
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 

(c) 
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
,  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 

- 4. Известно, что система векторов  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  состоит из трех попарно неколлинеарных компланарных векторов. Выберите верные утверждения:
  - а) система  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  линейно зависима;
  - b) система  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  линейно независима;
  - c) система  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  образует базис в пространстве;
  - d) система  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  образует базис на плоскости, образованной векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ ;
  - е) система  $\vec{a}, \vec{c}$  образует базис на плоскости, образованной векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ .
- 5. Определите, являются ли компланарными векторы

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

## Задания к воркшопу по аналитической геометрии

#### Базовые обязательные задания

1. Вычислить линейные комбинации:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

2. Найти произведения матриц:

$$\begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}^{10} =$$

3. Найдите транспонированные матрицы:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} 0 & \lambda_{1} \\ \lambda_{n-1} & 0 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} \lambda_{1} \\ \lambda_{n} & 0 \end{pmatrix}^{T}$$

4. Вычислите детерминанты:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 8000 & 1 & -1 \\ -101 & 1 & 0 \\ 10 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

5. Решите систему линейных уравнений, пользуясь правилом Крамера:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ 3x + y - 2z = 3 \\ x + z = 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ x + y + z = 0 \\ y + z = 1 \end{cases}$$

6. Вычислите:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad (A^3 - 4B) =$$

7. Используя свойства детерминанта, вычислите:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

### Дополнительные индивидуальные задания

1. Вычислите детерминант выражения:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(A^3 - A^2B + ABA - AB^2) =$$

2. Найдите количество решений системы линейных уравнений при различных  $\alpha$ :

$$\begin{cases} \alpha x + 4y = 2 + \alpha \\ x + \alpha y = 2 \end{cases}$$