

中山大学

2017 年港澳台人士攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 630

科目名称: 临床护理

考试时间: 4 月 9 日上午

考生须知

全部答案一律写在答题纸上, 答在试题纸上的不计分! 答题要写清题号, 不必抄题。

一、单选题 (每题 1 分, 共 70 分)

1. 引起呼吸系统疾病最常见的病因是

- A. 吸烟 B. 肿瘤 C. 感染 D. 变态反应 E. 理化因素

2. 痰液黏稠不易咳出者的促进排痰措施为

- A. 指导有效咳嗽 B. 湿化呼吸道 C. 拍背致胸壁震荡 D. 体位引流
E. 机械排痰

3. 支气管哮喘的主要临床表现是

- A. 吸气性呼吸困难伴“三凹征” B. 发作性呼吸困难伴窒息感
C. 反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难 D. 带哮鸣音的混合性呼吸困难
E. 呼吸困难伴哮鸣音

4. 阻塞性肺气肿病人做腹式呼吸锻炼, 哪项不正确

- A. 吸气时挺腹, 呼气时收腹 B. 用鼻吸气, 用口呼气
C. 吸气时间长, 呼气时间短 D. 每分钟呼吸 7-8 次
E. 每次进行 10-20 分钟

5. 治疗肺炎球菌肺炎首选药物是

- A. 头孢霉素 B. 林可霉素 C. 链霉素 D. 青霉素 E. 氯霉素

6. 肺结核诊断最可靠的依据是

- A. 胸部 X 线片 B. 胸部 CT 检查 C. 红细胞沉降率 D. 痰结核菌检查
E. 结核菌素试验

7. 李先生, 60 岁。平素身体健康, 吸烟史 20 年, 平均 20 支/日以上, 突然咯血 30 ml 后无其他不适, 护理体检未发现异常, 为排除肺癌住院, 明确诊断一般简单有效的方法是

- A. 血沉 B. 血甲胎蛋白测定 C. 痰脱落细胞检查
D. 颈淋巴结活检 E. 纤维支气管镜检查

8. 符合 II 型呼吸衰竭诊断标准的血气分析检查结果是

- A. $\text{PaO}_2 40 \text{ mmHg}$; $\text{PaCO}_2 30 \text{ mmHg}$ B. $\text{PaO}_2 50 \text{ mmHg}$; $\text{PaCO}_2 60 \text{ mmHg}$
C. $\text{PaO}_2 70 \text{ mmHg}$; $\text{PaCO}_2 30 \text{ mmHg}$ D. $\text{PaO}_2 60 \text{ mmHg}$; $\text{PaCO}_2 30 \text{ mmHg}$
E. $\text{PaO}_2 45 \text{ mmHg}$; $\text{PaCO}_2 45 \text{ mmHg}$

9. 心源性呼吸困难最先出现的是

- A. 端坐呼吸 B. 阵发性夜间呼吸困难 C. 劳力性呼吸困难
D. 心源性哮喘 E. 急性肺水肿

考试完毕, 试题随答题纸一起交回。

第 1 页 共 7 页

10. 使用洋地黄类药物时应重点监测
A. 体温 B. 脉搏 C. 呼吸 D. 血压 E. 血氧饱和度
11. 患者, 男, 69岁, 高血压心脏病10年, 近一年来患者明显感觉体力活动受限, 洗脸刷牙即可引起呼吸困难、心悸, 此患者目前心功能处于
A. 代偿期 B. I级 C. II级 D. III级 E. IV级
12. 控制心绞痛发作的首选药物是
A. 地西泮 B. 双嘧达莫 C. 硝酸甘油 D. 复方丹参 E. 阿司匹林
13. 某男, 50岁。突感胸骨后压榨性疼痛, 伴出汗、恶心, 含硝酸甘油休息后仍不缓解, 临床诊断最大可能是
A. 高血压性心脏病 B. 心绞痛 C. 心肌炎 D. 急性心肌梗死 E. 充血性心衰竭
14. 1999年WHO/ISH对一级高血压的诊断标准是
A. 收缩压 $< 120\text{mmHg}$, 舒张压 $< 80\text{mmHg}$
B. 收缩压 $< 130\text{mmHg}$, 舒张压 $< 85\text{mmHg}$
C. 收缩压 $140\sim 159\text{mmHg}$, 舒张压 $90\sim 99\text{mmHg}$
D. 收缩压 $130\sim 139\text{mmHg}$, 舒张压 $85\sim 89\text{mmHg}$
E. 收缩压 $160\sim 179\text{mmHg}$, 舒张压 $100\sim 109\text{mmHg}$
15. 严重呕血病人饮食护理正确的是
A. 暂禁食 B. 温热的流食 C. 温凉的流食 D. 软食 E. 普食
16. 柏油样大便见于
A. 十二指肠溃疡出血 B. 溃疡性结肠炎 C. 痢疾 D. 结肠癌 E. 胃穿孔
17. 胃溃疡节律性疼痛的特点
A. 空腹痛 B. 餐时痛 C. 夜间痛 D. 餐后 $0.5\sim 1$ 小时痛 E. 餐后 $3\sim 4$ 小时痛
18. 肝硬化病人进食时应细嚼慢咽, 必要时药物应研成粉末服用, 其目的是
A. 易消化 B. 以免引起食管—胃底静脉曲张破裂出血
C. 以防耗氧增加, 诱发肝性脑病 D. 以免加重腹水 E. 便于下咽
19. 某肝硬化病人合并上消化道大出血, 现出现嗜睡, 扑翼样震颤, 应判断为
A. 继发性肝癌 B. 电解质紊乱 C. 肝肾综合征 D. 肝性脑病 E. 感染
20. 急性胰腺炎患者禁食、胃肠减压主要目的是
A. 防止感染扩散 B. 减少胃酸分泌 C. 减少胰液分泌 D. 避免胃扩张 E. 减轻腹痛
21. 上消化道出血病因诊断的首选检查为
A. X线钡餐造影 B. 选择性动脉造影 C. 内镜检查 D. 大便隐血试验 E. 吞线试验
22. 患者女性, 50岁, 患慢性肾小球肾炎20年, 近来精神萎靡、食欲差, 24小时尿量 80ml , 下腹部空虚, 无胀痛, 请评估该病人的排尿形态为
A. 尿潴留 B. 尿失禁 C. 少尿 D. 无尿 E. 排尿正常
23. 慢性肾小球肾炎护理措施, 错误的一项是
A. 少量蛋白尿时可从事轻微活动 B. 氮质血症者给大量优质蛋白质饮食
C. 急性发作期应卧床休息 D. 高热量饮食 E. 使用糖皮质激素时应注意观察血压

24. 肾病综合征常见的并发症有

- A. 感染 B. 心律失常 C. 高钾血症 D. 上消化道出血 E. 尿路结石

25. 肾盂肾炎最常见的致病菌

- A. 大肠杆菌 B. 溶血性链球菌 C. 表皮葡萄球菌 D. 阴沟肠杆菌 E. 脆弱类杆菌

26. 贫血时病人表现皮肤、黏膜苍白，较为可靠的检查部位是

- A. 面颊皮肤及上颌黏膜 B. 手背皮肤及口腔黏膜 C. 耳廓皮肤 D. 颈部皮肤
E. 睑结膜、甲床、口唇

27. 服用铁剂后可排出黑便的原因是

- A. 引起肠黏膜破溃出血 B. 引起上消化道出血 C. 腐蚀肠壁血管引起出血
D. 在肠道细菌作用下生成硫化铁所致 E. 铁剂颜色本身就黑

28. 急性白血病化疗期间多饮水是因为

- A. 加强血流动 B. 稀释血中药浓度 C. 多尿可缓解对肾的损害
D. 预防尿酸性肾病 E. 减少对膀胱的刺激

29. 符合甲状腺功能亢进症代谢率增高的表现是

- A. 神经过敏、失眠 B. 心动过速、收缩压增高 C. 肠蠕动增快、腹泻
D. 甲状腺弥漫性肿大 E. 怕热、多汗、食欲亢进

30. 对可疑糖尿病患者最有诊断价值的诊断检查是

- A. 尿糖定性试验 B. 尿糖定量试验 C. 空腹血糖测定 D. 口服葡萄糖耐量试验
E. 胰岛细胞抗体测定

31. 应用胰岛素治疗糖尿病，最常发生的不良反应是

- A. 低血糖反应 B. 过敏反应 C. 胃肠道反应 D. 注射部位脂肪萎缩 E. 酮症酸中毒

32. 类风湿关节炎缓解期间，指导病人活动的目的是

- A. 防止疾病复发 B. 保持关节功能位 C. 防止关节畸形
D. 减少晨僵发生 E. 避免关节废用

33. 瘫痪病人的护理措施中不正确的是

- A. 做好心理护理 B. 保持瘫痪肢体功能位 C. 防止褥疮发生
D. 早期使用留置导尿 E. 预防便秘

34. 对高血压脑出血病人急性期处理最重要的是

- A. 用镇静药，防止癫痫发作 B. 用抗生素，防止继发感染
C. 立即使血压下降至正常以下，防止再出血 D. 立即使用止血药
E. 抗水肿、降低颅内压

35. 病人，男性，65岁。双手颤抖和动作迟缓6年余。身体评估：面具脸，双手静止性震颤，右侧明显，右上肢肌张力齿轮样增高，手指扣纽扣系鞋带等困难，慌张步态。根据上述临床表现，病人最可能是患了何种疾病

- A. 短暂性脑缺血发作 B. 帕金森病 C. 神经衰弱 D. 风湿性关节炎 E. 脑梗死

36. 诊断心跳、呼吸骤停的主要依据是

- A. 大动脉搏动消失、心音不清、血压下降 B. 瞳孔散大、大动脉搏动消失、无呼吸
C. 瞳孔散大、大动脉搏动消失、血压下降 D. 意识丧失、心音不清、血压下降
E. 意识丧失、大动脉搏动消失、无呼吸

37. 治疗破伤风时, 注射大量 TAT 的目的是
A. 控制和解除痉挛 B. 抑制破伤风杆菌的生长 C. 减少毒素的产生 D. 中和游离毒素
E. 中和游离与结合的毒素
38. 目前治疗恶性肿瘤的最佳方法是
A. 手术疗法 B. 放射疗法 C. 化学疗法 D. 免疫疗法 E. 中医中药疗法
39. 术后病人早期呕吐最常见的原因是
A. 急性胃扩张 B. 水电解质紊乱 C. 麻醉反应 D. 急性肠梗阻 E. 胃肠蠕动受抑制
40. 成人择期手术前禁食 8~12 小时, 禁饮 4~6 小时的主要目的是
A. 防止麻醉后呕吐物误吸 B. 防止术中排便 C. 防止术后腹胀 D. 利于术后胃肠功能恢复
E. 防止术后尿潴留
41. 开放性气胸现场急救的首要措施是
A. 立即清创 B. 迅速封闭伤口 C. 给予抗菌素 D. 应用胸腔闭式引流 E. 吸氧
42. 静脉补钾的护理, 下列错误的是
A. 尿量要达到 30ml/h B. 氯化钾浓度<0.3% C. 滴入速度不超过 60 滴/分
D. 总量不超过 6~8g E. 严重缺钾者可静脉推注
43. 低钾血症的常见的早期症状是
A. 肌肉无力 B. 腹胀 C. 呕吐 D. 心悸 E. 头晕
44. 休克合理的体位是
A. 半卧位 B. 平卧位 C. 头低足高位 D. 上身水平位, 下肢抬高 10°
E. 头和躯干抬高 20°~30°, 下肢抬高 15°~20°
45. 符合早期休克表现的是
A. 神志淡漠 B. 脉压缩小 C. 血压下降 D. 酸中毒 E. 皮肤黏膜紫绀
46. 病人, 男性, 46 岁, 因车祸致伤, 现场急救时发现心跳呼吸已停止约 2min, 复苏时首先应采取的措施是
A. 口对口人工呼吸 B. 胸外心脏按压 C. 胸内心脏按压 D. 心内注射肾上腺素
E. 清理呼吸道
47. 深静脉血栓形成早期应用尿激酶的主要目的是
A. 抗感染 B. 抗凝 C. 镇痛 D. 溶栓 E. 利尿
48. 烧伤的现场急救, 下列正确的是
A. 火烧伤时应快速奔跑、脱离致热源 B. 磷烧伤时应将创面充分暴露于空气中
C. 石灰烧伤立即用清水直接冲洗创面 D. 合并呼吸道损伤者忌用吗啡镇痛
E. 给口渴者饮白开水
49. 甲状腺术后最危急的并发症是
A. 呼吸困难和窒息 B. 喉返神经损伤 C. 喉上神经内支损伤 D. 喉上神经外支损伤
E. 手足抽搐
50. 甲状腺大部分切除术后第 2 天, 若出现手足抽搐, 最可能是手术损伤了
A. 甲状旁腺 B. 喉上神经内侧支 C. 喉上神经外侧支 D. 单侧喉返神经 E. 双侧喉返神经

51. 预防急性乳腺炎的关键在于

- A. 防止乳房皮肤破损 B. 保持乳头清洁 C. 纠正乳头内陷 D. 避免乳汁淤积
E. 尽量采用人工喂养

52. 乳腺癌的早期表现是

- A. 乳房内无痛性肿块 B. “桔皮样”改变 C. 乳头内陷 D. “酒窝征” E. 卫星结节

53. 乳癌病人乳房皮肤出现“酒窝征”是由于

- A. 癌细胞堵塞皮下淋巴管 B. 癌肿侵犯 Cooper 韧带 C. 癌肿与胸肌粘连
D. 癌肿与皮肤粘连 E. 癌肿侵犯乳管

54. 乳房癌根治术后第 3 天, 病人右侧手臂出现皮肤发绀, 手指发麻, 皮温下降, 脉搏不能扪及。正确的处理是

- A. 继续观察, 不需特殊处理 B. 及时调整包扎胸带的松紧度 C. 立即拆除患处包扎胸带
D. 给予吸氧 E. 患处用砂袋加压

55. 男性病人, 38 岁, 4h 前负重物时, 右侧腹股沟斜疝被嵌顿, 下列哪项说明疝内容物已发生缺血坏死

- A. 疝块增大, 不能回纳 B. 疝块紧张发硬 C. 疝块有触痛 D. 阵发性腹痛伴呕吐
E. 腹痛、腹膜刺激征

56. 患者, 男性, 66 岁, 腹股沟斜疝 10 多年。因疝块巨大, 伴消化不良、便秘而来就诊。体查: 疝块巨大, 不能回纳。该疝属

- A. 易复性疝 B. 难复性疝 C. 嵌顿性疝 D. 绞窄性疝 E. 混合性疝

57. 早期诊断胃癌的最有效检查是

- A. X 线钡餐检查 B. 纤维胃镜检查 C. 胃液分析 D. 大便潜血试验 E. B 型超声波检查

58. 病人, 男, 37 岁, 患胃溃疡 9 年。行毕 II 式胃大部切除术后第 5 日, 突发右上腹剧痛, 腹部有明显压痛、反跳痛和腹肌紧张。首先考虑并发了

- A. 吻合口出血 B. 急性输入襻梗阻 C. 倾倒综合征 D. 吻合口梗阻 E. 十二指肠残端破裂

59. 治疗急性肠梗阻最重要的措施是

- A. 禁食、胃肠减压 B. 抗感染 C. 取半坐卧位 D. 缓解腹痛、腹胀 E. 纠正电解质酸碱失衡

60. 急性阑尾炎最重要的体征是

- A. 右下腹固定压痛 B. 腹部反跳痛和腹肌紧张 C. 腰大肌试验阳性 D. 闭孔内肌试验阳性
E. 直肠指检有触痛

61. 男性病人, 60 岁, 大便后常滴鲜血, 用力排便后有肿块从肛门脱出, 不能自行回缩, 需用手还纳。最可能是

- A. 一期内痔 B. 二期内痔 C. 三期内痔 D. 外四期内痔 E. 混合痔

62. 在某次老年人的健康教育讲座中, 冯大伯向胃肠外科的专科护士咨询直肠癌最常见的症状是什么。正确的回答是

- A. 腹痛 B. 血便 C. 腹部肿块 D. 便秘 E. 贫血、消瘦

63. 患者, 女, 73 岁, 因低位性直肠癌入院, 拟行 Miles 手术, 术后需佩带人工肛袋。病人咨询为何有些直肠癌患者术后不需佩带人工肛袋。主要理由是

- A. 其年龄较大 B. 肿瘤恶性程度大 C. 肿瘤较大 D. 肿瘤距肛缘的距离较近
E. 肿瘤有可能转移

64. 疑有直肠癌者，首先进行的最简便有效的检查是
A. 直肠指检 B. 大便潜血试验 C. 纤维直肠镜检查 D. 血清癌胚抗原测定 E. 钡剂灌肠检查
65. 胆道结石手术后放置 T 管的目的，不包括
A. 引流胆汁 B. 引流残余结石 C. 防治胆道感染 D. 支撑胆道 E. 经 T 管造影
66. 急性梗阻性化脓性胆管炎的主要治疗原则是
A. 抗感染 B. 解除痉挛 C. 镇痛 D. 纠正水、电解质和酸碱失衡 E. 紧急手术解除梗阻
67. 脑震荡的主要处理是
A. 休息 1~2 周，不需特殊处理 B. 20%甘露醇静脉滴注 C. 紧急手术 D. 吸氧
E. 抗感染
68. 颅内压增高的三大主要症状，除头痛外还有
A. 呕吐、视神经乳头水肿 B. 抽搐、视神经萎缩 C. 呕吐、偏瘫
D. 呕吐、视力下降 E. 头晕、呕吐
69. 颅骨骨折病人的护理，下列不正确的是
A. 床头抬高 15~30cm B. 用生理盐水棉球清洁外耳道 C. 限制液体入量
D. 禁忌行腰椎穿刺 E. 用消毒棉球堵塞外耳道、减少脑脊液外漏
70. 食道癌的典型症状
A. 食道内异物感 B. 胸背部持续疼痛 C. 进行性吞咽困难 D. 呛咳
E. 声音嘶哑

二、简答题（每题 10 分，共 40 分）

- 简述冠心病病人改变不良生活方式的健康指导要点。
- 简述上消化道大量出血病人病情监测的内容。
- 烧伤液体疗法时，如何评价补液是否充足？
- 对颅内压升高病人，如何预防颅内压骤然升高？

三、论述题（每题 20 分，共 40 分）

1. 病人男性，62 岁，小学文化。病人反复咳嗽、咳痰 20 余年，每于受凉后及天气转凉出现，以白色黏痰为主。近 5 年来出现活动后胸闷、气促，休息后可缓解。1 周前受凉后咳嗽、咳痰加剧，痰液转为黄色黏稠痰。2 天前出现发热，最高时 38.8℃，黄色黏稠痰明显增多，不易咳出，伴有呼吸费力，气促加重，平卧时更明显。以“慢性阻塞性肺疾病急性加重期”诊断，轮椅送入院。有吸烟史 30 余年，每天约 1 包，不饮酒。配偶子女健在，与配偶同住，家庭关系融洽。

身体评估：体温 38.3℃，脉搏 102 次/分钟，呼吸 28 次/分钟，血压 130/70mmHg。神志清楚，床边端坐位；球结膜无明显充血，口唇干燥，唇舌及肢端发绀。颈静脉充盈，气管居中。胸廓呈桶状胸，胸式呼吸运动减弱，语颤减低，双肺叩诊过清音，肺泡呼吸音弱，双肺闻及广泛干湿啰音，以中下肺明显。心脏及腹部检查未发现明显异常。下肢无凹陷性水肿。

实验室及其他检查：血气分析：pH 7.42，PaO₂ 50.0mmHg，PaCO₂ 45.2mmHg。X 线胸片：两肺纹理增粗，双下肺见片状炎症阴影。**请问：**

(1) 请根据上述病例资料，按照优先原则提出三个护理诊断（包括合作性护理问题，护理诊断用 P:E 格式），并写出相应的护理措施。

(2) 病人经过治疗病情好转准备出院，应给予哪些健康指导。

2. 某男, 60岁, 因腹痛、腹胀、呕吐、肛门停止排气排便16小时就诊。查体: T 37℃, P 80次/分, R 19次/分, BP 116/74mmHg。急性病容, 唇舌干燥, 眼窝凹陷, 皮肤弹性差。全腹膨隆, 可见肠型和蠕动波, 中腹部压痛, 但无腹肌紧张和反跳痛, 肠鸣音活跃, 有气过水声。实验室检查: 血红蛋白、红细胞计数和红细胞比容均升高, 血清钾 2.6mmol/L。患者1年前曾因胃穿孔做过胃大部分切除术。请问:

- (1) 考虑该患者最可能患有什么疾病?
- (2) 如该病人采取非手术治疗, 主要的措施有哪些?
- (3) 根据该病人的情况, 列出3个最主要的护理诊断。