

中山大学

2017 年港澳台人士攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 430

科目名称: 基础护理学与护理导论

考试时间: 4 月 8 日下午

考生须知

全部答案一律写在答题纸上, 答在试题纸上的不计分! 答题要写清题号, 不必抄题。

一、单选题 (每题 1.5 分, 共 60 分)

1. 患者李伯, 因糖尿病住院。住院后经治疗病情得到控制。医生让其出院, 但李伯不肯出院, 很依赖医护人员, 缺乏回家进行正常生活的信心。李伯属哪一种病人角色适应不良
A. 病人角色行为冲突 B. 病人角色行为强化 C. 病人角色行为缺如
D. 病人角色行为异常 E. 病人角色行为消退
2. 下列关于 Roy 适应模式的描述, 正确的是
A. 人是一个适应系统, 只具有生物属性
B. 效应者适应反应表现在角色功能和自我概念两个方面
C. 环境中对人产生影响的因素包括主要刺激和固有刺激
D. 适应性反应是指人能够不断适应环境, 是对健康有利的反应
E. 人所直接面对的, 需要立即适应的刺激为固有刺激
3. Roy 适应模式应对机制的具体适应活动和表现形式不包括
A. 生理功能 B. 自我概念 C. 情绪反应 D. 角色功能 E. 相互依赖
4. 以下哪项属于客观资料
A. 腹部胀痛 B. 皮肤瘙痒 C. 胸闷气促 D. 血压增高 E. 头晕眼花
5. 患者陈某, 因癌症化疗后出现口腔溃疡。护士为其进行口腔护理前首先应
A. 解释操作目的 B. 准备操作作用物 C. 评估病人病情 D. 选择漱口溶液 E. 安置病人体位
6. 以下不属于评判性思维特点的是
A. 能博采众长 B. 具有创造性 C. 具有自主性 D. 进行理性思考 E. 遵从专家的建议
7. 影响首因效应的主要因素是
A. 外表 B. 言谈 C. 身体姿势 D. 气质 E. 面部表情
8. 沟通双方“不仅分享对某一问题的看法及判断, 还表达及分享彼此的感觉、情感和愿望”, 这属于哪种层次的沟通交流
A. 共鸣性沟通 B. 分享性沟通 C. 情感性沟通 D. 判断性沟通 E. 真情性沟通
9. 医院感染常见的易感人群不包括
A. 婴幼儿 B. 老人 C. 使用免疫抑制剂者 D. 接受侵入性诊疗者 E. 护士

(以下病例为 10—12 题共用)

患者，女，68 岁。因脑梗死导致左侧肢体瘫痪，卧床 5 天。

10. 患者自诉臀部疼痛，检查发现其骶尾部皮肤呈红色，转换体位后皮肤红色不退。该情况属于
A. 反应性充血期 B. 淤血红润期 C. 炎性浸润期 D. 浅度溃疡期 E. 坏死溃疡期
11. 预防该患者骶尾部皮肤情况继续恶化的首要措施是
A. 避免骶尾部继续受压 B. 增加局部营养 C. 按摩受压处 D. 使用干燥便盆
E. 进行局部消毒
12. 给该患者进行背部按摩时不正确的操作是
A. 先用 50~52℃ 温水擦背 B. 再用 50% 的乙醇按摩 C. 按摩整个背部及骶尾部
D. 以环形方式按摩 E. 最后进行背部轻扣 3 分钟
13. 关于人类基本需要的特点，错误的是
A. 爱与归属的需要得不到满足，可导致痛苦、孤独感
B. 认知需要是指自我欲望和好奇心
C. 低层次需要部分满足后高一层次的需要就可以出现
D. 自我实现需要的满足方式与程度的个体间差异不大
E. 较低层次需要不会因为高层次需要的出现而消失

14. 追求和满足高层次需要的意义，不正确的是
A. 意味着较少的自私 B. 脱离心理病态的健康标志 C. 具有公益性和社会效果
D. 心理治疗更容易实施、效果也更好 E. 仅有助于心理的发展
15. 以下哪项需要，对于婴幼儿和儿童身体的生长发育极为重要
A. 生理需要 B. 刺激/认知的需要 C. 安全需要 D. 爱与归属的需要 E. 尊重的需要

(以下病例为 16—18 题共用)

于某，男，33 岁，车祸致四肢、颈椎骨折而入院。入院时神志不清、生命体征不稳定。

16. 此时，该病人的卧姿属于
A. 被动体位 B. 强迫体位 C. 主动体位 D. 被迫体位 E. 自主体位
17. 根据该病人的病情，帮助其翻身时应特别注意
A. 应征得家属的同意 B. 先松开约束带及盖被 C. 放平病床 D. 加下床栏
E. 头、颈、躯干保持在同一水平
18. 当病人进入康复期，在制定病人活动措施时，对其关节功能状况的评估不包括
A. 活动范围 B. 僵硬、变形 C. 张力 D. 运动声响 E. 疼痛
19. 头面部术后的患者应采取何种卧位
A. 去枕仰卧位 B. 屈膝仰卧位 C. 端坐位 D. 半坐卧位 E. 截石位
20. 如患者发生溶血反应，排出尿液颜色为
A. 红色或棕色 B. 金黄色 C. 黄褐色 D. 酱油色 E. 乳白色
21. 为女患者导尿时，初步消毒尿道口和小阴唇的顺序为
A. 自上而下，由内到外 B. 自上而下，由外到内 C. 自下而上，由内到外
D. 自下而上，由外到内 E. 尿道口外螺旋式消毒两次

22. 为成年女性患者导尿, 插入导尿管的长度是

- A. 2~3cm B. 4~6cm C. 7~8cm D. 7~9cm E. 9~10cm

23. 李大伯留置导尿管 24h 尿量 200ml, 护士应判断其排尿状况为

- A. 正常 B. 尿量偏少 C. 少尿 D. 无尿 E. 尿潴留

24. 当你准备给一女患者导尿时, 她表现出害羞, 不想导尿。针对其此种心态, 护士首先应

- A. 告知医生取消插尿管 B. 请家属劝说患者 C. 让其自行排尿
D. 耐心解释插尿管目的并用屏风遮挡 E. 向其说明如何配合

(以下病例为 25~28 题共用)

患者, 刘先生, 31 岁, 因颅脑外伤导致尿失禁, 护士遵医嘱为其留置导尿管。

25. 护士为刘先生留置导尿管的目的是

- A. 测量尿比重 B. 记录每小时尿量 C. 持续保持膀胱空虚状态
D. 引流尿液, 保持会阴部清洁干燥 E. 预防泌尿系统感染

26. 护士给刘先生插导尿管时提起阴茎与腹壁成 60° 角, 其目的是

- A. 让患者舒适 B. 消除耻骨下弯 C. 消除耻骨前弯
D. 避免损伤尿道膜部 E. 避免损伤尿道内口狭窄处

27. 护士为刘先生插导尿管时, 感到有一定的阻力, 最可能的原因是

- A. 导尿管太软太细 B. 导尿管太粗 C. 插管方向不对 D. 膀胱颈部肌肉收缩
E. 患者体位不正确

28. 为了避免泌尿系统逆行感染和尿盐沉积, 在刘先生病情允许的情况下, 每天应摄入足够水分, 使其尿量维持在

- A. 1000ml 以上 B. 1500ml 以上 C. 2000ml 以上 D. 2500ml 以上 E. 3000ml 以上

(以下病例为 29~30 题共用)

患者, 女, 68 岁, 诊断: 脑梗死。

医嘱: 速避凝 0.4ml H q12h。

29. 护士执行该医嘱的方法正确的是

- A. 注射前不必洗手、戴口罩 B. 注射部位皮肤不必常规消毒
C. 针尖、针梗、活塞体应保持无菌 D. 注射前不必排尽注射器内空气
E. 进针后检查有回血方可推注药液

30. 护士执行该医嘱时, 哪项做法不正确

- A. 注意工作环境光线充足、空间宽敞 B. 锐器盒应放在离操作者最近的位置
C. 摆好患者体位、充分暴露注射部位 D. 注射完毕, 注射器避免回套针头帽
E. 将用过的针头拧下后放入锐器盒内

31. 患者, 女, 因“冠心病”心绞痛发作。医嘱: 硝酸甘油片 0.5mg。正确的服药方法是

- A. 温开水送服 B. 在饭后服用 C. 在睡前服用 D. 放舌下含服 E. 服后多饮水

32. 患儿, 男, 1 周岁, 因高热需肌内注射退热针, 护士尤其应注意

- A. 做好患儿的安慰工作 B. 固定好患儿的注射部位 C. 不宜选用臀大肌注射
D. 防止注射部位感染 E. 注射时进针要深些

33. 关于臀大肌注射联线定位法正确的是

- A. 髂前上棘和尾骨联线的中 1/3 处
- B. 髂前上棘和尾骨联线的外上 1/3 处
- C. 髂前上棘和尾骨联线的下 1/3 处
- D. 髂嵴和尾骨联线的外上 1/3 处
- E. 髂嵴和尾骨联线的下 1/3 处

34. 静脉注射时, 以下方法错误的是

- A. 密切观察患者对药物的反应
- B. 密切观察注射局部有无隆起
- C. 注射洋地黄类强心药时速度要快
- D. 注射过程中回抽, 检查有无回血
- E. 注射刺激性强的药液前先注入 NS

35. 抢救青霉素过敏性休克最关键的措施是

- A. 立即通知医生
- B. 立即停药, 平卧、保暖
- C. 针刺人中、内关等穴位
- D. 立即皮下注射盐酸肾上腺素
- E. 立即肌内注射新斯的明

36. 为昏迷患者插胃管时, 护士将患者下颌靠近胸骨柄的目的是

- A. 加大咽喉通道的弧度
- B. 增加鼻咽的空间
- C. 利于喉部暴露
- D. 利于口咽部扩大
- E. 利于患者呼吸

37. 为慢性细菌性痢疾患者实施保留灌肠时, 以下做法错误的是

- A. 取左侧卧位
- B. 嘱患者先排空大小便
- C. 插管深度是 10~15 厘米
- D. 宜在中午睡眠前进行
- E. 灌肠后保留药液 1 小时以上

(以下病例为 38~40 题共用)

患者, 女, 神志清, 入院诊断为阿米巴痢疾。

医嘱: 睡前保留灌肠一次。

38. 该医嘱应该属于哪类医嘱

- A. 长期医嘱
- B. 临时医嘱
- C. 长期备用医嘱
- D. 临时备用医嘱
- E. 护嘱

39. 该灌肠的最佳体位是

- A. 俯卧位
- B. 仰卧位
- C. 左侧卧位
- D. 头低脚高卧位
- E. 右侧卧位

40. 护士嘱咐患者做何动作有利于其肛门括约肌的放松

- A. 浅促呼吸
- B. 胸式呼吸
- C. 腹式呼吸
- D. 张口呼吸
- E. 屏气

二、简答题 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 请简述护理程序的特征。

2. 请简述为昏迷患者进行特殊口腔护理时的注意事项。

3. 简述高热患者的护理要点。

4. 护士在执行药疗时, 应严格执行查对制度。请简述该查对制度。

5. 执行皮内注射时应注意哪些事项?

三、论述题 （每题 20 分，共 40 分）

1. 某建筑工人，男，50 岁。因工作突然晕倒而送医院急诊。初步诊断为中暑。

护理体查：神志模糊，皮肤干热潮红，T：40℃，P：100 分/次，R：35 分/次，Bp：90/60mmHg，其余暂未出现明显异常。

医嘱：5% GNS 2000 ml + 10% KCl 3g + Vit C 2g iv drip

请问：

- (1) 实施周围静脉输液时（长期或短期输液）选择静脉的原则是什么？（8 分）
- (2) 该患者可以选择何处进行穿刺？（6 分）
- (3) 在输入 10% KCl 3g 时应注意什么问题？（6 分）

2. 患者，女，83 岁。因肺部感染而收入院。

护理体查：T：39.1℃，P：85 分/次，R：38 分/次，Bp：140/100mmHg，患者痰多且粘稠难以咳出。

医嘱：及时吸痰。

请问：

- (1) 帮助患者清理呼吸道分泌物的护理措施有哪些？请列举。
- (2) 如何做到安全、有效地吸痰？