Этап 4. Защита проекта

Коллективное обсуждение результата проекта, самооценка деятельности

Стариков Данила Андреевич, Коннова Татьяна Алексеевна, Нефедова Наталия Николаевна, Тарутина Кристина Еленовна, Уткина Алина Дмитриевна

17 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

На данном этапе целью работы является коллективное обсуждение результата проекта и самооценка деятельности Основной же целью проекта являлось моделирование образования планетной системы из межзвездного газа, представленного как скопление частиц, которые испытывают гравитационное притяжение к центральному телу ("Солнцу") и движутся по круговым орбитам с первой космической скоростью.

Современные теории формирования планетных систем

Теория формирования планетных систем базируется на нескольких ключевых процессах:

- 1. Образование протозвезды и протопланетного диска
- 2. Аккреция и рост пылевых частиц
- 3. Формирование протопланет
- 4. Миграция планет
- 5. Образование стабильной планетной системы

Математическая модель

Для моделирования образования планетной системы мы использовали два подхода:

- Аналитический подход
- Численный подход

Аналитический подход

В рамках аналитического подхода рассматривается движение частиц по круговым орбитам вокруг центрального тела с массой М под действием гравитационной силы:

- · Для частицы на орбите радиуса r_i первая космическая скорость: $v_i = \surd(GM/r_i)$
- . Угловая скорость частицы: $\omega_i = v_i/r_i = \surd(GM/r_i^3)$
- · Положение частицы в момент времени t:

$$x_i(t) = r_i \cdot cos(\omega_i \cdot t + \theta_i, 0)$$

$$y_i(t) = r_i \cdot sin(\omega_i \cdot t + \theta_i, 0)$$

где $heta_i$, 0 — начальный угол частицы на орбите.

Численный подход

В численном подходе мы решаем систему дифференциальных уравнений второго порядка, описывающих движение частиц под действием гравитационного притяжения:

· Уравнения движения: $m_i \cdot d^2 r_i/dt^2 = F_i$

которые можно переписать как систему уравнений первого порядка:

$$dr_i/dt = v_i$$
$$dv_i/dt = a_i$$

где $a_i = F_i/m_i$ — ускорение частицы.

• Начальные условия:

$$r_i(t=0) = r_i 0$$
$$v_i(t=0) = v_i 0$$

Алгоритмы решения задачи

Для численного решения уравнений движения мы использовали алгоритм Верле, который обеспечивает хорошую точность и стабильность при моделировании гравитационных систем.

Алгоритм Верле для расчета траекторий имеет следующий вид:

$$\begin{split} r^(n+1)_i &= r^n_i + v^n_i \cdot \Delta t + a^n_i \cdot \Delta t^2/2 \\ v^(n+1)_i &= v^n_i + (a^n_i + a^(n+1)_i) \cdot \Delta t/2 \end{split}$$

Для оптимизации вычислений можно использовать модифицированную схему:

$$v^{(n+1/2)_i} = v_i^n + a_i^n \cdot \Delta t/2$$
$$r^{(n+1)_i} = r_i^n + v^{(n+1/2)_i} \cdot \Delta t$$
$$v^{(n+1)_i} = v^{(n+1/2)_i} + a^{(n+1)_i} \cdot \Delta t/2$$

Расчет сил и ускорений

Ускорение частицы определяется действующими на неё силами:

1. Гравитационное притяжение к центральному телу:

$$F = \gamma \cdot m_i \cdot M/r^2$$

2. Сила отталкивания между частицами (добавлена для предотвращения слияния):

$$F_r(b) = k \cdot ((a/b)^8 - 1)$$

где $a=R_i+R_j$ — сумма радиусов частиц, $b=|r_i-r_j|$ — расстояние между частицами.

Программная реализация

Модель была реализована на языке программирования Julia с использованием следующих пакетов: - Plots — для визуализации результатов - DifferentialEquations — для численного решения дифференциальных уравнений

Структура программы:

- 1. Инициализация системы частиц с заданными начальными положениями и скоростями
- 2. Расчет траекторий с использованием алгоритма Верле
- 3. Визуализация результатов в виде анимации движения частиц

Анализ результатов моделирования

В результате моделирования были получены траектории движения частиц вокруг центрального тела. Визуализация показала, что частицы действительно движутся по круговым орбитам с радиусами, соответствующими их начальным положениям. Это согласуется с теоретическими предсказаниями для движения под действием центральной гравитационной силы.

Наблюдения за эволюцией системы в течение продолжительного времени показали, что орбиты частиц остаются стабильными при отсутствии взаимодействия между ними. Это ожидаемый результат, так как для изолированной системы "частица-центральное тело" круговая орбита является устойчивым решением при условии правильного выбора начальной скорости (первой космической).

Сравнение аналитического и численного подходов

Сравнение результатов, полученных с помощью аналитического решения и численного моделирования, показало хорошее согласие между ними. Это подтверждает корректность реализации алгоритма Верле для решения уравнений движения.

Небольшие расхождения, которые наблюдаются при длительном моделировании, можно объяснить накоплением численных ошибок при интегрировании уравнений движения. Это известное свойство численных методов, которое можно минимизировать путем уменьшения шага по времени или использования методов более высокого порядка точности.

Результаты и выводы

- 1. Разработана математическая модель для описания движения частиц под действием центральной гравитационной силы.
- 2. Реализованы два подхода к моделированию: аналитический (с использованием точного решения для круговых орбит) и численный (с использованием алгоритма Верле).
- 3. Создана программная реализация модели на языке Julia, позволяющая визуализировать движение частиц в виде анимации.
- 4. Продемонстрирована стабильность орбит частиц при отсутствии взаимодействия между ними.

Ограничения модели

Следует отметить, что разработанная модель имеет ряд ограничений:

- 1. Моделирование проводится в двумерном пространстве, тогда как реальные планетные системы трехмерны.
- 2. Не учитывается взаимодействие между частицами, которое играет важную роль в реальных процессах формирования планет.
- 3. Не рассматриваются эффекты сопротивления среды, которые могут существенно влиять на движение малых частиц в протопланетном диске.
- 4. Не учитывается эволюция центрального тела (звезды) и его влияние на окружающую среду через излучение и звездный ветер.

Соответствие теоретическим представлениям

Несмотря на указанные ограничения, полученные результаты хорошо согласуются с базовыми теоретическими представлениями о движении тел под действием гравитации. Модель корректно воспроизводит закономерности кеплеровского движения и демонстрирует стабильность круговых орбит.

В то же время для более полного описания процесса формирования планетной системы необходимо учитывать дополнительные физические процессы, такие как аккреция вещества, взаимодействие между формирующимися планетезималями, влияние газовой составляющей диска и т.д.