## Задача о погоне

Котиева Селима Сулеймановна НФИбд-02-18<sup>1</sup> МатМод-2021, 15 февраля, 2021, Москва, Россия

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

# Цель лабораторной работы

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии k км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в п раза больше скорости браконьерской лодки. Необходимо определить по какой траектории необходимо двигаться катеру, чтоб нагнать лодку.

## Задание к лабораторной работе

- 1. Провести необходимые рассуждения и вывод дифференциальных уравнений, если скорость катера больше скорости лодки в n раз.
- 2. Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
- Определить по графику точку пересечения катера и лодки.

# лабораторной работы

Процесс выполнения

Принимаем за  $t_0 = 0, X_0 = 0$  - место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения,  $X_0 = k$  - место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки. Введем полярные координаты. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии x от полюса. За это время лодка пройдет x, а катер x - k (или x + k). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как  $\frac{x}{x}$  или  $\frac{x+k}{n}$  (для второго случая  $\frac{x-k}{n}$ ). Тогда неизвестное расстояние можно найти из следующего уравнения:  $\frac{x}{x} = \frac{x+k}{x}$  - в первом случае,  $\frac{x}{a} = \frac{x-k}{a}$  во втором случае.

Отсюда мы найдем два значения  $x_1$  и  $x_2$ , задачу будем решать для двух случаев.

$$x_1=rac{k}{n+1}$$
 ,при  $heta=0$   $x_2=rac{k}{n-1}$  ,при  $heta=-\pi$ 

Найдем тангенциальную скорость для нашей задачи  $v_t=r\frac{d\theta}{dt}$ . Вектора образуют прямоугольный треугольник, откуда по теореме Пифагора можно найти тангенциальную скорость  $v_t=\sqrt{n^2v_r^2-v^2}$ . Поскольку, радиальная скорость равна v, то тангенциальную скорость находим из уравнения  $v_t=\sqrt{n^2v^2-v^2}$ . Следовательно,  $v_{\tau}=v\sqrt{n^2-1}$ .

Тогда получаем  $r rac{d heta}{d t} = \upsilon \sqrt{n^2 - 1}$ 

Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = \upsilon \\ r\frac{d\theta}{dt} = \upsilon\sqrt{n^2 - 1} \end{cases}$$

с начальными условиями

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \frac{k}{n+1} \end{cases}$$
 
$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{k}{n-1} \end{cases}$$


Исключая из полученной системы производную по t, можно перейти к следующему уравнению:  $\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2-1}}$ 

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах.

#### Условие задачи

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 6.5 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 2.6 раза больше скорости браконьерской лодки

# Результаты




**Figure 1:** траектории для случая 1

точка пересечения катера и лодки

$$\begin{cases} \theta = 325 \\ r = 18 \end{cases}$$

#### Результаты



**Figure 2:** траектории для случая 2

точка пересечения катера и лодки

$$\begin{cases} \theta = 325 \\ r = 110 \end{cases}$$

Выводы по проделанной работе

#### Вывод

Рассмотрели задачу о погоне. Провели анализ и вывод дифференциальных уравнений. Смоделировали ситуацию.

Наблюдаем, что при погоне «по часовой стрелке» для достижения цели потребуется пройти значительно меньшее расстояние.