

WorkSheet # 3 – Solution

1. Find the **eigenvalues** and **eigenvectors** for the following matrices:

$$(a) A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & -12 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Solution:

$$(a) A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

The characteristic equation:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 0 & -1 \\ 2 & \lambda - 1 & 0 \\ 2 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(|\lambda I - A|) = (\lambda - 4)(\lambda - 1)^2 + 2(\lambda - 1) = (\lambda - 1)[(\lambda - 4)(\lambda - 1) + 2]$$

$$\det(|\lambda I - A|) = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)[(\lambda - 4)(\lambda - 1) + 2] = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2 \text{ \& } \lambda_3 = 3 \text{ (Eigenvalues)}$$

To find the corresponding eigenvectors:

$$\text{At } \lambda_1 = 1 \rightarrow (\lambda_1 I - A)x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{So the solution is } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, t \neq 0$$

The eigenvector $v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

At $\lambda_2 = 2 \rightarrow (\lambda_2 I - A)x = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$

The eigenvector $v_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

At $\lambda_3 = 3 \rightarrow (\lambda_3 I - A)x = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$

The eigenvector $v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

The characteristic equation $|\lambda I - A| = \begin{bmatrix} \lambda - 4 & 0 & -1 \\ 2 & \lambda - 1 & 0 \\ 2 & 0 & \lambda - 1 \end{bmatrix}$

Using the second row:

$$\det(|\lambda I - A|) = (\lambda - 1)[\lambda^2 - 3\lambda + 2] + 12(\lambda - 1) = (\lambda - 1)[(\lambda + 5)(\lambda - 1) + 12]$$

$$\det(|\lambda I - A|) = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)[(\lambda + 5)(\lambda - 1) + 12] = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 1)(\lambda + 2)(\lambda + 1) = 0$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2 \text{ \& } \lambda_3 = -1 \text{ (Eigenvalues)}$$

To find the corresponding eigenvectors:

$$\text{At } \lambda_1 = 1 \rightarrow (\lambda_1 I - A)x = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 6 & 12 & | & 0 \\ 2 & -1 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{by ERO}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{So the solution is } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2}t \\ -2t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, t \neq 0$$

$$\text{The eigenvector } v_1 = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{At } \lambda_2 = -2 \rightarrow (\lambda_2 I - A)x = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{bmatrix} -5 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & -3 & 12 & | & 0 \\ 2 & -1 & -2 & | & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 4 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{The eigenvector } v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{At } \lambda_3 = -1 \rightarrow (\lambda_3 I - A)x = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{bmatrix} -4 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 4 & 12 & | & 0 \\ 2 & -1 & -1 & | & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{The eigenvector } v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

-
2. **Validate the Cayley-Hamilton theorem** for the given matrices, and **then use it** to evaluate **A^4** and **A^{-1}** for each matrix.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

Solution:

$$(a) A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\text{Characteristic polynomial: } \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 3 & -6-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 4\lambda - 21$$

$$\text{Characteristic equation: } \lambda^2 + 4\lambda - 21 = 0$$

To check the Cayley-Hamilton validation substitute in the following function

$$A^2 + 4A - 21I$$

$$A^2 + 4A - 21I = \begin{bmatrix} 13 & -12 \\ -12 & 45 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} - 21 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

So it satisfies the equation $A^2 + 4A - 21I = 0$

To get A^4 :-

$$A^2 = -4A + 21I$$

$$\text{For } A^3 \rightarrow AA^2 = A(-4A + 21I)$$

$$\rightarrow A^3 = -4A^2 + 21A = -4(-4A + 21I) + 21A = 37A - 84I$$

$$\text{For } A^4 \rightarrow AA^3 = A(37A - 84I)$$

$$\rightarrow A^4 = 37A^2 - 84A = 37(-4A + 21I) - 84A = -232A + 777I$$

$$A^4 = -232 \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} + 777 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 312 & -696 \\ -696 & 2169 \end{bmatrix}$$

To get A^{-1} :-

$$I = \frac{1}{21}(A^2 + 4A)$$

$$\text{For } A^{-1} \rightarrow A^{-1}I = A^{-1} \frac{1}{21}(A^2 + 4A) \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{21}(A + 4I)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{21} \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{21} \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

Characteristic polynomial:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & -1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 4 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5-\lambda \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & -\lambda \\ 4 & -4 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6$$

Characteristic equation:

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0$$

To check the Cayley-Hamilton validation substitute in the following function

$$A^3 - 6A^2 + 11A - 6I$$

$$A^3 - 6A^2 + 11A - 6I$$

$$\begin{bmatrix} -11 & 14 & -13 \\ 19 & -6 & 13 \\ 76 & -28 & 53 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 \\ 5 & -2 & 4 \\ 20 & -12 & 17 \end{bmatrix} + 11 \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

So it satisfies the equation $A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = 0$

To get A^4 :-

$$A^3 = 6A^2 - 11A + 6I$$

$$\text{For } A^4 \rightarrow A A^3 = A(6A^2 - 11A + 6I)$$

$$\rightarrow A^4 = 6A^3 - 11A^2 + 6A = 6(6A^2 - 11A + 6I) - 11A^2 + 6A$$

$$= 25A^2 - 60A + 36I$$

$$A^4 = 25A^2 - 60A + 36I$$

$$A^4 = 25 \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 \\ 5 & -2 & 4 \\ 20 & -12 & 17 \end{bmatrix} - 60 \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix} + 36 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -49 & 30 & -40 \\ 65 & -14 & 40 \\ 26 & -60 & 161 \end{bmatrix}$$

To get A^{-1} :-

$$I = \frac{1}{6}(A^3 - 6A^2 + 11A)$$

For A^{-1} $\rightarrow A^{-1}I = A^{-1}\frac{1}{6}(A^3 - 6A^2 + 11A) \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{6}(A^2 - 6A^1 + 11I)$

$$A^{-1} = \frac{1}{6}(A^2 - 6A^1 + 11I)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \left(\begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 \\ 5 & -2 & 4 \\ 20 & -12 & 17 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix} + 11 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -1 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{3} \\ \frac{6}{3} & \frac{2}{2} & \frac{3}{3} \end{bmatrix}$$

3. Use Cayley-Hamilton theorem, to compute the indicated power of the matrix.

$$\begin{bmatrix} -4 & 6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}^9, \quad \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^k, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}^{2002}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}^{-5}$$

Note:

Cayley-Hamilton theorem: Every square matrix satisfies its characteristic equation.

Solution:

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \text{ find } A^9$$

Characteristic polynomial:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -4 - \lambda & 6 \\ -3 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (5 - \lambda)(-4 - \lambda) + 18 = \lambda^2 - \lambda - 2$$

Characteristic equation:

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow A^2 - A - 2I = 0$$

$$A^2 - A - 2I = 0 \rightarrow A^2 = A + 2I$$

$$\text{For } A^3 \rightarrow A A^2 = A(A + 2I) \rightarrow A^3 = A^2 + 2A = A + 2I + 2A = 3A + 2I$$

$$\text{For } A^4 \rightarrow A A^3 = A(3A + 2I) \rightarrow A^4 = 3A^2 + 2A = 3(A + 2I) + 2A = 5A + 6I$$

$$\text{For } A^5 \rightarrow A A^4 = A(5A + 6I) \rightarrow A^5 = 5A^2 + 6A = 5(A + 2I) + 6A = 11A + 10I$$

$$\text{For } A^6 \rightarrow A A^5 = A(11A + 10I) \rightarrow A^6 = 11A^2 + 10A = 11(A + 2I) + 10A = 21A + 22I$$

$$\text{For } A^7 \rightarrow A A^6 = A(21A + 22I) \rightarrow A^7 = 21A^2 + 22A = 21(A + 2I) + 22A = 43A + 42I$$

$$\text{For } A^8 \rightarrow A A^7 = A(43A + 42I) \rightarrow A^8 = 43A^2 + 42A = 43(A + 2I) + 42A = 85A + 86I$$

$$\text{For } A^9 \rightarrow A A^8 = A(85A + 86I) \rightarrow A^9 = 85A^2 + 86A = 85(A + 2I) + 86A = 171A + 170I$$

$$A^9 = 171A + 170I$$

$$A^9 = 171 \begin{bmatrix} -4 & 6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} + 170 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -514 & 1026 \\ -513 & 1025 \end{bmatrix}$$

Another solution

Characteristic polynomial:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -4 - \lambda & 6 \\ -3 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (5 - \lambda)(-4 - \lambda) + 18 = \lambda^2 - \lambda - 2$$

Characteristic equation:

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow A^2 - A - 2I = 0$$

$$A^2 - A - 2I = 0 \rightarrow A^2 = A + 2I \rightarrow A^m = k_1 A + k_0 I \rightarrow \lambda^m = k_1 \lambda + k_0$$

Since

$$m = 9 \text{ \& } \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2$$

$$\text{For } \lambda_1 = -1 \rightarrow -1^9 = -k_1 + k_0 \rightarrow -1 = -k_1 + k_0 \Rightarrow \text{eq1}$$

$$\text{For } \lambda_1 = 2 \rightarrow 2^9 = 2k_1 + k_0 \rightarrow 512 = 2k_1 + k_0 \Rightarrow \text{eq2}$$

By solving eq1 & eq2

$$k_1 = 171 \text{ \& } k_0 = 170$$

So

$$A^m = k_1 A + k_0 I \rightarrow A^9 = 171A + 170I$$

$$A^9 = 171 \begin{bmatrix} -4 & 6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} + 170 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -514 & 1026 \\ -513 & 1025 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ find } A^k$$

Characteristic polynomial:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 3 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda(2 - \lambda) - 3 = \lambda^2 - 2\lambda - 3$$

Characteristic equation:

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow A^2 - 2A - 3I = 0$$

$$A^2 - 2A - 3I = 0 \rightarrow A^2 = 2A + 3I \rightarrow A^m = k_1 A + k_0 I \rightarrow \lambda^m = k_1 \lambda + k_0$$

Since

$$m = k \text{ \& } \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$$

$$\text{For } \lambda_1 = -1 \rightarrow (-1)^k = -k_1 + k_0 \Rightarrow \text{eq1}$$

$$\text{For } \lambda_1 = 3 \rightarrow 3^k = 3k_1 + k_0 \Rightarrow \text{eq2}$$

By solving eq1 & eq2

$$k_1 = \frac{(-1)^k - 3^k}{-4} \text{ \& } k_0 = \frac{3(-1)^k + 3^k}{4}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ find } A^{2002}$$

Characteristic polynomial:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & -1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (-1 - \lambda)^2 (1 - \lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 - \lambda - 1$$

Characteristic equation:

$$\lambda^3 + \lambda^2 - \lambda - 1 = 0 \Rightarrow A^3 + A^2 - A - I = 0$$

$$A^3 + A^2 - A - I = 0 \rightarrow A^3 = -A^2 + A + I$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$A^3 = -\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = A$$

For $A^4 \rightarrow A A^3 = A(-A^2 + A + I) \rightarrow A^4 = -A^3 + A^2 + A = -A + A^2 + A = A^2$

We can notice that

$$A^{even} = I \text{ \& } A^{odd} = A$$

So $A^{2002} = I$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ find } A^{-5}$$

Characteristic polynomial:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1-\lambda \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^3 - 5\lambda^2 + 7\lambda - 3$$

Characteristic equation:

$$\lambda^3 - 5\lambda^2 + 7\lambda - 3 = 0 \Rightarrow A^3 - 5A^2 + 7A - 3I = 0$$

$$A^3 - 5A^2 + 7A - 3I = 0 \rightarrow I = \frac{1}{3}(A^3 - 5A^2 + 7A)$$

For $A^{-1} \rightarrow A^{-1}I = A^{-1} \frac{1}{3}(A^3 - 5A^2 + 7A) = \frac{1}{3}(A^{-1}A^3 - 5A^{-1}A^2 + 7A^{-1}A) =$

$$\frac{1}{3}(A^2 - 5A + 7I)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3}(A^2 - 5A + 7I)$$

$$\text{For } A^{-2} \rightarrow A^{-1}A^{-1} = \frac{1}{3}A^{-1}(A^2 - 5A + 7I) \rightarrow A^{-2} = \frac{1}{3}(A - 5I + 7A^{-1}) = \frac{1}{3}(A - 5I + \frac{7}{3}((A^2 - 5A + 7I)))$$

$$A^{-2} = \frac{7}{9}A^2 - \frac{11}{9}A + \frac{34}{9}I$$

$$\begin{aligned} \text{For } A^{-3} \rightarrow A^{-1}A^{-2} &= A^{-1}\left(\frac{7}{9}A^2 - \frac{11}{9}A + \frac{34}{9}I\right) \rightarrow A^{-3} = \frac{7}{9}A - \frac{11}{9}I + \frac{34}{9}A^{-1} \\ &= \frac{7}{9}A - \frac{11}{9}I + \frac{34}{27}(A^2 - 5A + 7I) \end{aligned}$$

$$A^{-3} = \frac{34}{27}A^2 - \frac{149}{27}A + \frac{205}{27}I$$

$$\begin{aligned} \text{For } A^{-4} \rightarrow A^{-1}A^{-3} &= A^{-1}\left(\frac{34}{27}A^2 - \frac{149}{27}A + \frac{205}{27}I\right) \rightarrow A^{-4} = \frac{34}{27}A - \frac{149}{27}I + \frac{205}{27}A^{-1} \\ &= \frac{34}{27}A - \frac{149}{27}I + \frac{205}{81}(A^2 - 5A + 7I) \end{aligned}$$

$$A^{-4} = \frac{205}{81}A^2 - \frac{923}{81}A + \frac{988}{81}I$$

$$\begin{aligned} \text{For } A^{-5} \rightarrow A^{-1}A^{-4} &= A^{-1}\left(\frac{205}{81}A^2 - \frac{923}{81}A + \frac{988}{81}I\right) \rightarrow A^{-5} = \frac{205}{81}A - \frac{923}{81}I + \frac{988}{81}A^{-1} \\ &= \frac{205}{81}A - \frac{923}{81}I + \frac{988}{81}(A^2 - 5A + 7I) \end{aligned}$$

$$A^{-5} = \frac{988}{81}A^2 - \frac{4735}{81}A + \frac{5993}{81}I$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 4 & 1 & 4 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A^{-5} = \frac{988}{81} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 4 & 1 & 4 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix} - \frac{4735}{81} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} + \frac{5993}{81} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1463}{81} & 0 & \frac{-29}{3} \\ \frac{-29}{3} & \frac{2246}{81} & \frac{-29}{3} \\ \frac{3}{-29} & 0 & \frac{1463}{81} \end{bmatrix}$$
