

Correções de composição celular da idade epigenética podem, quando transportadas, adicionar o confundimento que deveriam remover

Ruído de estimação, model shift, e o alcance de uma penalidade

Luan Ivepe

Pesquisador independente

luanivepe@gmail.com

Rascunho de preprint — 25/09/2026

Versão em português. A versão de referência, para submissão, é a inglesa.

Resumo A aceleração de idade epigenética em sangue é rotineiramente corrigida pela composição de células imunes, regredindo a idade do relógio sobre as proporções celulares estimadas. Dentro da coorte onde é ajustada, a correção faz o que promete; estudamos o que acontece quando seus coeficientes são aplicados a outra coorte. Em seis coortes públicas de sangue, pontuando só relógios que nunca treinaram nas coortes envolvidas, uma correção ajustada em quarenta amostras e transportada aumentou o sinal de composição em 83% a 95% dos sorteios nos relógios que estimam idade, conforme a coorte de ajuste; no relógio de ritmo de envelhecimento DunedinPACE foi neutra. O erro tem duas partes. O ruído de estimação cai com $1/n$ e é reproduzido quase exatamente por coeficientes sem informação. O model shift — um efeito de composição que difere entre coortes — não caiu com o tamanho de ajuste até 2.639 amostras e responde pelos piores transportes. Como depende dos coeficientes do próprio alvo, nada calculável de antemão certificou um transporte como seguro: um previsor em forma fechada dos 73 transportes que um previsor em forma fechada chamou de seguros, 30 foram nocivos. Uma penalidade ridge fixa reduziu os transportes nocivos (par $\times$ relógio) de 23 de 72 para 1; uma penalidade que diminui com o tamanho amostral, ou escolhida por validação cruzada, não. Na saliva, onde a composição responde por até metade da aceleração, os transportes entre coortes foram nocivos em 7 de 8 células com ou sem penalidade (até +152 p.p.), embora a correção funcionasse dentro de cada coorte, e reunir estudos não ajudou. O que separa os dois tecidos é quanto as coortes discordam em relação ao efeito médio: o desvio-padrão entre coortes da inclinação de composição foi de 0,09 a 0,55 do efeito médio no sangue e de 0,91 a 5,34 na saliva. Uma penalidade encolhe o coeficiente em direção a zero, o que fica perto do coeficiente de cada coorte só no primeiro caso.

1 Introdução

A composição do sangue muda com a idade: linfócitos diminuem, células mieloides aumentam, e células de memória substituem as naïve. Cada subtipo de leucócito tem seu perfil de metilação, então um relógio aplicado a sangue total mede em parte a composição da amostra¹. Com doze tipos celulares resolvidos, a composição explica de 13% a 34% da variância de aceleração de idade, conforme o relógio², e células T CD8 naïve leem 15 a 20 anos mais novas que CD8 de memória efetora do mesmo doador³.

O remédio usual é regredir a idade do relógio sobre a idade cronológica e as proporções estimadas, e guardar o resíduo. Isso costuma ser feito dentro do próprio conjunto de dados, onde remove exatamente o termo linear de composição. Pelo mesmo motivo não pode ser verificado ali: um resíduo de mínimos quadrados é ortogonal aos preditores qualquer que seja a qualidade dos coeficientes. As avaliações publicadas de ajuste por tipo celular são por simulação e dentro do conjunto de dados⁴.

Examinamos o caso em que os coeficientes saem da coorte que os produziu: reutilização de coeficientes publicados, coortes pequenas que os tomam de coortes maiores, ou uma correção fixa aplicada a amostras novas. Coeficientes de ajuste estimados num conjunto de dados e aplicados a outros já são prática publicada: uma adaptação de relógios de sangue para saliva os ajusta em oito estudos reunidos e os aplica a estudos separados⁵, e seu conjunto de treino inclui o GSE78874, uma das coortes em que achamos que o transporte falha.

2 Métodos

2.1 Coortes, painéis de referência e relógios

Quatro séries públicas de sangue total em 450k com idade cronológica: GSE40279 ($n = 656$, idades 19–101), GSE61151 ($n = 184$), GSE50660 ($n = 464$, coorte de tabagismo) e GSE42861 ($n = 689$, caso-controle de artrite reumatoide). As proporções foram estimadas por mínimos quadrados não negativos com restrição, contra um painel de seis tipos (GSE35069) e um de doze tipos que separa linfócitos naíve e de memória (GSE167998)⁶, ambos construídos aqui; o painel de doze recupera proporções conhecidas de misturas com r de 0,79 e erro absoluto médio de 0,027.

Relógios: Horvath 2013⁷, Levine 2018⁸ e Horvath 2018⁹. Um relógio é excluído de todo par que envolve uma coorte em que ele treinou. Hannum 2013 e Horvath 2013 treinaram no GSE40279 (o Horvath 2013 o lista como conjunto de treino 3; o GSE42861 foi só de teste). Levine 2018 (InCHIANTI) e Horvath 2018 não treinaram em nenhuma das quatro. Os pares com GSE40279 são pontuados só com Levine 2018 e Horvath 2018. Uma quinta coorte, o GSE132203 ($n = 795$, array EPIC, majoritariamente afro-americana), testa a replicação em outra geração de array e outra ancestralidade; nela só se pontuam relógios com cobertura de sondas acima de 95% (Levine 2018, Horvath 2018). Como relógio de outro tipo, acrescentamos o DunedinPACE¹⁰, que estima o ritmo de envelhecimento e foi treinado numa coorte fora do GEO; nós o reimplentamos a partir dos dados de modelo publicados no pacote e o validamos (médias por coorte de 0,93 a 1,05; fumantes atuais 0,14 mais rápidos que quem nunca fumou, $p = 3 \times 10^{-11}$). Uma sexta coorte, GSE55763¹¹ (450k, Londres), serve de coorte de ajuste grande: sem os 72 arrays de réplica técnica, tem 2.639 adultos não aparentados (24 a 75 anos); é posterior ao Horvath 2013, não está no treino de nenhum relógio e todos os relógios passaram nela nas checagens de cobertura e idade.

A saliva, mistura de epitélio bucal e leucócitos, foi testada em três coortes adultas: GSE232891 (EPIC, 552 pessoas; doença inflamatória intestinal e controles), GSE232332 (EPIC, 265 após remover réplicas técnicas; câncer de esôfago e controles) e GSE78874 (450k, 259; betas calculados do sinal bruto). As proporções vieram das referências do EpiDISH^{12,13}: um ajuste hierárquico de nove tipos (epitélio, fibroblasto, sete subtipos imunes) e uma medição de três tipos (epitélio, fibroblasto, imune), que compartilham o primeiro passo e por isso favorecem a correção na medição. As duas primeiras coortes vêm do mesmo grupo e seus arquivos não trazem sondas de genotipagem, então não foi possível excluir pessoas em comum e elas nunca foram pareadas. Levine 2018 e Horvath 2018 passaram nas checagens de cobertura e idade nas três. Uma quarta coorte de saliva, GSE149747 (EPIC, de outro grupo), entra com suas 44 amostras de linha de base na comparação de inclinações e nos ajustes reunidos, mas é pequena demais para uma curva de transporte.

2.2 Correção e pontuação

Na coorte de ajuste, ajustamos $y = \beta_0 + \beta_1 a + C\beta_c$ (idade do relógio y , idade cronológica a , proporções C com uma coluna descartada) e aplicamos $y - (C_{\text{teste}} - \bar{C}_{\text{ajuste}})\beta_c$ na coorte de teste. O desfecho é o termo de composição que sobra no resíduo de idade da coorte de teste — o incremento de R^2 da composição sobre a idade cronológica, menos um nulo de permutação, como fração da variância de aceleração não corrigida. O dano líquido Δ é essa fração depois da correção menos antes; Δ positivo significa que a correção transportada foi pior do que nenhuma. A correção é ajustada com doze tipos e pontuada com seis, para não ser avaliada pela própria representação; análises de sensibilidade pontuam com doze tipos e só com as colunas naíve/memória. Toda contagem é por relógio: um par em que um relógio é prejudicado e outro ajudado conta como duas células. Agregar relógios dentro do par escondeu boa parte do dano numa versão anterior desta análise.

2.3 Dois componentes do erro de transporte

Seja b ajustado na coorte A e S_B a covariância de composição da coorte B, ambos depois de retirar intercepto e idade. A composição que sobra em B é $(\beta_B - b)' S_B (\beta_B - b)$. Com $b = \beta_A + e$ e $\text{Cov}(e) = (\sigma^2/n) S_A^{-1}$, seu valor esperado é um termo de especificação $(\beta_A - \beta_B)' S_B (\beta_A - \beta_B)$ mais um termo de estimação $\sigma^2 \cdot \text{tr}(S_A^{-1} S_B)/n$. Chamamos $\text{tr}(S_A^{-1} S_B)/n$ de índice de transporte. O termo de estimação é o excesso de risco padrão de mínimos quadrados sob *covariate shift*¹⁴; o de especificação é *model shift*¹⁵. Não reivindicamos nenhum dos dois como novo.

Uma referência sem informação é obtida embaralhando linhas inteiras da matriz de composição da coorte de ajuste antes de ajustar, o que preserva a colinearidade entre tipos. Ela é medida em cada tamanho de ajuste.

2.4 Penalidade, subamostragem e inferência

Os coeficientes ridge são ajustados na composição padronizada e residualizada pela idade, com penalidade α vezes o autovalor médio, para que α seja comparável entre coortes e tamanhos; $\alpha = 0$ reproduz mínimos quadrados. Sob mudança de distribuição a penalidade ótima nem precisa ser positiva¹⁶; uma penalidade positiva fixa é usada aqui como padrão conservador. O valor $\alpha = 3$ foi fixado nas quatro primeiras coortes, antes de o GSE132203 e o GSE55763 entrarem no projeto, então o comportamento dele nessas duas e na saliva é fora da amostra que o escolheu. As subamostras são estratificadas por decil de idade. Onde as configurações compartilham coortes, a significância é avaliada por permutação em blocos¹⁷, trocando perfis inteiros de índice entre pares de coortes.

3 Resultados

3.1 Uma correção transportada pode ser pior do que nenhuma




Figura 1. Dano líquido de uma correção transportada, por tamanho de ajuste. Ajustada em subamostras estratificadas por idade do GSE40279 e aplicada a três coortes externas; Levine 2018 e Horvath 2018; 100 sorteios por tamanho. Acima de zero a correção foi pior do que nenhuma. Laranja: o mesmo procedimento com as linhas de composição embaralhadas antes do ajuste.

Ajustada em 40 amostras e transportada, a correção teve Δ mediano de +16,1 p.p. (IQR de +5,5 a +29,7) e foi nociva em 88% dos sorteios, sobre 100 sorteios por tamanho (Figura 1); três conjuntos anteriores de 30 sorteios deram medianas de +11,8 a +18,9, então conjuntos pequenos isolados são instáveis nesse tamanho. A mediana ficou perto de zero entre 160 e 240 amostras e em -1,6 p.p. nas 656 completas, onde 33% dos valores (relógio $\times$ coorte) ainda eram nocivos. Pontuado com doze tipos em vez de seis, o dano em 40 amostras foi de +48,1 p.p.; só nas colunas naive/memória, +30,6. Essa medição usa o mesmo painel do ajuste e é enviesada a favor da correção, então a curva de seis tipos subestima o dano.

3.2 Dois componentes




Figura 2. Composição deixada pelo ajuste real, contra um piso mais ruído. Azul: o que a correção transportada deixa. Cinza: o piso sem ruído, os 3,8 p.p. que sobram em tamanho cheio depois de descontar o que os coeficientes embaralhados ainda fazem ali. Laranja: esse piso mais o dano dos embaralhados em cada tamanho. As duas séries são composição restante, nas mesmas unidades.

Coefficientes embaralhados não carregam informação, e mesmo assim fizeram +17,4 p.p. de dano líquido em 40 amostras, caindo com o tamanho a uma inclinação log-log de $-1,16$ (Figura 2). A maior parte do dano em amostras pequenas é, portanto, ruído de estimação. O ajuste real, porém, ainda deixou 4,5 p.p. de composição em 656 amostras, onde os embaralhados ainda faziam 0,8; a diferença, 3,8 p.p., é um piso que o tamanho de ajuste não remove. Somar esse piso ao dano dos embaralhados reproduz a curva do ajuste real dentro de 0,6 p.p. em todos os tamanhos a partir de 60, e a subestima em 1,2 em 40 amostras (Figura 2).

O piso não é artefato de pontuar com outro painel: aplicada dentro do GSE40279, a mesma correção removeu 95% (Levine) e 85% (Horvath 2018) do sinal de composição de seis tipos. Transportada em tamanho cheio, removeu de 92% a -109% do sinal que encontrou, conforme o par — no pior caso, dobrando-o. (Percentuais do sinal encontrado são relativos; Δ e composição restante estão em p.p. da variância de aceleração ao longo do texto.)

3.3 Model shift




Figura 3. Termo de especificação contra a composição que sobra em tamanho cheio. 24 configurações (par direcionado × relógio). O termo é corrigido pelo ruído de estimação dos dois ajustes.

O termo de especificação corrigido ordenou a sobra em tamanho cheio com ρ de Spearman de 0,633 ($p = 0,0009$; Figura 3). Ele explica o pior transporte em tamanho de ajuste cheio, do GSE61151 para a coorte de artrite: previsto +26,6 e +51,8 p.p. para os dois relógios, observado +30,8 e +30,5. Os testes de Wald par a par de coeficientes iguais rejeitaram em 4 de 12 comparações após Bonferroni, abaixo da barra pré-definida de 6 (9 de 12 com p nominal abaixo de 0,05). As duas medidas pesam as diferenças de coeficiente de modos distintos: o Wald pela precisão da estimativa, o termo de especificação pela variância na coorte-alvo. Dentro das coortes, os coeficientes do Levine 2018 diferiram entre casos de artrite e controles e entre quem já fumou e quem nunca fumou ($p = 0,013$ cada); para o Horvath 2018 esse teste não rejeitou ($p = 0,61$ e $0,48$). Ajustar por doença e tabagismo deixou as diferenças entre coortes praticamente inalteradas.

O model shift não é efeito de lote. Dentro do GSE42861, onde casos e controles compartilham estudo, array e laboratório, ajustamos a correção numa metade aleatória dos controles e a aplicamos tanto à outra metade quanto aos casos de artrite (30 divisões pareadas). Aplicada aos casos, ela deixou 7,4, 7,4 e 2,6 pontos a mais de composição do que aplicada a controles (Horvath 2013, Levine 2018, Horvath 2018), embora o índice de transporte fosse menor para os casos — então nada do excesso é ruído de estimação, e o componente de model shift estimado foi de 8,7, 8,4 e 6,3 pontos. O Horvath 2018 é afetado mesmo sem o teste de Wald acima detectar diferença de coeficientes. A escolha da população de referência também muda o efeito estimado da doença: no Horvath 2018, o efeito da artrite ajustado por idade foi de $-0,74$ ano (IC de 95% de $-1,05$ a $-0,37$) com a correção na coorte inteira e de $-1,39$ (de $-2,08$ a $-0,80$) com a correção ajustada só nos controles, uma diferença de $-0,66$ (de $-1,13$ a $-0,31$) por bootstrap que reajusta as duas correções em cada reamostra.

3.4 O que dá para saber antes de transportar




Figura 4. Índice de transporte contra dano líquido, por relógio. Laranja: transportes que o previsor em forma fechada rotulou como seguros e que foram nocivos. A forma do marcador indica a coorte de ajuste.

Como o índice escala com $1/n$, parte da sua correlação com o dano vem só do tamanho amostral. Nos três tamanhos disponíveis para todos os pares, uma permutação em blocos que preserva os tamanhos de cada par deu nulo com mediana de ρ igual a 0,42; o observado foi 0,579 ($p = 0,036$). Dentro de um único tamanho de ajuste, o índice ordenou o dano com ρ de 0,41, 0,36 e 0,33. Ele traz informação real, mas modesta, sobre quais pares são arriscados (Figura 4). Contados por relógio, 12 de 40 transportes com índice abaixo de 0,05 foram nocivos; nenhum limiar do índice delimita uma região segura.

Uma estimativa em forma fechada do dano líquido que supõe coeficientes compartilhados, $2\hat{\sigma}^2 \cdot \text{índice} - b' S_B b$, precisa só da coorte de ajuste e das proporções do alvo. Ela acertou o sinal em 71% das configurações (ρ de 0,633), contra 81% (ρ de 0,884) de um oráculo que conhece os coeficientes do próprio alvo. Ela erra para o lado tranquilizador: 30 dos 73 transportes que rotulou como seguros foram nocivos, concentrados onde o termo de especificação é grande.

3.5 Uma penalidade remove a maior parte do dano




Figura 5. Transporte sem penalidade contra transporte com penalidade ridge, por célula (par × relógio), em tamanho casado $n = \min(n_A, n_B)$.

Sem penalidade, 15 de 30 células (par × relógio) foram nocivas. Com $\alpha = 3$, restou uma, em +0,2 p.p. (Figura 5); com $\alpha = 10$, nenhuma. A penalidade tem custo: onde a correção sem penalidade já ajudava, o benefício mediano caiu de -4,0 p.p. para -3,3 com $\alpha = 3$ e para -1,5 com $\alpha = 10$. A penalidade fixa também se sustentou quando as duas coortes foram deconvoluídas com painéis de referência diferentes (14 células nocivas sem penalidade, 1 com $\alpha = 3$) e quando pontuada com doze tipos ou no eixo naive/memória (nenhuma célula nociva com $\alpha = 3$).

Escolher a penalidade por validação cruzada leave-one-out na coorte de ajuste não funcionou tão bem: ela escolheu α de 0,3 na célula mediana e deixou 30% das células nocivas, contra 3% com $\alpha = 3$ fixo. A validação cruzada otimiza o ajuste dentro da coorte de ajuste e não enxerga onde os coeficientes serão usados.

O tamanho da penalidade é definido em relação à variância de composição da coorte de ajuste, então o encolhimento proporcional não diminui com n . Uma penalidade convencional de λ fixo diminui; igualada a $\alpha = 3$ com 40 amostras, ela vale 0,045 com 2.639. Nos 30 pares direcionados entre as seis coortes em tamanho pareado (72 células de relógios de idade), ela deixou 11 células nocivas, contra 1 com $\alpha = 3$ (23 sem penalidade); as que escaparam foram os transportes com model shift. Isso bate com a distinção entre covariate shift e regression shift na regularização ridge ótima¹⁶: um erro que não diminui com n não é contido por uma penalidade que diminui.

3.6 Um relógio de ritmo de envelhecimento

No DunedinPACE, a correção transportada ajustada em 40 amostras do GSE40279 foi neutra (mediana de +0,3 p.p., nociva em 51% dos sorteios), embora os coeficientes embaralhados ainda tenham causado +4,9 p.p. de dano: o componente de ruído estava presente, mas os coeficientes reais removeram sinal genuíno suficiente para compensá-lo. Ajustada na quinta coorte, a correção foi neutra de novo (-1,5 p.p., nociva em 42%), então isso parece propriedade do relógio, e não da coorte de ajuste. O resto se repetiu: em tamanhos casados, 6 de 12 pares direcionados foram nocivos sem penalidade e nenhum com $\alpha = 3$, e uma correção ajustada em controles deixou 10,5 pontos a mais de composição em casos de artrite do que em outros controles.

3.7 Replicação em outro array e outra ancestralidade

Ajustada em 40 amostras do GSE132203 (EPIC, majoritariamente afro-americana) e transportada para as quatro coortes de 450k, a correção foi nociva para os relógios de idade em 95% dos sorteios (mediana de +24,3 p.p.; Levine 2018 91%, Horvath 2018 99%), com os coeficientes embaralhados em +16,4. Nos 8 pares direcionados que envolvem essa coorte, 7 de 24 células (par $\times$ relógio) foram nocivas sem penalidade e nenhuma com $\alpha = 3$; as 24 contam o DunedinPACE junto dos dois relógios de idade (6 das 16 células de relógios de idade foram nocivas).

3.8 Uma coorte de ajuste quatro vezes maior

Ajustada no GSE55763 e transportada para as outras cinco coortes (13 células de relógios de idade), a correção foi nociva com 40 amostras em 83% dos sorteios (mediana de +7,6 p.p.). Entre 656 amostras e as 2.639 completas, a composição que ela deixou caiu só de 1,9 para 1,3 ponto, razão de 0,72 contra os 0,25 que o ruído em $1/n$ prevê; a referência embaralhada caiu de 0,5 para 0,1 (inclinação log-log de -1,03). O piso, portanto, persiste na mediana. Não é uniforme: no tamanho cheio foi de +4,6 pontos na coorte de artrite e +3,0 no GSE40279, mas zero no GSE50660 e no GSE61151, e superou a referência embaralhada em 8 de 13 células, abaixo das 9 que fixamos antes. O model shift é propriedade do par de coortes. Com tantas amostras de ajuste, a correção sem penalidade ajudou em 10 de 13 células, e a penalidade fixa custou benefício (mediana de -3,0 p.p. contra -4,0) ao eliminar as três células nocivas. Restringir o GSE40279 à faixa etária da coorte de ajuste (24 a 75 anos) não mudou seu piso (de +3,5 para +3,3 pontos no Horvath 2018), então a extrapolação de idade não o explica. O piso se concentra na metade de ancestralidade europeia da coorte (+4,3 e +3,9 pontos, contra -0,4 e -0,2 na metade hispânica), que nessa coorte também foi processada em placas separadas; centrar por placa não o removeu.

3.9 Saliva




Figura 6. Inclinação de cada relógio na fração imune em quatro coortes de saliva. Idade do relógio regredida na idade cronológica e na fração imune; inclinação por 10 pontos percentuais, IC de 95%. GSE149747 na linha de base.

Antes da correção, a composição respondia por 10,8% a 51,6% da variância da aceleração nos relógios de idade na saliva, e por 42% a 56% no DunedinPACE. Ajustada em 40 amostras e transportada entre coortes de saliva, a correção foi nociva em 67% dos sorteios (mediana de +20,9 p.p.; embaralhada, +6,4). Em tamanho pareado (259 amostras), 7 de 8 células (par × relógio) foram nocivas sem penalidade, 7 de 8 com $\alpha = 3$ e 6 de 8 com a penalidade que diminui; no Horvath 2018 transportado para o GSE78874, a correção sem penalidade deixou 132 e 168 p.p. de composição onde havia encontrado 16 — de oito a dez vezes o sinal que deveria remover. Dentro de cada coorte, ajustar numa metade aleatória e aplicar na outra foi benéfico em 5 de 6 células de relógios de idade (de -15 a -48 p.p.); a exceção tinha 132 amostras de ajuste e pouco sinal inicial. A falha está, portanto, no transporte. Todo par de saliva também cruza array e pré-processamento, então diferenças técnicas e biológicas não se separam, mas normalizar o GSE78874 por quantis para a distribuição EPIC deixou 7 de 8 células nocivas, e o mesmo fez um ajuste de três tipos com matriz de composição bem condicionada (número de condição ≈ 1 , contra 872 a 1.317 com nove tipos). A causa está no eixo dominante (Figura 6): ajustado pela idade, o Horvath 2018 mudou +1,0 e +1,9 ano a cada 10 pontos de fração imune nas coortes EPIC e -0,9 no GSE78874, e o Levine 2018, que mantém o sinal nas quatro coortes, variou de -0,2 a -4,7. O encolhimento leva um coeficiente transportado para zero, então só consegue limitar uma correção que discorda tanto assim do alvo: com $\alpha = 3$ a pior célula caiu de +116 para +28 p.p., e as células do Levine 2018, com o sinal intacto, para uma mediana de +3,2 em vez de zero. Numa quarta coorte de saliva em EPIC, de outro grupo (GSE149747, 44 adultos na linha de base), a inclinação foi de -0,82 (IC de 95% de -1,71 a 0,07), do lado da coorte de 450k e não das outras coortes EPIC, o que pesa contra o array como explicação; pela regra que fixamos antes, a comparação foi inconclusiva.

Reunir estudos também não resgatou o transporte: ajustada nas outras coortes de saliva, com efeito fixo por estudo, e aplicada à coorte deixada de fora, a correção foi nociva em 6 de 8 células (5 de 8 com $\alpha = 3$), porque a inclinação reunida toma o sinal da maioria do conjunto.

O sangue difere em quanto as coortes discordam em relação ao próprio efeito. Num ajuste de efeitos aleatórios das inclinações por coorte, o desvio-padrão entre coortes dividido pelo efeito médio em módulo foi de 0,09 a 0,55 nas seis coortes de sangue (eixos CD8 naïve e neutrófilos, nos dois relógios) e de 0,91 no Levine 2018 e 5,34 no Horvath 2018 na saliva; o I^2 foi de 43% a 84% contra 97%. A inversão de sinal é o extremo desse espalhamento, e não é tudo: com o GSE78874 normalizado, a inclinação do Horvath 2018 na saliva é -0,20 (IC de 95% de -0,46 a +0,06), já sem sinal claramente oposto ao das coortes EPIC, e 7 de 8 células seguem nocivas; o Levine 2018 nunca inverte e ainda é nocivo com $\alpha = 3$ em 3 de 4 células.

4 Discussão

A correção de composição dentro da coorte não pode ser validada dentro dela; isso decorre dos mínimos quadrados, não dos dados. Transportada, o dano em amostras pequenas é sobretudo ruído de estimação — coeficientes embaralhados fazem quase o mesmo estrago —, enquanto o dano em amostras grandes vem de diferenças no efeito da composição entre coortes. Esse segundo componente é invisível sem os coeficientes do próprio alvo, e um alvo grande o bastante para estimá-los poderia simplesmente ser corrigido dentro de si.

Para a prática, isso sugere quatro coisas. Quando a coorte-alvo é grande o bastante, ajuste a correção dentro dela. No sangue, quando os coeficientes precisam ser transportados, penalize-os com uma penalidade fixa e substancial, em vez de uma escolhida por validação cruzada na coorte de origem ou de uma que diminui com n ; com milhares de amostras de ajuste isso custa cerca de um ponto de benefício. Na saliva, e plausivelmente em qualquer tecido em que a composição domina, não transporte: nenhuma penalidade e nenhum agrupamento de estudos o tornaram seguro. E trate qualquer diagnóstico prévio, inclusive o índice de transporte, como ordenação de risco, não como garantia. A mesma cautela vale dentro de um único estudo: uma correção ajustada em controles e aplicada a pacientes é um transporte, e aqui ela mudou o efeito estimado da doença em até duas vezes.

O alcance da penalidade decorre de quanto as coortes discordam em relação ao efeito que se quer corrigir. Encolher em direção a zero troca um coeficiente transportado por um menor, que fica perto do coeficiente próprio de toda coorte quando o espalhamento entre coortes é uma fração do efeito médio, como no sangue, e perto de nenhum quando o espalhamento é tão grande quanto o efeito, como na saliva. A inversão de sinal

é o caso extremo, não um mecanismo à parte, e esperaríamos a penalidade falhar sempre que essa razão se aproxima de um.

O transporte já é prática publicada fora do sangue: uma adaptação de um relógio de sangue para saliva ajusta termos de composição em cerca de 960 amostras reunidas e os aplica a estudos separados⁵. Foi julgada pela acurácia contra a idade cronológica, que não mostra a composição que sobra na aceleração; nas nossas coortes de saliva, reunir estudos não evitou o dano. Heterogeneidade dependente da composição dentro de uma coorte de saliva também já foi descrita¹⁸.

5 Limitações

Seis coortes adultas de sangue total, cinco em 450k e uma em EPIC, duas definidas por doença ou exposição, e quatro coortes adultas de saliva cujos pares de transporte todos cruzam array e pré-processamento; outros tecidos e crianças não foram testados, e a medição na saliva compartilha a referência com o ajuste. Os painéis de referência foram construídos aqui com seleção de sondas mais simples que as bibliotecas publicadas. As medianas em tamanhos pequenos são instáveis entre conjuntos independentes de 30 sorteios (de +11,8 a +18,9 p.p. em 40 amostras; a mediana conjunta com 100 sorteios é +16,1), e o próprio dano em amostra pequena depende do relógio e da coorte de ajuste (neutro para o DunedinPACE a partir do GSE40279). O valor da penalidade é específico deste painel e destes relógios. A decomposição supõe um efeito linear da composição. A pontuação de sensibilidade com doze tipos usa o mesmo painel do ajuste. Nada disso diz respeito a se relógios epigenéticos medem envelhecimento biológico; trata de uma correção aplicada a eles.

6 Disponibilidade de dados e código

Todas as séries são públicas (GSE40279, GSE61151, GSE50660, GSE42861, GSE132203, GSE55763, GSE232891, GSE232332, GSE78874, GSE149747, GSE35069, GSE167998). O código de análise, o registro etapa a etapa com toda conclusão derrubada e os scripts das figuras estão em github.com/KTHimiko/clock-lab, privado no momento em que isto é escrito e disponível com o autor mediante pedido.

Referências

1. Jaffe, A. E. & Irizarry, R. A. Accounting for cellular heterogeneity is critical in epigenome-wide association studies. *Genome Biology* **15**, R31 (2014).
2. Zhang, Z., Salas, L. A., Christensen, B. C. & others. Deciphering the role of immune cell composition in epigenetic age acceleration: insights from cell-type deconvolution applied to human blood epigenetic clocks. *Aging Cell* **23**, e14071 (2024).
3. Tomusiak, A. & others. Development of an epigenetic clock resistant to changes in immune cell composition. *Communications Biology* **7**, 934 (2024).
4. McGregor, K. *et al.* An evaluation of methods correcting for cell-type heterogeneity in DNA methylation studies. *Genome Biology* **17**, 84 (2016).
5. Galkin, F., Kochetov, K., Mamoshina, P. & Zhavoronkov, A. Adapting blood DNA methylation aging clocks for use in saliva samples with cell-type deconvolution. *Frontiers in Aging* **2**, 697254 (2021).
6. Salas, L. A., Koestler, D. C., Christensen, B. C. & others. Enhanced cell deconvolution of peripheral blood using DNA methylation for high-resolution immune profiling. *Nature Communications* **13**, 761 (2022).
7. Horvath, S. DNA methylation age of human tissues and cell types. *Genome Biology* **14**, R115 (2013).
8. Levine, M. E. & others. An epigenetic biomarker of aging for lifespan and healthspan. *Aging* **10**, 573–591 (2018).
9. Horvath, S. & others. Epigenetic clock for skin and blood cells applied to Hutchinson Gilford Progeria Syndrome and ex vivo studies. *Aging* **10**, 1758–1775 (2018).
10. Belsky, D. W., Caspi, A., Corcoran, D. L. & others. DunedinPACE, a DNA methylation biomarker of the pace of aging. *eLife* **11**, e73420 (2022).

11. Lehne, B., Drong, A. W., Loh, M. & others. A coherent approach for analysis of the Illumina HumanMethylation450 BeadChip improves data quality and performance in epigenome-wide association studies. *Genome Biology* **16**, 37 (2015).
12. Teschendorff, A. E., Breeze, C. E., Zheng, S. C. & Beck, S. A comparison of reference-based algorithms for correcting cell-type heterogeneity in Epigenome-Wide Association Studies. *BMC Bioinformatics* **18**, 105 (2017).
13. Zheng, S. C., Webster, A. P., Dong, D. & others. A novel cell-type deconvolution algorithm reveals substantial contamination by immune cells in saliva, buccal and cervix. *Epigenomics* **10**, 925–940 (2018).
14. Eyre, B., Creager, E., Madras, D., Papayan, V. & Zemel, R. Out of the Ordinary: Spectrally Adapting Regression for Covariate Shift. em *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning* vol. 235 12701–12722 (2024).
15. Lei, Q., Hu, W. & Lee, J. Near-Optimal Linear Regression under Distribution Shift. em *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning* vol. 139 6164–6174 (2021).
16. Patil, P., Du, J.-H. & Tibshirani, R. J. Optimal Ridge Regularization for Out-of-Distribution Prediction. em *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning* (2024).
17. Winkler, A. M., Webster, M. A., Vidaurre, D., Nichols, T. E. & Smith, S. M. Multi-level block permutation. *NeuroImage* **123**, 253–268 (2015).
18. Chan, M. H., Meijer, M., Merrill, S. M. & others. Not all saliva samples are equal: The role of cellular heterogeneity in DNA methylation and epigenetic age analyses with biological and psychosocial factors. *Psychoneuroendocrinology* **184**, 107688 (2026).