# 한국어판 위험음주자 선별도구 (AUDIT-K)

| 이름(성별) | | 생년월일 | | 실시일 | |
|---|---|---|---|---|---|

다음의 각 문장을 읽고, 자신에게 알맞은 답변에 ○로 표시하여 주시기 바랍니다.

| | 문 항 | 0점 | 1점 | 2점 | 3점 | 4점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 술을 얼마나 자주 마십니까? | 전혀 마시지 않는다 | 한달에 한번 미만 | 한달에 2~4회 | 1주일에 2~3회 | 1주일에 4회 이상 |
| 2 | 평소 술을 마시는 날 몇잔 정도나 마십니까? | 1~2잔 | 3~4잔 | 5~6잔 | 7~9잔 | 10잔 이상 |
| 3 | 한번 술을 마실 때 소주 1병 또는 맥주 4병 이상의 음주는 얼마나 자주 하십니까? | 전혀 없다 | 한달에 1번 미만 | 한달에 한번 | 일주일에 한번 | 매일 같이 |
| 4 | 지난 1년간 술을 한번 마시기 시작하면 멈출 수 없다는 것을 안 때가 얼마나 자주 있었습니까? | 전혀 없다 | 한달에 1번 미만 | 한달에 한번 | 일주일에 한번 | 매일 같이 |
| 5 | 지난 1년간 당신은 평소 같으면 할 수 있었던 일을 음주 때문에 실패한 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 전혀 없다 | 한달에 1번 미만 | 한달에 한번 | 일주일에 한번 | 매일 같이 |
| 6 | 지난 1년간 술을 마신 다음날 아침에 일 나가기 위해 다시 해장술을 필요했던 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 전혀 없다 | 한달에 1번 미만 | 한달에 한번 | 일주일에 한번 | 매일 같이 |
| 7 | 지난 1년간 음주 후에 죄책감이 들거나 후회를 한 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 전혀 없다 | 한달에 1번 미만 | 한달에 한번 | 일주일에 한번 | 매일 같이 |
| 8 | 지난 1년간 음주 때문에 전날 밤에 있었던 일이 기억나지 않았던 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 전혀 없다 | 한달에 1번 미만 | 한달에 한번 | 일주일에 한번 | 매일 같이 |
| 9 | 음주로 인해 자신이나 다른 사람이 다친 적이 있었습니까? | 없었다 | 있지만, 지난 1년간에는 없었다 (2점) | | 지난 1년간 있었다 (4점) | |
| 10 | 친척이나 친구, 또는 의사가 당신이 술 마시는 것을 걱정하거나 술끊기를 권유한 적이 있습니까? | 전혀 없다 | 있지만, 지난 1년간에는 없었다 (2점) | | 지난 1년간 있었다 (4점) | |
| 각 칸별로 점수를 더해주세요 | | | | | | |
| 총점 | | | | | | |

※ 이 척도는 저작권자의 승인을 받아 제작 · 배포함

| 척도명 | Alcohol Use Disorder Identification Test-Korean (AUDIT-K) |
|---|---|
| 출처 | 조근호, 채숙희, 박애란, 이해국, 신임희, 민성호(2009). 위험 음주자의 선별을 위한 한국어판 Alcohol Use Disorders Identification Test(AUDIT-K)의 최적 절단값. J. Korean Academy of Addiction Psychiatry, 13(1), 34-40 |
| 대상 | 성인 |
| 측정내용 | 위험음주자의 조기발견 및 중재를 위해 음주량, 음주행위, 음주형태, 정신-사회적 문제 등의 문항으로 구성 |
| 총문항수 | 10문항 |
| 절단점수 | • 남 : 10점<br>• 여 : 6점 |
| 소척도 | 없음 |
| 결과해석 | |

| 성별 | 점수 | 분류 | 설명예시 |
|---|---|---|---|
| 남 | 0-9 | 정상음주 | '정상음주군'에 속하고 있으며, 비교적 건강하고 안전한 음주습관을 가지고 있습니다. |
| | 10-19 | 위험음주 | '위험음주군'으로 음주에 대한 단기개입과 지속적인 모니터링이 필요합니다. |
| | 20 이상 | 알코올사용장애 | 알코올사용장애진단척도 결과, '사용장애추정군'으로 신체증상, 불안, 불면, 사회부적응, 우울 등 증상이 나타날수 있으므로 세심한 관심과 전문가의 치료적 개입이 필요합니다. |
| 여 | 0-5 | 정상음주 | '정상음주군'에 속하고 있으며, 비교적 건강하고 안전한 음주습관을 가지고 있습니다. |
| | 6-9 | 위험음주 | '위험음주군'으로 음주에 대한 단기개입과 지속적인 모니터링이 필요합니다. |
| | 10 이상 | 알코올사용장애 | 알코올사용장애진단척도 결과, '사용장애추정군'으로 신체증상, 불안, 불면, 사회부적응, 우울 등 증상이 나타날수 있으므로 세심한 관심과 전문가의 치료적 개입이 필요합니다. |

| | |
|---|---|
| 저작권 | • 저작권 : Thomas Babor & WHO • 2차 : 조근호 |
| 사용승인여부 | 상업적 목적이 아닌 경우 별도의 저자 승인없이 출처표기하고 사용 가능. 그러나, 저작권법의 보호를 받는 저작물이므로 온라인상 혹은 타인에게 배포, 복제, 변형하고자 할 때는 저자의 승인 필요. |
| 비용 | 비상업적 목적으로 사용시 무료 |
| 구입처 | 해당없음 |


※ 이 척도는 저작권자의 승인을 받아 제작 · 배포함