

```
% The program uses trapezoidal rule to evaluate the arc length along an
% ellipse. at t=b=1
```

```
clear all
close all
```

```
a = 0; b = 1;
A = 1; B = 0.5;
k = sqrt(1 - (B/A)^2);
f = @(x) A*(sqrt(1 - k^2*(sin(x)).^2));
```

```
%exact solution
```

```
Tex = 0.8866251235367069482;
```

```
n = [8,16,32,64,128,256];
c = length(n);
Error = [];
```

```
for i = 1:c
```

```
    T= trapezoidal(a,b,f,n(i));
    error = abs(T-TeX);
    Error = [Error,error];
```

```
end
```

```
%Table of errors
```

```
Table = table(n(:),Error(:),'VariableNames',{'N','Error'})
```

```
%loglog plot
```

```
loglog(n,Error,'-*');
title('Errors vs N');
xlabel('N'); ylabel('Errors');
```

```
%order of convergence
```

```
p = polyfit(log(n),log(Error),1); p(1)
```

```
fprintf('Hence order of convergence is 2\n');
```

```
function [T] = trapezoidal(a,b,f,n)
```

```
    h = (b-a)/n;
```

```
    xe = linspace(a,b,n+1); %Nodes at edges
```

```
    fe = f(xe);
```

```
    T = (h/2)*(fe(1) + 2*sum(fe(2:end-1)) + fe(end));
```

```
end
```

Table =


6×2 table

N	Error
8	0.0006491
16	0.00016214
32	4.0525e-05
64	1.0131e-05
128	2.5327e-06
256	6.3316e-07

ans =

-2.0003

Hence order of convergence is 2



Published with MATLAB® R2020a