Rybki

Kacper Zieliński

10styczeń2020

Contents

1	Kar	piowate																					5
	1.1	Karp																					5
	1.2	Karaś .																					
	1.3	Płoć										•							•				5
2												7											
	2.1	Okoń																					7
	2.2	Sandacz																					7
3	Łos	osiowate																					9
	3.1	Łosoś																					9
	3.2	Pstrag .																					9
	3.3	Troć																					
4	Rós	wnania																					11

4 CONTENTS

- 1. Karpiowate
 - \bullet Karp
 - Karaś
 - Płotka
- 2. Okoniowate
 - Okoń
 - \bullet Sandacz
- 3. Łososiowate
 - Łosoś
 - Pstrag
 - \bullet Troć

Karpiowate



1.1 Karp

Zlewiska mórz Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego. Liczne odmiany hodowlane sa rozpowszechnione zarówno w hodowli, jak i w wodach otwartych na całym niemal świecie.

1.2 Karaś

Preferuje małe i płytkie zbiorniki wodne. W Polsce jest spotykany we wszystkich nizinnych wodach śródladowych, stojacych i wolno płynacych, w miejscach o porośnietym roślinami podłożu.

1.3 Płoć

Wystepuje w całej Europie z wyjatkiem Półwyspu Iberyjskiego, zlewiska Adriatyku, Grecji oraz północnej Skandynawii, na wschodzie siega daleko w głab Azji. Wystepuje we wszystkich wodach słodkich w Polsce także w wodach przybrzeżnych Bałtyku.

Najwieksza	długość	waga
Karp	107,0 cm	34,50 kg
Karaś	48,5 cm	4,160 kg
Płoć	$47,0~\mathrm{cm}$	1,57 kg

Okoniowate



2.1 Okoń

Wystepuje w wodach do 1000 m n.p.m., zarówno w płynacych jak i stojacych a także w słonawych wodach przybrzeżnych w estuarium rzek. Młodsze osobniki czesto tworza ławice, starsze żyja w niewielkich grupach badź samotnie.

2.2 Sandacz

Wystepuje w jeziorach, zbiornikach zaporowych, średnich i dużych nizinnych rzekach, wyrobiskach oraz w płytkich wodach przybrzeżnych Bałtyku. Preferuje głebokie, metne wody o twardym, piaszczystym, żwirowatym badź gliniastym dnie. Jest wrażliwy na niedobór tlenu.

Najwieksza	długość	waga
Okoń	50,0 cm	2,69 kg
Sandacz	$108,0~\mathrm{cm}$	14,20 kg

Lososiowate



3.1 Łosoś

W północnej cześci Atlantyku, w rzekach Ameryki Północnej, w Europie od Portugalii po Morze Białe, Północne i Bałtyk. W jeziorach Ładoga i Onega tworzy formy wyłacznie słodkowodne.

3.2 Pstrag

W Polsce liczny na południu i północy kraju. Wystepuje w górskich potokach Beskidów, Tatr, Sudetów, Jury Krakowsko-Czestochowskiej, także w rzekach Dolnego Ślaska, Pomorza Zachodniego i Środkowego, na Warmii i Mazurach, w dopływach Warty.

3.3 Troć

Wody słodkie Europy i zachodniej Azji oraz przybrzeżne wody morskie wokół Europy i północno-zachodniej Afryki. Introdukowane w co najmniej 24 krajach, głównie w Europie i obydwu Amerykach, a także w kilku krajach Azji oraz w Australii.

Najwieksza	długość	waga
Łosoś	130,0 cm	30,40 kg
Pstrag	77.5 cm	5,526 kg
Troć	$105,0~\mathrm{cm}$	14,60 kg

Równania

$$2 + 2 = 4$$

$$\lim_{n \to \infty} \frac{n}{12} = \infty$$

$$f(x) = \frac{\frac{z^5 + 3z^3}{z + 3}}{\frac{\log(z)}{z + 3} * \frac{z^3 + 3z}{z - 3}}$$
(4.1)

Bibliography

 $[1]\,$ Kacper Zielński, Rybki.1 wydanie, Gdańsk2020.