

Appunti di Calcolo delle probabilità

Riccardo Lo Iacono

Dipartimento di Matematica & Informatica
Università degli studi di Palermo
Sicilia
a.a. 2023-2024

Indice.

1	Introduzione alla probabilità: storia e concetti base	2
1.1	Partizione dell'evento certo	2
2	Impostazioni della probabilità	3
2.1	Impostazione assiomatica	3
2.2	Impostazione frequentista	3
2.3	Impostazione soggettiva	3
3	Eventi e probabilita condizionate	5
3.1	Teorema delle probabilità composte	5
3.2	Formula di disintegrazione	5
3.3	Teorema di Bayes	6
4	Numeri aleatori	7
4.1	Numeri aleatori semplici	7

– 1 – Introduzione alla probabilità: storia e concetti base.

Storicamente il primo ad interessarsi a quella che sarebbe poi divenuto lo studio della probabilità fu il cavaliere *De Mere*. Questi accanito scommettitore, suppose che vi fosse un legame tra la frequenza con cui uscisse un certo risultato e la sua probabilità.

Esempio: Come esempio della logica di De Mere si consideri quanto segue: siano

$A =$ “Lanciando un dado a sei facce 4 volte, esce almeno un 6”

$B =$ “Lanciando due dadi a sei facce 24 volte, esce almeno una coppia (6,6)”

ci si chiede: $\Pr(A) = \Pr(B)$?

Secondo De Mere si avrebbe

$$\Pr(A) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\Pr(B) = \underbrace{\frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \cdots + \frac{1}{36}}_{\times 36} = \frac{2}{3} \implies \Pr(A) = \Pr(B)$$

Si osserva però che una valutazione più “corretta” è ottenuta sottraendo a tutti casi possibili, quelli a sfavore di A e B rispettivamente, da cui

$$\Pr(A) = \frac{6^4 - 5^4}{6^4} \approx 0.518$$

$$\Pr(B) = \frac{36^{24} - 35^{24}}{36^{24}} \approx 0.491$$

Concludendo dunque che $\Pr(A) > \Pr(B)$.

Introducendo un po di formalismo, quelli che nell’esempio di sopra sono stati indicati con A e B prendono il nome di eventi. Più in generale, fissato un certo spazio campionario Ω , dicasi ogni suo sottoinsieme E evento. Cioè un evento descrive uno dei possibili esiti di un esperimento. Casi particolari di evento sono l’evento certo Ω e quello impossibile \emptyset . In fine dato E un evento, si definisce $|E|$ il suo indicatore e si ha

$$|E| = \begin{cases} 1, & \text{se } E \text{ è vero;} \\ 0, & \text{se } E \text{ è falso.} \end{cases}$$

Dove con “vero” e “falso” ci si riferisce al verificarsi o meno di E .

Nota. la definizione di probabilità data da De Mere prende il nome di *criterio classico*.

– 1.1 – Partizione dell’evento certo.

Siano E_1, \dots, E_n una famiglia di eventi. Allora se

$$1. \quad \forall i, j, i \neq j \quad E_i \wedge E_j = \emptyset$$

$$2. \quad \bigcup_{i=1}^n (E_i) = \Omega$$

si dirà che E_1, \dots, E_n formano una partizione di Ω .

– 2 – Impostazioni della probabilità.

Quella dell'impostazione classica, non è l'unica impostazione della probabilità esistente. Di fatti in aggiunta a quella sinora vista, si hanno le impostazioni *assiomatica*, *frequentista* e *soggettiva*, analizzate in maggior dettaglio nelle sezioni a seguire.

– 2.1 – Impostazione assiomatica.

L'impostazione assiomatica da una definizione rigorosamente matematica di probabilità, a seguito riportata.

Definizione: dato (Ω, A) uno spazio di misura: ossia Ω è uno spazio con un'algebra (o una σ -algebra) e A una sua sottofamiglia di eventi; dicasi che una funzione $\Pr : A \rightarrow [0, 1]$, dicasi probabilità se:

1. $\forall E \in A, \Pr(E) \geq 0$;
2. $\Pr(\Omega) = 1$;
3. $\Pr(E_1 \vee E_2) = \Pr(E_1) + \Pr(E_2), \forall E_1, E_2 \in A : E_1 E_2 = \emptyset$

Nel caso in cui A sia infinito, il punto 3 diventa

$$\Pr\left(\bigvee_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \Pr(E_i)$$

– 2.2 – Impostazione frequentista.

Come evidente dall'esempio di De Mere, vi è una naturale tendenza ad associare la probabilità di un evento alla frequenza con cui lo stesso avviene. Tale concezione di probabilità è detta *impostazione frequentista*.

Definizione: considerata una successione di prove indipendenti, ripetute sotto le stesse condizioni, posto E un evento e f_N la frequenza di successo entro relativamente le prime N prove, si pone

$$\Pr(E) = \lim_{N \rightarrow \infty} f_N$$

– 2.3 – Impostazione soggettiva.

Le impostazioni sinora viste, sono generalizzabili nella *teoria soggettiva*. Con tale impostazione si ha una divisione rigorosa tra gli aspetti del certo e del probabile. Più in generale si ha quanto segue.

Definizione: sia E un evento, la probabilità $\Pr(E) = p$ rappresenta il grado di fiducia che un individuo ha del verificarsi di E .

– 2.3.1 – Criterio della scommessa.

Da quanto detto precedentemente, sia supposto $\Pr(E) = p$ per un qualche evento E , si può intendere p come la quota che, in un ipotetica scommessa, un individuo è disposto a scommettere. Cioè

$$\text{si paga } p \text{ e si riceve } \begin{cases} 1, & \text{se } E \text{ vero,} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

più in generale, $\forall S \in \mathbb{R}, S \neq 0$

$$\text{si paga } pS \text{ e si riceve } \begin{cases} S, & \text{se si verifica } S, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

– 2.3.2 – Guadagno e criterio di coerenza.

Definizione: sia $\Pr(E) = p$ la probabilità che un individuo attribuisce al verificarsi di E . Dicesi la seguente quantità

$$\mathcal{G} = S|E| - pS = S(|E| - p)$$

guadagno.

In generale, affinché una scommessa sia sensata, questa deve essere coerente, cioè: l'assegnazione di p non deve portare ad una perdita certa, e ciò si verifica se e solo se

$$\min \{\mathcal{G}\} \max \{\mathcal{G}\} \leq 0, \forall S \in \mathbb{R}$$

– 3 – Eventi e probabilita condizionate.

Definizione: siano E e $H, H \neq 0$ eventi. Dica si evento condizionato il seguente ente logico.

$$E | H = \begin{cases} \text{vero, se } E \text{ e } H \text{ veri ,} \\ \text{falso, se } E^C \text{ e } H \text{ veri ,} \\ \text{indeterminato, se } H^C \text{ vero.} \end{cases}$$

Banalmente se $H = \Omega$, si ha $E | H = E | \Omega = E$. Vale inoltre

$$E | H = (E \wedge \Omega) | H = [(E \wedge H) \vee (E \wedge H^C)] | H = (E \wedge H) | H$$

Applicando dunque il criterio di scommessa si ha che

$$\Pr(E | H) = \begin{cases} S, & \text{se } EH \text{ vero ,} \\ 0, & \text{se } E^C H \text{ vero} \\ pS, & \text{se } H \text{ falso.} \end{cases}$$

da cui, considerando il guadagno si ha

$$\mathcal{G} = S |EH| - pS |H| = S |H| (|E| - p)$$

posto dunque $G = \{S(1 - p), -ps\}$, si deve verificare

$$\begin{aligned} \min \{G\} \max \{G\} &\leq 0, \forall S \neq 0 \\ \implies S^2(1 - p)(-p) &\leq 0 \iff p \in [0, 1] \end{aligned}$$

affinche la condizione di coerenza sia rispettata.

– 3.1 – Teorema delle probabilita composte.

Teorema 3.1. *Dati due eventi E e $H, H \neq 0$, siano $(\Pr(H), \Pr(E | H), \Pr(EH))$ valutazioni di probabilita sugli eventi $\{H, E \wedge H, E | H\}$, allora se*

$$\Pr(EH) = \frac{\Pr(E | H)}{\Pr(H)}$$

l'assegnazione risulta essere coerente.

Corollario 3.1.1. *Se $\Pr(H) \neq 0$, allora*

$$\Pr(E | H) = \frac{\Pr(EH)}{\Pr(H)}$$

– 3.2 – Formula di disintegrazione.

Il *Teorema 3.1* può essere generalizzato a n eventi, come segue. Siano $\{H_1, \dots, H_n\}$ una partizione di Ω e sia E un evento. Allora

$$\Pr(E) = \sum_i \Pr(E | H_i) \Pr(H_i)$$

– 3.3 – Teorema di Bayes.

Dalla formula di disintegrazione segue il seguente risultato, noto come *Teorema di Bayes*.

Teorema di Bayes. Siano E, H due eventi. Allora

$$\Pr(H | E) = \frac{\Pr(H) \Pr(E | H)}{\Pr(E)}$$

Questi, nella sua versione pi  generale stabilisce quanto segue.

Teorema di Bayes (generalizzato). Siano $\{H_1, \dots, H_n\}$ un partizione di Ω , sia E un evento. Si ha allora

$$\Pr(H_i | E) = \frac{\Pr(H_i) \Pr(E | H_i)}{\Pr(E | H_1) \Pr(H_1) + \dots + \Pr(E | H_n) \Pr(H_n)}$$

– 3.3.1 – Indipendenza stocastica.

Definizione: dati due eventi E e H , $H \neq \emptyset$, si dir  che questi sono stocasticamente indipendenti se

$$\Pr(E | H) = \Pr(E)$$

da cui

$$\Pr(EH) = \Pr(E) \Pr(H)$$

– 4 – Numeri aleatori.

Dato Ω uno spazio di probabilità, un numero aleatorio può essere inteso come una funzione a variabili reali definita su Ω stesso. Sia dunque X un numero aleatorio, e sia $x \in \mathbb{R}$ un valore assumibile da X . Allora posto considerato l'evento $(X = x)$, a questi si associa la probabilità $\Pr(X = x)$.

In genere, si distinguono due “classi” di numeri aleatori:

- **discreti:** se il numero di valori assumibili dal numero aleatorio è finito o al più numerabile;
- **continuo:** se non discreto.

Osservazione. banalmente, si deve verificare che

$$\sum_{i=1}^n \Pr(X = x_i) = \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

affinche l'assegnazione di probabilità risulti coerente.

– 4.1 – Numeri aleatori semplici.

Siano E_1, \dots, E_n e siano $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ numeri reali. Si dice che

$$X = \alpha_1 |E_1| + \dots + \alpha_n |E_n|$$

è un numero aleatorio semplice.

Per come è costruito, il dominio di X non è definito ma lo è il codominio, codominio che può essere stabilito considerando i costituenti dell'evento. Nello specifico, se tutti gli eventi sono indipendenti, allora X può assumere 2^n valori.

– 4.1.1 – Distribuzione ipergeometrica.

Si assuma di possedere un'urna con N palline, di cui pN bianche e qN nere sono note, con $qN + pN = N$. E da questa effettuare n estrazioni con restituzione. Sia posto E_i l'evento “l'i-esima pallina estratta è bianca” e sia

$$X = \sum_{i=1}^n |E_i|.$$

Si ha che

$$\Pr(E_i) = \frac{\binom{N-1}{pN-1}}{\binom{N}{pN}} = p$$

Cioè gli eventi sono equiprobabili.

Sia ora considerato il generico costituente di X , si ha

$$\Pr(E_{i_1} E_{i_2} \dots E_{i_h} E_{i_{h+1}}^C \dots E_{i_n}^C) = \dots = \frac{\binom{N-n}{pN-h}}{\binom{N}{pN}}$$

da cui dunque

$$(X = h) = \bigvee_{\{i_1, \dots, i_h\} \subseteq \{1, \dots, n\}} E_{i_1} E_{i_2} \dots E_{i_h} E_{i_{h+1}}^C \dots E_{i_n}^C$$

implicando che

$$\Pr(X = h) = \frac{\binom{N-n}{pN-h} \binom{n}{h}}{\binom{N}{pN}}$$

poiché esistono $\binom{n}{h}$ modi per ottenere $(X = h)$.

– 4.1.2 – Distribuzione binomiale.

Siano E_1, \dots, E_n eventi indipendenti ed equiprobabili, con probabilità p . Sia $q = 1 - p$ e sia X un numero aleatorio che rappresenta il numero di successi alle n prove. Cioè

$$X = |E_1| + \dots + |E_n|$$

Banalmente X assume valori in $\{0, \dots, n\}$. Per stabilire la distribuzione di X è necessario calcolare $\Pr(X = h), \forall h \in \{0, \dots, n\}$. Risulta dunque più conveniente considerare il numero di costituenti a favore ad esso. Segue che

$$\begin{aligned}\Pr(X = 0) &= \Pr(E_1^C E_2^C \dots E_n^C) = \Pr(E_1^C) \Pr(E_2^C) \dots \Pr(E_n^C) = (1 - p)^n \\ \Pr(X = 1) &= \Pr(E_1 E_2^C \dots E_n^C) = \Pr(E_1) \Pr(E_2^C) \dots + \Pr(E_n^C) = p(1 - p)^n\end{aligned}$$

Si dimostra banalmente, che in generale vale

$$\Pr(X = h) = \binom{n}{h} p^h q^{n-h}$$

Dicasi che X ha distribuzione binomiale. In simboli $X \sim B_{n,p}$

– 4.1.3 – Mistura di binomiali.

Si assuma di possedere un'urna con N palline, di cui r bianche, con r non noto. E da questa effettuare n estrazioni con restituzione. Siano ora $\{H_1, \dots, H_n\}$ una partizione dell'evento certo, con

$$H_r = \text{“Ci sono } r \text{ palline bianche”}$$

Sia $E_i = \text{“l'i-esima pallina estratta è bianca”}$, per $i \in \{1, \dots, n\}$. Si verifica che

$$\Pr(E_i | H_r) = \frac{r}{N}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Da ciò

$$\begin{aligned}\Pr(E_i) &= \sum_{r=0}^N \Pr(E_i | H_r) \Pr(H_r) \\ &= \sum_{r=0}^N \frac{r}{N} \Pr(H_r)\end{aligned}$$

Da cui risulta $\Pr(E_i)$ è equiprobabile, per ogni i .

Sia ora posto X il numero aleatorio di palline estratte alle n prove. Si ha

$$\Pr(X = h | H_r) = \binom{n}{h} \left(\frac{r}{N}\right)^h \left(\frac{N-h}{N}\right)^{n-h}$$

da cui

$$\Pr(X = h) = \sum_{r=0}^N \binom{n}{h} \left(\frac{r}{N}\right)^h \left(\frac{N-h}{N}\right)^{n-h} \Pr(H_r) \quad (1)$$

Dicasi che X è una mistura di binomiali.

Nota. nel caso si effettuino estrazioni senza restituzione, la (1) diventa

$$\Pr(X = h) = \sum_{r=0}^N \frac{\binom{n}{h} \left(\frac{r}{N}\right)^h \left(\frac{N-h}{N}\right)^{n-h}}{\binom{N}{r}} \Pr(H_r)$$

Si dirà in questo caso che X è una mistura di iper-geometriche.