

Episiotomy: OR (95% CI)

Explonatory	Faktor	Lausanne	Basel
Sex	male	–	–
	female	0.50 (0.30–0.81)	0.66 (0.48–0.91)
Parity	–	0.42 (0.31–0.56)	0.34 (0.27–0.42)
Position	normal	–	–
	non-normal	0.35 (0.06–1.23)	1.30 (0.69–2.48)
Age of the mother	–	1.06 (1.01–1.11)	1.08 (1.05–1.12)
height/birthweight Q	1Q	–	–
	2Q	0.81 (0.40–1.66)	1.04 (0.66–1.64)
	3Q	0.93 (0.48–1.84)	1.00 (0.61–1.64)
	4Q	0.80 (0.39–1.63)	0.95 (0.57–1.59)
head cir/Bassin ConjExt Q	1Q	–	–
	2Q	0.63 (0.30–1.31)	1.14 (0.73–1.78)
	3Q	0.72 (0.35–1.47)	1.22 (0.76–1.95)
	4Q	0.95 (0.48–1.89)	1.36 (0.82–2.26)
Gestational age (w)	–	1.00 (0.91–1.11)	1.09 (1.00–1.18)
Ratio height/Bassin Cretes Q	1Q	–	–
	2Q	1.70 (0.81–3.62)	1.02 (0.62–1.67)
	3Q	2.42 (1.20–5.05)	0.83 (0.50–1.36)
	4Q	1.95 (0.88–4.42)	1.23 (0.71–2.12)
Bassin Epines	–	1.02 (0.85–1.21)	1.05 (0.93–1.19)

