## WSTĘP DO RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

4. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa.

Twierdzenie (Wzór łańcuchowy). Jeżeli zdarzenia  $A_1, A_2, \ldots, A_n$  spełniają warunek  $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{n-1}) > 0$ , to

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2 | A_1) \cdot \ldots \cdot \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{n-1}) .$$

**Twierdzenie.** Jeśli  $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$  jest rozbiciem przestrzeni  $\Omega$  na rozłączne zdarzenia o dodatnim prawdopodobieństwie, to dla każdego zdarzenia  $B \in \mathcal{F}$  mamy

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B|A_i) \mathbb{P}(A_i),$$

a dla każdego  $j = 1, 2, \ldots, n$ ,

$$\mathbb{P}(A_j|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_j)\,\mathbb{P}(A_j)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B|A_j)\,\mathbb{P}(A_j)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B|A_i)\,\mathbb{P}(A_i)}.$$

Pierwsze z powyższych równań nazywamy wzorem na prawdopodobieństwo całkowite, a drugie wzorem Bayesa.

## Dodatek A. Zadania na ćwiczenia

**Zadanie 1.** Fabryka wytwarza gwoździe na trzech maszynach, których udział w produkcji wynosi odpowiednio 25%, 35% oraz 40%. Maszyny dają odpowiednio 5%, 4% oraz 2% gwoździ wybrakowanych.

- (a) Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrany gwóźdź wyprodukowany w fabryce jest wybrakowany?
- (b) Podczas kontroli jakości losowo wybrano gwóźdź, który okazał się być wybrakowany. Jakie jest prawdopodobieństwo, że został on wyprodukowany przez pierwszą maszynę?

**Zadanie 2.** Z urny zawierającej trzy kule białe i pięć czarnych wyciągamy kolejno (bez zwracania) trzy kule. Oblicz prawdopodobieństwo, że wyciągniemy kolejno kulę białą, czarną i białą.

**Zadanie 3.** Student zna odpowiedź na pytanie egzaminacyjne z prawdopodobieństwem p > 0. Jeżeli nie zna odpowiedzi, to zgaduje jedną z k możliwych odpowiedzi z prawdopodobieństwem 1/k. Jakie jest prawdopodobieństwo, że znał odpowiedź, jeżeli wiemy, że odpowiedział prawidłowo?

**Zadanie 4.** W pierwszej urnie znajdują się dwie białe i dwie czarne kule, druga zawiera jedną kulę białą i dwie czarne. Z pierwszej urny wyciągamy losowo dwie kule i przekładamy do drugiej urny, z której losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że do drugiej urny przełożyliśmy dwie białe kule, jeśli wylosowana z drugiej urny kula jest (a) biała, (b) czarna?

Zadanie 5. Bolek i Lolek codziennie kończą pracę niezależnie od siebie, tak by w losowym momencie pomiędzy godziną 17:00 i 17:20 zjawić się na pobliskim przystanku autobusowym, z którego autobus odjeżdza w losowym momencie między 17:00 a 17:10. Pewnego dnia Lolek dociera na przystanek o godz. 17:05 i nie zastaje na nim Bolka. Jakie jest prawdopodobieństwo, że autobus już odjechał?

## DODATEK B. ZADANIA DOMOWE

**Zadanie 1.** Trzy grupy ćwiczeniowe,  $G_1$ ,  $G_2$  i  $G_3$ , liczą odpowiednio 20, 25 i 20 studentów. W każdej z nich liczba przygotowanych do kartkówki wynosi odpowiednio 8, 10 i 10 studentów. Kartkówki piszą wszyscy razem. Sprawdzający wybiera losowo pracę jednego studenta. Jakie jest prawdopodobieństwo, że praca należy do studenta z grupy  $G_1$ , jeśli okazało się, że otrzymał on za nią maksimum punktów?

Zakładamy oczywiście, że studenci przygotowani zawsze dostają maksymalną ocenę z kartkówek.

**Zadanie 2.** W urnie znajduje się 10 losów wygrywających i 100 przegrywających, przy czym pojedynczy los kosztuje złotówkę. Wyciągamy z urny po jednym losie tak długo, aż trafimy los wygrywający (wyciągnięte losy zachowujemy). Ile wynosi prawdopdobieńswto, że będzie nas to kosztowało 4zł?

**Zadanie 3.** W urnie są cztery kule białe i dwie czarne. Wyciągamy jedną kulę z urny i przemalowujemy ją na czerwono, po czym wrzucamy ją do urny, a następnie losujemy następną kulę.

- (a) Jaka jest szansa, że za drugim razem wyciągnęliśmy kulę białą?
- (b) Przypuśćmy, że za drugim razem wylosowaliśmy kulę białą. Jaka jest szansa, że przemalowaliśmy na czerwono jedną z czarnych kul?

(c) Przypuśćmy, że za drugim razem wylosowaliśmy kulę czerwoną. Jaka jest szansa, że przemalowaliśmy na czerwono jedną z czarnych kul? Czy otrzymany wynik jest zaskakujący?

**Zadanie 4.** Spośród mężczyzn 5%, a spośród kobiet 0,25% ma daltonizm (tj. nie rozróżnia niektórych kolorów). Wybieramy losowo osobę (zakładamy, że szanse trafienia na mężczyznę i na kobietę są takie same).

- (a) Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybrana osoba nie rozróżnia kolorów?
- (b) Wylosowana osoba nie rozróżnia kolorów. Oblicz prawdopodobieństwo, że jest to mężczyzna.

**Zadanie 5.** Każda z trzech urn zawiera po cztery kule. W i-tej urnie, i = 1, 2, 3, jest i kul białych i 4 - i kul czarnych. Z losowo wybranej urny (przy czym każda urna jest równoprawdopodobna) losujemy jednocześnie dwie kule.

- (a) Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowane kule będą różnych kolorów?
- (b) Jeśli wylosowane kule są różnych kolorów, ile wynosi prawdopodobieństwo, że wybraliśmy pierwszą urnę?

**Zadanie 6.** W urnie są cztery kule białe i dwie czarne. Wyciągamy jedną kulę z urny, zmieniamy jej kolor na 'przeciwny', wrzucamy z powrotem do urny, a potem wyciągamy następną. Jaka jest szansa, że za drugim razem wyciągnęliśmy kulę białą?

**Zadanie 7.** 60% poczty otrzymywanej przez pewnego internautę stanowi spam. Słowo viagra występuje w 5% wiadomości spamowych oraz w 0.01% wiadomości niespamowych. Internauta otrzymał wiadomość zawierającą słowo viagra – jakie jest prawdopodobieństwo, że jest to spam? Internauta otrzymał wiadomość nie zawierającą słowa viagra – jakie jest prawdopodobieństwo, że jest to spam?

## Dodatek C. Odpowiedzi do zadań domowych

- B.1 (użyj wzoru Bayesa) 2/7
- B.2 (użyj wzoru łańcuchowego)  $\frac{100}{110} \cdot \frac{99}{109} \cdot \frac{98}{108} \cdot \frac{10}{107}$
- B.3 (a) 5/9, (b) 2/5, (c) 1/3 (wynik nie jest zaskakujący, prawdopodobieństwo wylosowania czerwonej kuli w drugim losowaniu nie zależy od tego, co wydarzyło się w pierwszym losowaniu)
- B.4 (a) (użyj wzoru na prawdopodobieństwo całkowite) 2,625%, (b) (użyj wzoru Bayesa)  $\frac{2,5}{2,625}\approx 95,24\%$
- - B.5 (a) (użyj wzoru na prawdopodobieńswo całkowite) 5/9,
- (b) (użyj wzoru Bayesa) 3/10
  - B.6 (użyj wzoru na prawdopodobieństwo całkowite) 11/18
  - B.7 (w obu przypadkach użyj wzoru Bayesa)  $\frac{300}{300,4}\approx 99,87\%,\,\frac{570}{969,96}\approx 58,77\%$