

DMAD - tożsamości kombinatoryczne

Jak przygotować się do rozwiązywania zadań?

Przeczytaj rozdział 3.5 z podręcznika.

Szczypta teorii:

$\binom{a}{b}$

- Na tyle sposobów można wybrać b -elementowy podzbiór zbioru a -elementowego;
- Na tyle sposobów można wybrać b „miejsc” spośród a „miejsc” ustawionych w ciągu (i wpisać na te miejsca konkretną liczbę/znak albo wpisać na pozostałe $b - a$ miejsc konkretną liczbę/znak);
- Tyle jest ciągów binarnych z b „1” i $(a - b)$ „0”;
- Tyle jest rozwiązań w liczbach całkowitych równania

$$x_1 + \dots + x_{a-b+1} = b, \quad x_i \geq 0;$$

- Tyle jest rozwiązań w liczbach całkowitych równania

$$x_1 + \dots + x_{b+1} = a - b, \quad x_i \geq 0;$$

- Tyle jest najkrótszych dróg między przeciwległymi wierzchołkami kraty $b \times (a - b)$.

$(a)_b$

- Tyle jest ciągów długości b o różnych elementach ze zbioru a -elementowego;
- Na tyle sposobów można „wpisać” b **różnych** liczb (znaków) na b „miejsc” wybranych spośród a „miejsc” w ciągu;
- Na tyle sposobów można wybrać b elementów ze zbioru a -elementowego, a następnie ustawić je w ciągu (w kolejności).

a^b ?

- Tyle jest ciągów długości b o elementach ze zbioru a -elementowego;
- Na tyle sposobów możemy wybrać **ze zwracaniem, kolejno** b razy jeden element ze zbioru a elementów;
- Dla $a = 2$, 2^b – liczba podzbiorów zbioru b -elementowego;
- Dla $a = 2$, 2^b – liczba ciągów binarnych długości b .

a ?

- Na tyle sposobów można wybrać jeden (wyróżniony) element ze zbioru a -elementowego;
- Na tyle sposobów można wybrać 1-elementowy podzbiór zbioru a -elementowego;
- Na tyle sposobów można wybrać jedno „miejsce” spośród a „miejsc” ustawionych w ciągu (i wpisać na nie liczbę/znak lub wpisać na pozostałe miejsca konkretną liczbę/znak);
- Tyle jest ciągów binarnych z jedną „1” i $(a - 1)$ „0”.

Twierdzenia 3.2 i 3.3 (wzór Newtona i wzór wielomianowy)

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}, \quad (a_1 + \dots + a_r)^n = \sum_{\substack{t_1, \dots, t_r \geq 0 \\ t_1 + \dots + t_r = n}} \binom{n}{t_1, \dots, t_r} a_1^{t_1} \dots a_r^{t_r}.$$

A Zadania na ćwiczenia

Udowodnij kombinatorycznie podaną tożsamość

Zadanie A.1.

$$n \binom{n-1}{k-1} = k \binom{n}{k}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Zadanie A.2.

$$\sum_{k=2}^n (k)_2 \binom{n}{k} = (n)_2 2^{n-2}, \quad n \geq 2.$$

Zadanie A.3.

$$\sum_{k=3}^n \binom{k-1}{2} = \binom{n}{3}, \quad n \geq 3.$$

Zadanie A.4. Rozpisz wyrażenie $(x + 2y + 3z)^4$ i podaj współczynnik przy x^2yz oraz x^3z .

B Zadania na ćwiczenia - jeśli czas pozwoli

Zadanie B.1. Udowodnij kombinatorycznie następującą tożsamość

$$\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = 3^n, \quad n \geq 0.$$

Zadanie B.2. Udowodnij kombinatorycznie następującą tożsamość

$$\sum_{k=m}^{n-1} \binom{k}{r-1} = \binom{n}{r} - \binom{m}{r}, \quad 0 \leq m < n, 1 \leq r \leq m.$$

Zadanie B.3. Udowodnij kombinatorycznie następującą tożsamość

$$\sum_{k=1}^n k(n+1-k) = \binom{n+2}{3}, \quad n \geq 1.$$

C Zadania do samodzielnej pracy w domu

Zadanie C.1. Spróbuj sama/sam rozwiązać a następnie przeczytaj uważnie rozwiązanie przykładu 3.26 z podręcznika.

Udowodnij kombinatorycznie podaną tożsamość (dotyczy zadań C.2–C.7)

Zadanie C.2.

$$\binom{2n}{2} = 2 \binom{n}{2} + n^2, \quad n \geq 1.$$

Zadanie C.3.

$$\binom{2n}{3} = 2 \left(n \binom{n}{2} + \binom{n}{3} \right), \quad n \geq 1.$$

Zadanie C.4.

$$\binom{m}{n} \binom{n}{k} = \binom{m}{m-k} \binom{m-k}{n-k}, \quad m \geq n \geq k \geq 0.$$

Zadanie C.5.

$$\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

Zadanie C.6.

$$\sum_{k=0}^m \binom{n+k}{k} = \binom{n+m+1}{m}, \quad n, m \geq 1.$$

Zadanie C.7.

$$\sum_{k=0}^n 3^{n-k} \binom{n}{k} = 4^n, \quad n \geq 0.$$

Zadanie C.8. Rozpisz wyrażenie

- a) $(x+y)^6$;
- b) $(x+y+2z)^2$;
- c) $(x+3y)^3$.

Zadanie C.9. Podaj współczynnik przy

- a) xzt^3 ;
- b) y^3z^2 ;

w wyrażeniu $(x+y+2z+2t)^5$.

Zadanie C.10. Zadanie 3.34 z podręcznika.

Odpowiedzi do niektórych zadań

Wskazówki:

C.2 Rozważ na przykład zbiór $2n$ ponumerowanych kul, z których n jest białych a n czarnych.

C.3 Rozważ na przykład zbiór $2n$ ponumerowanych kul, z których n jest białych a n czarnych.

C.4 Rozważ na przykład ciągi ternarne o $m - n$ zerach, $n - k$ jedynkach i k dwójkach.

C.5 Przeanalizuj zadania A.1 i A.2.

C.6 Rozważ na przykład wybór m elementów z uporządkowanego zbioru $(n + m + 1)$ -elementowego, gdzie na początek ustalamy największy element, który **nie należy** do wybieranego podzbioru.

C.7 Rozważ na przykład ciągi długości n o elementach ze zbioru $\{0, 1, 2, 3\}$. Ile mogą mieć one zer?

Odpowiedzi:

C.8

a) $x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6$;

b) $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy + 4xz + 4yz$;

c) $x^3 + 9x^2y + 27xy^2 + 27y^3$.

C.9 a) 320 b) 40