



# MATHÉMATIQUES NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1

Mardi 13 mai 2014 (après-midi)

1 heure 30 minutes

Numéro de session du candidat										

#### Code de l'examen

2 2 1 4 - 7 3 0 7
-------------------

### INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- Écrivez votre numéro de session dans la case ci-dessus.
- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Aucune calculatrice n'est autorisée pour cette épreuve.
- Section A: répondez à toutes les questions dans les cases prévues à cet effet.
- Section B: répondez à toutes les questions sur le livret de réponses prévu à cet effet. Écrivez votre numéro de session sur la première page du livret de réponses, et attachez ce livret à cette épreuve d'examen et à votre page de couverture en utilisant l'attache fournie.
- Sauf indication contraire dans l'intitulé de la question, toutes les réponses numériques devront être exactes ou correctes à trois chiffres significatifs près.
- Un exemplaire non annoté du *livret de formules pour le cours de mathématiques NM* est nécessaire pour cette épreuve.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d'examen est [90 points].




Le total des points ne sera pas nécessairement attribué pour une réponse correcte si le raisonnement n'a pas été indiqué. Les réponses doivent être appuyées par un raisonnement et/ou des explications. Lorsque la réponse est fausse, certains points peuvent être attribués si la méthode utilisée est correcte, pour autant que le raisonnement soit indiqué par écrit. On vous recommande donc de montrer tout votre raisonnement.

## **SECTION A**

Répondez à toutes les questions dans les cases prévus à cet effet. Si cela est nécessaire, vous pouvez poursuivre votre raisonnement en dessous des lignes.

**1.** [*Note maximale : 5*]

La figure suivante représente un triangle rectangle, ABC, où sin  $A = \frac{5}{13}$ .



- (a) Montrez que  $\cos A = \frac{12}{13}$ . [2]
- (b) Trouvez  $\cos 2A$ . [3]




Trouvez la valeur des chacune des expressions suivantes, en donnant votre réponse sous la forme d'un nombre entier.

-4 -


- (a)  $\log_6 36$  [2]
- (b)  $\log_6 4 + \log_6 9$  [2]
- (c)  $\log_6 2 \log_6 12$  [3]

	 			 _	 	 					 						 		 	 _	 		 	 		
																				•	 		 •	 	•	•
	 		 •		 	 		•	•	 •		•	 •	 •	 •		 	•	 		 	 •	 	 		•



**3.** [*Note maximale : 6*]

La figure suivante montre la représentation graphique de y = f(x), pour  $-4 \le x \le 5$ .



- (a) Écrivez la valeur de
  - (i) f(-3);
  - (ii)  $f^{-1}(1)$ . [2]
- (b) Trouvez le domaine de  $f^{-1}$ . [2]
- (c) Dans le repère ci-dessus, esquissez la représentation graphique de  $f^{-1}$ . [2]




4.	<b>Note</b>	maximale		7	7
	11000	111000000000000000000000000000000000000	•	/ /	,

La droite L est parallèle au vecteur  $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

(a) Trouvez la pente de la droite L.

[2]

La droite L passe par le point (9; 4).

(b) Trouvez l'équation de la droite L sous la forme y = ax + b.

[3]

(c) Écrivez une équation vectorielle de la droite L.

[2]

	٠.	٠	 	٠	 •	 •	 •	 	•	 •	 ٠	 •	 •	 	•	 •	 ٠.	•	 •	•	 •	•	 ٠	 	 ٠.	٠	 •
			 			 -	 -	 						 			 		 		 			 	 		
			 		 	 -	 -	 						 			 		 		 			 	 		
	٠.		 		 •	 •	 •	 	•	 •		 •		 	•		 		 		 			 	 		
			 		 •	 -	 -	 	•	 •	 •	 •	 •	 		 •	 		 		 			 	 		
			 		 	 -	 -	 						 			 		 		 			 	 	٠	
			 			 •	 •	 	•	 •		 •		 	•		 ٠.		 		 			 	 ٠.		 ٠
	٠.	•	 	•	 •	 •	 •	 	•	 •		 •		 	•		 		 	• •	 			 	 ٠.	٠	 ٠
l			 		 	 	 	 						 			 		 		 			 	 		



**5.** [*Note maximale : 6*]


La représentation graphique d'une fonction h passe par le point  $\left(\frac{\pi}{12}; 5\right)$ .

Étant donné que  $h'(x) = 4\cos 2x$ , trouvez h(x).





# **6.** [*Note maximale : 6*]

La figure suivante montre une partie de la représentation graphique de y = f(x).



La courbe a un maximum local en A, où x = -2, et un minimum local en B, où x = 6.

(a) Sur le repère suivant, esquissez la représentation graphique de y = f'(x). [4]



(Suite de la question à la page suivante)



(Suite de la question 6)

(b)	Écrivez les valeurs suivantes en ordre, de la plus petite à la plus grande : $f(0)$ , $f'(6)$ , $f''(-2)$ .	[2]



**7.** [*Note maximale : 8*]

Les sommes des termes d'une suite suivent le modèle

$$S_1 = 1 + k$$
 ,  $S_2 = 5 + 3k$  ,  $S_3 = 12 + 7k$  ,  $S_4 = 22 + 15k$  , ..., où  $k \in \mathbb{Z}$  .

- (a) Étant donné que  $u_1 = 1 + k$ , trouvez  $u_2$ ,  $u_3$  et  $u_4$ . [4]
- (b) Trouvez une expression générale de  $u_n$ . [4]




N'écrivez **PAS** vos solutions sur cette page.

#### **SECTION B**

Répondez à toutes les questions sur le livret de réponses fourni. Veuillez répondre à chaque question sur une nouvelle page.

**8.** *[Note maximale : 15]* 

Soit  $f(x) = 3x^2 - 6x + p$ . L'équation f(x) = 0 a deux racines égales.

- (a) (i) Écrivez la **valeur** du discriminant.
  - (ii) À partir de là, montrez que p = 3. [3]

Le sommet de la représentation graphique de f se trouve sur l'axe des abscisses Ox.

- (b) Trouvez les coordonnées du sommet de la représentation graphique de f. [4]
- (c) Écrivez la solution de f(x) = 0.
- (d) Cette fonction peut être écrite sous la forme  $f(x) = a(x-h)^2 + k$ . Écrivez la valeur de
  - (i) a;
  - (ii) h;

(iii) 
$$k$$
.

(e) La représentation graphique d'une fonction g est obtenue à partir de la représentation graphique de f par une symétrie de f par rapport à l'axe des abscisses Ox, suivie d'une translation de vecteur  $\begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ . Trouvez g, en donnant votre réponse sous la forme  $g(x) = Ax^2 + Bx + C$ .



N'écrivez **PAS** vos solutions sur cette page.

## **9.** [Note maximale : 15]

Dans cette question les distances sont en mètres.

Ryan et Jack ont des modèles réduits d'avion qui décollent au niveau du sol. L'avion de Jack décolle après celui de Ryan.

La position de l'avion de Ryan t secondes après son décollage est donnée par  $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

- (a) Trouvez la vitesse de l'avion de Ryan. [3]
- (b) Trouvez la hauteur de l'avion de Ryan après deux secondes. [2]

La position de l'avion de Jack s secondes après **son** décollage est donnée par  $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} -39 \\ 44 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 7 \end{pmatrix}$ .

(c) Montrez que les trajectoires des avions sont perpendiculaires. [5]

Les deux avions entrent en collision au point (-23 ; 20 ; 28).

(d) Combien de temps après le décollage de l'avion de Ryan l'avion de Jack décolle-t-il ? [5]



**10.** [Note maximale : 15]


Soit 
$$f(x) = \frac{2x}{x^2 + 5}$$
.

(a) Utilisez la règle de dérivation du quotient pour montrer que  $f'(x) = \frac{10 - 2x^2}{(x^2 + 5)^2}$ . [4]

-13 -

(b) Trouvez 
$$\int \frac{2x}{x^2 + 5} dx$$
. [4]

La figure suivante montre une partie de la représentation graphique de f.



(c) La région grisée est délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses Ox, et les droites  $x = \sqrt{5}$  et x = q. L'aire de cette région est  $\ln 7$ . Trouvez la valeur de q.







