

## 课后练习2

### 1 问题一

我们要求的是：

$$\begin{aligned} \min_{x,y,z} \quad & x^2 + y^2 + z^2 \\ \text{s.t.} \quad & x + y + z = 9 \\ & x + 2y + 3z = 20 \end{aligned}$$

因此我们可以构造拉格朗日多项式：

$$L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda_1(x + y + z - 9) + \lambda_2(x + 2y + 3z - 20)$$

对于使 $f(x, y, z)$ 最小的 $x^*, y^*, z^*$ ，我们有：

$$\begin{aligned} \nabla_x L(x^*, y^*, z^*, \lambda_1, \lambda_2) &= 0 \\ \nabla_y L(x^*, y^*, z^*, \lambda_1, \lambda_2) &= 0 \\ \nabla_z L(x^*, y^*, z^*, \lambda_1, \lambda_2) &= 0 \\ \nabla_{\lambda_1} L(x^*, y^*, z^*, \lambda_1, \lambda_2) &= 0 \\ \nabla_{\lambda_2} L(x^*, y^*, z^*, \lambda_1, \lambda_2) &= 0 \end{aligned}$$

解得：

$$\begin{aligned} x^* &= 3 \\ y^* &= 4 \\ z^* &= 5 \\ \lambda_1 &= \lambda_2 = -2 \end{aligned}$$

因此 $\min_{x,y,z} f(x, y, z) = 50$

## 2 问题二

### 2.1

对于平面上的样本，它们都满足：

$$y_i(w^T x_i + b) \geq 1$$

取等号当且仅当 $x_i$ 是支持向量. 现在已知 $(6, 5), (5, 9), (2, 4)$ 为支持向量，假设超平面为 $w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$ ，则有：

$$y_{(6,5)}(6w_1 + 5w_2 + b) = 1$$

$$y_{(5,9)}(5w_1 + 9w_2 + b) = 1$$

$$y_{(2,4)}(2w_1 + 4w_2 + b) = 1$$

解得：

$$w = \left(\frac{8}{17}, \frac{2}{17}\right)^T$$
$$b = -\frac{41}{17}$$

### 2.2

对于 $x_1 = (1, 15)$ 和 $x_2 = (4, 2)$ ，有 $w x_1 + b < 0$ 和 $w x_2 + b < 0$ . 因此两个新样本点都是负样本.

### 2.3

**Proof** 对于一个线性可分的数据分布，一定存在一个线性超平面 $w^T x + b = 0$ ，使得正负样本能够完全位于超平面的两侧，其中支持向量是那些满足 $y_i(w^T x_i + b) = 1$ 的向量.

我们不妨假设正样本中不存在支持向量，即不存在使得 $y_i(w^T x_i + b) = 1$ 的向量. 取正样本中 $y_i(w^T x_i + b)$ 值最小的向量 $x_j$ 并记其值为 $k > 1$ ，那么必然有 $y_i((\frac{w}{k})^T x_j + \frac{b}{k}) = 1$ . 且 $(\frac{w}{k})^T x + \frac{b}{k} = 0$ 是同一个线性超平面，这表明 $x_j$ 是正样本中的一个支持向量，假设不成立. 同理可证负样本中也必然存在至少一个支持向量，因此正负样本中均存在至少一个支持向量.

### 3 问题三

#### 3.1

由于已知 $\alpha_i > 0, \forall i$ , 故这6个样本点均为支持向量, 因此可以计算得到:

$$b = \frac{1}{y_1} - \sum_{i=1}^6 \alpha_i y_i \exp\left(-\frac{\|x_i - x_1\|^2}{2}\right) \\ \approx -0.07389$$

#### 3.2

$$f(x) = \sum_{i=1}^6 \alpha_i y_i \exp\left(-\frac{\|x - x_i\|^2}{2}\right) + b$$

#### 3.3

对于样本 $x_4 = (2, 2)$ :

$$f(x_4) = \sum_{i=1}^6 \alpha_i y_i \exp\left(-\frac{\|x_i - x_4\|^2}{2}\right) + b < 0$$

故可以验证其是一个负样本

对于新的样本点 $x_7 = (-2, -2)$ :

$$f(x_7) = \sum_{i=1}^6 \alpha_i y_i \exp\left(-\frac{\|x_i - x_7\|^2}{2}\right) + b > 0$$

故其是一个正样本

### 4 问题四

#### 4.1

加入松弛变量前:

$$y_3(w^T x_3 + b) = 1 \\ y_4(w^T x_4 + b) = 1$$

因此 $x_3$ 和 $x_4$ 是支持向量

加入松弛变量后, 由于 $\xi_1 = \xi_2 = \xi_4 = 0$ , 而

$$y_3(w'^T x_3 + b') \geq 1 - \xi_3 = -0.5$$

故新的分隔超平面为:

$$0.5x^{(1)} + 0.5x^{(2)} - 2 = 0$$

此时 $x_2$ 和 $x_4$ 为支持向量

## 4.2

硬间隔为:

$$\frac{|w^T x_3 + b|}{||w||} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

软间隔为:

$$\frac{|w'^T x_2 + b'|}{||w'||} = \sqrt{2}$$

间隔变大, 模型的鲁棒性更高, 对噪声的抗干扰能力更强

## 4.3

设四个数据点的Hinge Loss为 $L_1, \dots, L_4$ , 则:

$$L_1 = \max\{0, 1 - y_1(w'^T x_1 + b')\} = 0$$

$$L_2 = \max\{0, 1 - y_2(w'^T x_2 + b')\} = 0$$

$$L_3 = \max\{0, 1 - y_3(w'^T x_3 + b')\} = 1.5$$

$$L_4 = \max\{0, 1 - y_4(w'^T x_4 + b')\} = 0$$

只有分错的点和非常靠近超平面的点的Hinge Loss才不会为0, 其余数据点均为0, 不用考虑, 因此模型的稀疏性得到了保证