



johan@starre.se

Patologi, skador

Behandling akuta skador

Målsättning: Minskad svullnad

- **PRICE:**

- Protection (pressure)
- Rest - **POLICE: Optimal Load**
- Ice
- Compression
- Elevation





Vissa skador måste till sjukhus för läkarbehandling och utredning:

Snarast:

Vid medvetslöshet eller kvarstående huvudvärk, illamående, kräkningar eller yrsel

efter en skullskada.

Vid andningsbesvär efter slag mot skalle, hals eller bröstorg.

Vid smärtor från nacken efter våld, med eller utan utstrålning till armar.

Vid buksmärter.

Vid blod i urinen efter bukskada.



johan@starre.se

Vissa skador måste till sjukhus för läkarbehandling och utredning:

Snarast:

Vid benbrott eller misstanke om detta.

Vid svåra led- eller ledbandsskador, muskel- eller senskador.

Vid urledvridningar.

Vid ögonskador.

Vid djup sårskada med blödning.

Vid skador med intensiva smärtor.

När du är osäker på skadans svårighetsgrad, diagnos eller behandling.



Vissa skador måste till sjukhus för läkarbehandling och utredning:

Inom 1-2 dygn vid

Vid kvarstående besvär av muskel- och senskada.


Vid kvarstående besvär från led- och ledbandsskada.

Vid svåra smärtor.

Vid fortsatt osäkerhet om diagnos eller behandling.

Behandling av belastningsskador

- Bryta smärtmönster
- Minska stress och oro
- Bakomliggande orsak
- Eliminera utlösande faktorer
- Återfå funktion
- Skapa smärtfrihet
- Återgång, återhämtning, kost
- Motverka inaktivitet



Riskfaktorer inom idrott

- **Yttre riskfaktorer**
 - För tung belastning
 - För många upprepningar
 - För hastiga rörelser
 - För snabb stegring
 - För hög intensitet
 - För kort vila
 - För ensidig träning
 - För oregelbunden träning
 - Bristfällig teknik



Riskfaktorer inom idrott

- **Inre riskfaktorer**
 - Bristande rehab av gamla skador
 - Anatomiska felställningar
 - Benlängds skillnader
 - Nedsatt balans
 - Nedsatt koordination
 - Muskelsvaghet
 - Muskelobalans
 - Nedsatt rörlighet
 - Obalans i rörlighet
 - Instabilitet i led



Principer för rehabilitering

- Akut fas
- Rehabiliteringsfas
- Träningsfas
- Mätinstrument:
 - smärta
 - svullnad



Rehabiliteringens mål

- **Akutfas, dag till vecka**
 - PRICE
 - Begränsa svullnad
 - Undvika att förvärra skadan
 - Smärtlindring
- **Rehabiliteringfas, vecka till månad**
 - Förbättra rörelse till normal funktion
- **Träningfas, veckor till månader**
 - 100% rörelse, styrka och balans
 - Minska risken för att upprepa skada

Rehabiliteringsfas

- **Övningar utan smärta.**
- **Tyngdpunkt på funktion och balans**
- **Normalisera:**
 - Rörelseomfång
 - Styrka
 - Neuromuskulär funktion
 - Aerob kapacitet

Dosering


- **Cirkulation och rörlighet**
 - Lätt belastning och många reps
- **Max styrka**
 - Upp till 6 reps
- **Ökad rörlighet**
 - Stretch och träning till ytterläge
- **Stabilitet**
 - Kontraktion (=kontroll) i hela rörelsen
- **Plyometrisk träning (grenspecifik)**
 - Snabbt byte mellan koncentrisk och excentrisk fas

Återgång

- **Bedömning**
 - Neuromuskulär funktion
 - Rörelseutslag
 - Grenspecifika test innan återgång
 - 90 % av styrkan innan återgång till tävlan. Räcker det?

Understödjande behandling

- NSAID
- Värme / kyla
- NMES
- UL
- Värmeskydd
- Ortoser
- Tejp





Förebyggande

- **Kontinuerlig stabilitetsträning**
- **God styrka i det inre muskellagret**
- **Excentrisk träning i ytterläge**
- **Grenspecifikt förebyggande**
- **Ex: Knäkontroll – kvinnor**

Röda flaggor

- **Debut ryggsmärta under 18 och över 55**
- **Trauma bakom smärtan**
- **Konstant eller stegrande icke mekanisk smärta**
- **Nattsmärta**
- **Smärta från bröstryggraden**
- **Tidigare cancer**
- **Långvarig behandling med kortison**
- **Drogmissbruk, HIV**

Röda flaggor

- **Feber**
- **Viktförlust**
- **Dåligt allmäntillstånd**
- **Svår rörelseinskränkning**
- **Strukturella deformiteter**
- **Spridda neurologiska symtom från flera segment**
- **Cauda equina-syndrom**
- **Olika stora pupiller**

Gula flaggor

- **Emotionella**, rädsla, ångest
- **Kognitiva**, katastroftankar, övertygelse om att smärta = skada, övertygelse om att smärtan måste försvinna helt innan man kan återgå till arbete eller träning
- **Beteende**, rörelserädsla, medicinberoende