espacio CORPORAL

Salud y Bienestar

N.º **EC-0001**

Rp.

1. **Amoxicilina / Ácido clavulánico 875/125 mg** — 14 tabletas
   Tabletas recubiertas
2. **Ibuprofeno 400 mg — Comprimidos** — 20 comprimidos
3. **Loratadina 10 mg — Tabletas** — 10 tabletas
4. **Solución salina 0,9 % — Spray nasal 30 ml** — 1 frasco

Dr.:_____
CI:_____
MPPS:_____

Paciente: María Fernanda Rodríguez Blanco Fecha: 14/08/2026

espacio CORPORAL

Salud y Bienestar

N.º **EC-0001**

Ind.

1. **Amoxicilina / Ácido clavulánico 875/125 mg**
   1 tableta vía oral cada 12 horas durante 7 días.
   Tomar con las comidas para reducir la molestia estomacal.
   Completar los 7 días aunque los síntomas cedan antes.
2. **Ibuprofeno 400 mg**
   1 comprimido cada 8 horas, sólo si hay dolor o fiebre mayor de 38 °C.
   No tomar en ayunas. Suspender si aparece ardor estomacal y avisar a la consulta.
3. **Loratadina 10 mg**
   1 tableta diaria en la noche por 10 días.
   Puede dar somnolencia: preferible tomarla antes de dormir.
4. **Solución salina 0,9 %**
   2 aplicaciones en cada fosa nasal, 3 veces al día.

Reposo relativo por 48 horas. Abundantes líquidos (2 a 3 litros al día). Evitar bebidas alcohólicas mientras dure el tratamiento. Control en consulta dentro de 8 días, o antes si aparece fiebre que no cede, dificultad para respirar o dolor en el pecho.

Paciente: María Fernanda Rodríguez Blanco Fecha: 14/08/2026