

Nota técnica Nº 251/2024, do Ministério da Saúde:

Trata das **recomendações para a suplementação de cálcio durante a gestação**, destinada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde, com vistas à prevenção de distúrbios hipertensivos e redução do risco de pré-eclâmpsia.

RECOMENDAÇÕES PRINCIPAIS DA NOTA:

Recomenda-se a **suplementação de dois (2) comprimidos de carbonato de cálcio 1.250 mg (500 mg de cálcio) ao dia**, equivalente a 1.000 mg de cálcio elementar, **para todas as gestantes, com início na 12ª semana de gestação até o momento do parto**. A prescrição pode ser feita por médicos ou enfermeiros da APS.

A administração concomitante dos suplementos de cálcio e do ferro deve ser evitada. **Recomenda-se que a ingestão do suplemento de cálcio ocorra com intervalo mínimo de 2 horas do suplemento de ferro** (sulfato ferroso) ou de polivitamínicos contendo ferro

Sugere-se que o cálcio **não seja ingerido em jejum**. Além disso, **deve-se evitar a ingestão do suplemento em associação com alimentos ricos em fitatos, oxalatos ou ferro** (ex.: feijão, fígado, espinafre, acelga, couve, beterraba, batata doce, sementes, castanhas ou cereais), bem como **deve-se evitar a ingestão do suplemento com alta ingestão de cafeína e de alimentos ultraprocessados**, pois podem afetar a absorção do cálcio. Uma opção é a ingestão no período da noite com um copo de leite ou suco de frutas, por exemplo.

>> Temos a medicação disponível na farmácia municipal e distritais <<