

Ćwiczenia z ANALIZY NUMERYCZNEJ (L)

Lista nr 8

26 listopada 2025 r.

Zajęcia 9 grudnia 2025 r.
Zaliczenie listy **od 4 pkt.**

L8.1. 1 punkt Znajdź naturalną interpolacyjną funkcję sklejaną trzeciego stopnia (*w skrócie*: NIFS3) dla danych

a)
$$\frac{x_k}{y_k} \left| \begin{array}{c|c|c} -1 & 0 & 5 \\ \hline 25 & -25 & 25 \end{array} \right|,$$

b)
$$\frac{x_k}{y_k} \left| \begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c} -3 & -1 & 0 & 5 & 6 & 10 & 13 & 100 \\ \hline 8052 & 4002 & 1977 & -8148 & -10173 & -18273 & -24348 & -200523 \end{array} \right|.$$

L8.2. 1 punkt Czy funkcja

$$f(x) = \begin{cases} 563 + 330t + 75t^2 + 5t^3 & \text{dla } -5 \leq x \leq -2, \\ 163 - 270t - 225t^2 - 45t^3 & \text{dla } -2 \leq x \leq 0, \\ 163 - 270t - 225t^2 + 169t^3 & \text{dla } 0 \leq x \leq 1, \\ 379 - 918t + 423t^2 - 47t^3 & \text{dla } 1 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

jest NIFS3 dla pewnych danych (obserwacji) odpowiadającym węzłom $-5, -2, 0, 1, 3$?

L8.3. 1 punkt Czy istnieją takie stałe a, b, c, d , że funkcja

$$f(x) = \begin{cases} -2026x + 2025 & \text{dla } -4 \leq x \leq -2, \\ ax^3 + bx^2 + cx + d & \text{dla } -2 \leq x \leq 2, \\ 2026x - 2025 & \text{dla } 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

jest NIFS3 dla pewnych danych (obserwacji) odpowiadającym węzłom $-4, -2, 2, 4$?

L8.4. 1 punkt Niech s będzie naturalną funkcją sklejaną trzeciego stopnia interpolującą funkcję f w węzłach $x_0, x_1, \dots, x_n$ ($a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$). Jak wiemy, *momenty* $M_k := s''(x_k)$ ($k = 0, 1, \dots, n$) spełniają układ równań

$$(1) \quad \lambda_k M_{k-1} + 2M_k + (1 - \lambda_k)M_{k+1} = d_k \quad (k = 1, 2, \dots, n-1),$$

gdzie $M_0 = M_n = 0$ oraz

$$d_k := 6f[x_{k-1}, x_k, x_{k+1}], \quad \lambda_k := h_k/(h_k + h_{k+1}), \quad h_k := x_k - x_{k-1}.$$

Sformułuj i uzasadnij oszczędny algorytm rozwiązywania układu (1). Jaki jest koszt jego realizacji?

L8.5. 2 punkty Niech będzie $\mathbf{x} := [x_0, x_1, \dots, x_n]$ ($x_0 < x_1 < \dots < x_n$), $\mathbf{y} := [y_0, y_1, \dots, y_n]$ oraz $\mathbf{z} := [z_0, z_1, \dots, z_m]$. Niech s_n oznacza NIFS3 spełniającą warunki $s_n(x_k) = y_k$ ($0 \leq k \leq n$). W języku PWO++ procedura NSpline3($\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$) wyznacza wektor $\mathbf{Z} :=$

$[s_n(z_0), s_n(z_1), \dots, s_n(z_m)]$, z tym, że **musi być** $m < 2n$. Załóżmy, że wartości pewnej funkcji ciągłej f znane są **jedynie** w punktach $x_0 < x_1 < \dots < x_{100}$. Wiadomo, że NIFS3 odpowiadająca danym $(x_k, f(x_k))$ ($0 \leq k \leq 100$) bardzo dobrze przybliża funkcję f . Wywołując procedurę **NSpline3 tylko raz**, opracuj algorytm numerycznego wyznaczania przybliżonych wartości wszystkich miejsc w przedziale $[x_0, x_{100}]$, w których funkcja f ma ekstrema lokalne.

- L8.6.** 1 punkt Ustalmy liczby naturalne M oraz N . Niech dane będą węzły $t_0 < t_1 < \dots < t_N$ oraz liczby rzeczywiste y_{mk} , gdzie $0 \leq k \leq N$, a $m = 1, 2, \dots, M$. Niech s_m oznacza NIFS3 spełniającą następujące warunki:

$$s_m(t_k) = y_{mk} \quad (0 \leq k \leq N)$$

dla $1 \leq m \leq M$. Opracuj **oszczędny** algorytm konstrukcji funkcji $s_1, s_2, \dots, s_M$.

- L8.7.** **Włącz komputer!** 2 punkty Niech s_x i s_y będą naturalnymi funkcjami sklejanymi trzeciego stopnia spełniającymi następujące warunki interpolacyjne:

$$s_x(t_k) = x_k, \quad s_y(t_k) = y_k \quad (k = 0, 1, \dots, 95),$$

gdzie $t_k := \frac{k}{95}$ ($k = 0, 1, \dots, 95$), natomiast

$$\begin{aligned} [x_0, x_1, \dots, x_{95}] &:= [5.5, 8.5, 10.5, 13, 17, 20.5, 24.5, 28, 32.5, 37.5, 40.5, 42.5, 45, 47, \\ &49.5, 50.5, 51, 51.5, 52.5, 53, 52.8, 52, 51.5, 53, 54, 55, 56, 55.5, 54.5, 54, 55, 57, 58.5, \\ &59, 61.5, 62.5, 63.5, 63, 61.5, 59, 55, 53.5, 52.5, 50.5, 49.5, 50, 51, 50.5, 49, 47.5, 46, \\ &45.5, 45.5, 45.5, 46, 47.5, 47.5, 46, 43, 41, 41.5, 41.5, 41, 39.5, 37.5, 34.5, 31.5, 28, 24, \\ &21, 18.5, 17.5, 16.5, 15, 13, 10, 8, 6, 6, 6, 5.5, 3.5, 1, 0, 0, 0.5, 1.5, 3.5, 5, 5, 4.5, 4.5, 5.5, \\ &6.5, 6.5, 5.5], \\ [y_0, y_1, \dots, y_{95}] &:= [41, 40.5, 40, 40.5, 41.5, 41.5, 42, 42.5, 43.5, 45, 47, 49.5, 53, 57, 59, \\ &59.5, 61.5, 63, 64, 64.5, 63, 61.5, 60.5, 61, 62, 63, 62.5, 61.5, 60.5, 60, 59.5, 59, 58.5, \\ &57.5, 55.5, 54, 53, 51.5, 50, 50, 50.5, 51, 50.5, 47.5, 44, 40.5, 36, 30.5, 28, 25.5, 21.5, \\ &18, 14.5, 10.5, 7.5, 4, 2.5, 1.5, 2, 3.5, 7, 12.5, 17.5, 22.5, 25, 25, 25, 25.5, 26.5, \\ &27.5, 27.5, 26.5, 23.5, 21, 19, 17, 14.5, 11.5, 8, 4, 1, 0, 0.5, 3, 6.5, 10, 13, 16.5, 20.5, \\ &25.5, 29, 33, 35, 36.5, 39, 41]. \end{aligned}$$

Biorąc pod uwagę zadanie **L8.6**, opracuj **własną implementację** wyznaczania NIFS3. Następnie użyj jej do narysowania łamanej łączącej punkty

$$(s_x(u_0), s_y(u_0)), (s_x(u_1), s_y(u_1)), \dots, (s_x(u_M), s_y(u_M)),$$

gdzie $u_k := \frac{k}{M}$ ($k = 0, 1, \dots, M$), a M jest odpowiednio dużą liczbą naturalną. Co przedstawia ta łamana?

Konkurs



Patrz niżej

Konkurs

Stosując podejście podobne do opisanego w zadaniu **L8.7**, wykorzystaj NIFS3 do odtworzenia następującego napisu:

Więcej numerków, please :-)

(wersja PDF skanu oryginalnego napisu dostępna jest [tutaj](#)). Rozwiązanie można nadsyłać do **31 grudnia 2025 r.** na adres pwo@cs.uni.wroc.pl (temat listu: *AN: konkurs*). Musi ono zawierać dokładnie 4 pliki:

- plik `konkurs-<numerindeksu>.bmp` albo `konkurs-<numerindeksu>.png` o rozmiarze nieprzekraczającym 1MB zawierający odtworzony napis,
- plik `konkurs-<numerindeksu>.zip` z czytelnym i skomentowanym kodem źródłowym przygotowanego programu i ewentualnymi plikami dodatkowymi,
- plik tekstowy `konkurs-<numerindeksu>-dane.txt` zawierający dane wszystkich użytych NIFS3 (np. w zadaniu **L8.7**, gdzie użyto jednej krzywej NIFS3 danymi tymi są tablice $x := [x_0, x_1, \dots, x_{95}]$, $y := [y_0, y_1, \dots, y_{95}]$, $t := [t_0, t_1, \dots, t_{95}]$ oraz $u := [u_0, u_1, \dots, u_M]$ — taki właśnie format zapisu danych proszę stosować; dane dla kolejnych NIFS3 oddzielamy pustym wierszem),
- plik tekstowy `konkurs-<numerindeksu>-podsumowanie.txt` zawierający tylko jeden wiersz postaci

`<liczba użytych NIFS3>, <liczba wszystkich punktów interpolacji>, <suma rozmiarów wszystkich tablic u>`

(np. w zadaniu **L8.7** jest to $1, 96, M + 1$).

Uwaga! Zgłoszenia konkursowe niespełniające podanej wyżej specyfikacji nie będą oceniane.

Każda osoba wyróżniona w konkursie **otrzyma do 7 dodatkowych punktów na egzaminie końcowym**. Komisja konkursowa^a **bierze pod uwagę m.in.** efekt wizualny, liczbę użytych NIFS3 oraz łączny rozmiar danych.

^aSami baaardzo ważni ludzie 😊

L8.8. Dodatkowe zadanie programistyczne (do 11 stycznia 2026 r.; do 6 punktów) ¹

Jest rok 2284. Autonomiczny latający dron *Floty Naukowej* został wysłany na misję do puszczy na odległej planecie, aby zbierać dokumentację o lokalnej faunie i florze. Na polanach tej puszczy żyje rdzenna ludność o mniej zaawansowanym poziomie rozwoju kulturalnego i technologicznego. *Podstawowa Zasada Badawcza Floty Naukowej* (nazywana dalej *PZB*) zakazuje zakłócania ewolucji kulturowej innych gatunków. Takim zakłóceniem niewątpliwie byłoby pojawienie się drona na niebie nad polaną. Dlatego drony zaprogramowano tak, aby nie zostały zauważone, a dokładniej – aby unikały obszarów w kształcie koła, w których znajdują się polany.

Pewnego dnia odnaleziono krytyczny błąd oprogramowania drona, przez który nie ma pewności, że wybrana trasa faktycznie unikała zakazanych obszarów. Jedyne wiarygodne informacje o położeniu i ruchu drona to zapisywane w określonych odstępach czasu położenie i prędkość. Zespół operatorek i operatorów drona próbuje ustalić, czy doszło do złamania *PZB*.

Analizując sytuację, jedna z osób przypomniała sobie, że wielomian interpolacyjny można konstruować nie tylko w oparciu o wartości funkcji w węzłach, ale również wykorzystując informacje o wartościach jej pierwszej i kolejnych pochodnych w tych węzłach. Taki rodzaj interpolacji nazywamy *interpolacją Hermite’a*. Zobacz np. [1, §4.3.1], [2, §2.4].

- (a) Sformułuj zadanie interpolacji wielomianowej Hermite’a i udowodnij, że ma ono zawsze jednoznaczne rozwiązanie.
- (b) Zapoznaj się z oszczędnymi algorytmami wyznaczania postaci Newtona wielomianu interpolacyjnego Hermite’a i potrzebnych do tego tzw. *uogólnionych ilorazów różnicowych*.
- (c) Trajektorię ruchu drona w czasie można opisać na płaszczyźnie (dla uproszczenia przyjmujemy, że dron przeprowadza badania na stałej wysokości) przy pomocy krzywej parametrycznej

$$\gamma(t) := [(x(t), y(t)) : t \geq 0] \quad (t - \text{czas}).$$

Dla zadanych: liczb rzeczywistych $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$ (czas), wartości funkcji $x(t_0), y(t_0), x(t_1), y(t_1), \dots, x(t_n), y(t_n)$ (położenie drona) oraz ich pochodnych $x'(t_0), y'(t_0), x'(t_1), y'(t_1), \dots, x'(t_n), y'(t_n)$ (prędkość drona), opracuj algorytm konstrukcji postaci Newtona wielomianów Hermite’a $H_x, H_y \in \Pi_{2n+1}$ spełniających następujące warunki:

$$H_x(t_k) = x(t_k), \quad H'_x(t_k) = x'(t_k), \quad H_y(t_k) = y(t_k), \quad H'_y(t_k) = y'(t_k)$$

($k = 0, 1, \dots, n$). Sprawdź dla wielu doborów interpolowanych funkcji x, y oraz węzłów t_k działanie tego rodzaju interpolacji w praktyce.

- (d) Pora przekonać się, czy doszło do złamania *PZB*. Dla zadanych $t_i := t_0 + ih$ ($i = 0, 1, \dots, n$; $h, t_0 > 0$ – ustalone), położenia drona (wartości $x(t_i), y(t_i)$) i jego prędkości (wartości $x'(t_i), y'(t_i)$) ($0 \leq i \leq n$) oraz obszarów zakazanych

¹Patrz pkt. 14. [regulaminu](#) zaliczania ćwiczeń.

$K_0, K_1, \dots, K_m$ ($m \in \mathbb{N}$) będących kołami o środkach odpowiednio w punktach $z_j := (z_j^x, z_j^y)$ i promieniach $r_j > 0$ ($j = 0, 1, \dots, m$), określ – wykorzystując interpolację wielomianową Hermite’a – czy dron złamał PZB.

Wykonaj szczegółowe testy dla różnych trajektorii drona i różnych zestawów obszarów zakazanych.

Literatura

- [1] G. Dahlquist, Å. Björck, *Numerical Methods in Scientific Computing*, Volume 1, SIAM, 2008.
- [2] J. i M. Jankowsky, *Przegląd metod i algorytmów numerycznych*, cz. 1., WNT, 1988.

Autor zadania: *Filip Chudy*.

L8.9. Dodatkowe zadanie programistyczne (do 11 stycznia 2026 r.; do 6 punktów)² Metodę Newtona można stosować także do znajdowania rozwiązań równania nieliniowego $f(z) = 0$ w dziedzinie liczb zespolonych. Np. dla $f(z) := z^4 + 1$ i $z_0 := 0.5 + 0.5i$ otrzymujemy $z_{10} = 0.7071067812 + 0.7071067812i$ – czyli bardzo dobre przybliżenie liczby $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$, będącej jednym z rozwiązań równania $z^4 + 1 = 0$.

Niech c_{n+1} oznacza kolor czarny. Niech $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n$ będą rozwiązaniami równania $z^n + 1 = 0$ w dziedzinie liczb zespolonych. Przypiszmy każdemu z tych rozwiązań inny, ale różny od czarnego, kolor; powiedźmy odpowiednio $c_1, c_2, \dots, c_n$. Niech M będzie liczbą parzystą, a W_M następującym zbiorem punktów płaszczyzny zespolonej:

$$W_M := \left\{ -1 + 2\frac{k}{M} + \left(-1 + 2\frac{l}{M} \right) i : k, l = 0, 1, \dots, M \right\}.$$

Dla wybranych n i M (np. $n = 3, 4, 5, 6$; $M = 400, 800$), wykonaj rysunek, na którym każdy z punktów w zbioru W_M zostanie narysowany kolorem $c(w)$ ustalonym na podstawie poniższej procedury:

- (a) $z_0 := w$; $z_{k+1} := z_k - \frac{f(z_k)}{f'(z_k)}$ ($k = 0, 1, \dots, N-1$; np. $N = 10, 20, 35$);
- (b) jeśli istnieje takie k , że z_N jest *blisko* liczby ζ_k (jak należy to rozumieć w wypadku liczb zespolonych?), to przyjmujemy $c(w) := c_k$, w przeciwnym razie $c(w) := c_{n+1}$.

Jaki charakter ma otrzymany w ten sposób obraz? Spróbuj przeanalizować zaobserwowane zjawisko i wyciągnąć wnioski. Następnie przeprowadź podobny eksperyment dla metody Halleya, która wyraża się wzorem

$$z_{k+1} := z_k - 1 / \left[\frac{f'(z_k)}{f(z_k)} - \frac{1}{2} \cdot \frac{f''(z_k)}{f'(z_k)} \right].$$

Czy metoda ta zachowuje się podobnie?

(–) *Paweł Woźny*

²Patrz pkt. 14. **regulaminu** zaliczania ćwiczeń.