

Cours MP2I

Alexandre

Table des matières

1	Notes	1
2	Notions d'ensemble	2
2.1	Relations d'ordre	2
2.2	ZFC	2
2.3	Ensemble quotient	3
3	Idéaux d'un anneau	5
3.0.1	Définitions	5
4	Propriétés des anneaux	6
4.1	Définitions	6
4.1.1	Propositions	6
4.2	Propriétés remarquables	7
4.2.1	Théoreme d'isomorphisme	7
4.2.2	Opérations sur les idéaux	7
4.2.3	Algèbres	7
4.3	Types d'anneaux	7
4.3.1	Anneaux noethériens	7
4.3.2	Anneaux factoriels	7
4.3.3	Anneaux intégralement clos	8
5	Corps	9
5.1	9

1 Notes

Nullstellensatz : (démonstration ?)

- Idéaux
- Algébriquement clos
- Bézout ?

Topologie de Zariski : ? ? ? ?

- Lemme de Zorn (AC)

Dimension : ?

Projectif/Affine : ?

2 Notions d'ensemble

2.1 Relations d'ordre

Remarque 1

Dans un ordre total, les notions d'élément maximal et de plus grand élément sont confondues (de même pour l'élément minimal et le plus petit élément)

TODO : définition élément maximal et pge

2.2 ZFC

Définition 2 (chaîne)

Une chaîne d'un ensemble partiellement ordonné est une partie sur laquelle l'ordre est total.

Définition 3 (ensemble inductif)

Soit (E, \leq) un ensemble ordonné. On dit que E est un ensemble inductif si toute partie totalement ordonnée (càd toute chaîne) admet un majorant dans E .

On remarque alors que tout ensemble ordonné fini est inductif. Cependant ce n'est pas le cas d'ensemble comme $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \dots$, on a bien $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ mais \mathbb{N} n'admet aucun majorant dans \mathbb{Z} .

Théorème 4 (lemme de Zorn)

Tout ensemble non vide et inductif admet au moins un élément maximal.

Définition 5 (bon ordre)

Un ensemble E est bien ordonné si toute partie non vide de E admet un plus petit élément. Toute relation d'ordre vérifiant cette propriété sur E est un bon ordre.

On remarque aussi qu'un bon ordre est forcément total. Si on regarde une paire $\{a, b\}$ de E , on peut toujours comparer a et b car il y a un plus petit élément.

Théorème 6 (théorème de Zermelo)

Tout ensemble E non vide, peut être bien ordonné.

Théorème 7 (axiome du choix)

Pour tout ensemble non vide E , il existe au moins une application f de $\mathcal{P}(E)$ dans E telle que $\forall A \subseteq E$, avec $A \neq \emptyset$, on ait $f(A) \in A$.

Donc f est une "fonction de choix" qui permet de choisir un élément dans une partie de E non vide.

Proposition 8

Le lemme de Zorn, le théorème de Zermelo et l'axiome du choix sont équivalents.

Démonstration. Zermelo \implies Choix

Soit E un ensemble non vide qu'on munit d'un bon ordre grâce au théorème de Zermelo. Soit A une partie non vide de E , alors elle admet un plus petit élément a . On pose $f(A) = a$ tel qu'on a défini $f : \mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset\} \longrightarrow E$.

$$A \longmapsto a$$

On peut ensuite définir $f(\emptyset)$ de manière quelconque pour avoir une fonction de choix f sur E . Par exemple on prends $f(\emptyset) = f(E)$.

□

Si on veut maintenant justifier Zorn \implies Zermelo, on doit d'abord considérer les parties de E que l'on peut munir d'un bon ordre, et montrer que leur ensemble est inductif.

Proposition 9

Soit un ensemble non vide E , on considère \mathcal{M} l'ensemble des couples (A, O_A) où A est une partie non vide de E et O_A un bon ordre sur A .

Remarque 10

On a clairement $\mathcal{M} \neq \emptyset$ car si on prends une partie A de cardinal fini n , alors il existe une bijection $\varphi : [1; n] \longrightarrow A$ (avec a_1, \dots, a_n éléments distincts de A).

$$n \longmapsto a_n$$

On peut ordonner A par O_A défini par $a_i O_A a_j \iff i < j$: c'est un bon ordre car l'élément le plus petit d'une partie A est associé à l'entier le plus petit.

<TODO : remplacer les \square >

Proposition 11

On peut munir l'ensemble \mathcal{M} de la relation d'ordre suivante :

$$(A, O_A) \preceq (B, O_B) \iff \begin{cases} A \subseteq B \\ O_A \text{ est la restriction de } O_B \text{ à } A \\ A \text{ est partie héréditaire de } B \end{cases}$$

Démonstration. Exercice (cf Bernard Gaustiaux) \square

<segment initial = partie héréditaire?>

Proposition 12

L'ensemble \mathcal{M} , non vide, ainsi ordonné, est inductif.

Démonstration. TODO \square

<Pertinence de l'axiome du choix dans le cas d'un ensemble fini?>

<TODO probleme 2 alain troesh>

2.3 Ensemble quotient

Définition 13 (classe d'équivalence)

Soit R une relation d'équivalence sur un ensemble E . Soit $x \in E$, on considère la partie \tilde{x} de E définie par :

$$y \in \tilde{x} \iff x R y$$

C'est la classe d'équivalence de x

C'est l'ensemble des y équivalent à x . Cette partie est non vide car $x \in \tilde{x}$.

Définition 14 (partition)

Une partition d'un ensemble E est définie par :

(a) l'union des classes d'équivalences donne $\biguplus_{x \in E} \tilde{x} = E$

(b) $\forall x \in E, \tilde{x} \neq \emptyset$

(c) $\forall x, y \in E, x \neq y \Rightarrow \tilde{x} \cap \tilde{y} = \emptyset$

Lemme 15

Soient $x, y \in E$. On a :

$$x \sim y \iff \tilde{x} = \tilde{y}$$

On déduit que deux classes distinctes sont disjointes.

Théorème 16 (partition formée par les classes d'équivalence)

L'ensemble des classes d'équivalences sous \sim forme une partition de E .

Les différentes classes d'équivalence des éléments de E sont des parties E , non vides, disjointes, dont la réunion donne E (d'après la définition d'une partition).

Définition 17 (ensemble quotient)

L'ensemble des parties de E dont les éléments sont des classes d'équivalence s'appelle l'ensemble quotient de E par R , noté E/R

Proposition 18 (application canonique)

Si R est une relation d'équivalence, l'application $\pi : E \longrightarrow E/R$ associe un élément x de E à sa classe d'équivalence.

Elle est surjective car chaque classe d'équivalence F est non vide, tout élément de F est envoyé par π sur F (donc on a : $\forall x \in F, \pi(x) = F$)

3 Idéaux d'un anneau

3.0.1 Définitions

Définition 19 (idéal d'un anneau)

Soit A un anneau. Un sous-ensemble $I \subseteq A$ est un idéal de A si :

- (a) $(I, +)$ est un sous groupe de $(A, +)$
- (b) $\forall a \in A, \forall b \in I, ab = ba \in I$

Définition 20 (idéal premier)

Soit A un anneau, I un idéal de A , I est premier si et seulement si l'anneau A/I est intègre. Cela revient au même d'imposer :

- $A \neq I$
- $\forall a, b \in A, ab \in I \implies a \in I \text{ ou } b \in I$

Définition 21 (idéal maximal)

Un idéal I de A est dit maximal si $I \neq A$ et si pour tout idéal J de A tel que $I \subseteq J$ et $J \neq A$, on a $J = I$. (I est l'élément maximal pour l'inclusion)

4 Propriétés des anneaux

4.1 Définitions

Définition 22 (éléments associés)

Soit A un anneau intègre. Deux éléments a et b de A sont dits associés si a divise b et si b divise a .

Par exemple, si on se place dans $\mathbb{K}[X]$, deux polynômes associés sont égaux s'ils sont unitaire.
<anneaux principaux>

4.1.1 Propositions

Proposition 23

Soit I un idéal de A . On a donc :

$$I \text{ maximal} \iff A/I \text{ est un corps} \implies A/I \text{ intègre} \iff I \text{ premier}$$

Théorème 24 (lien idéaux et morphisme d'anneaux)

Une partie I d'un anneau A est un idéal bilatère si et seulement si I est le noyau d'un morphisme d'anneaux.

Démonstration. TODO □

Proposition 25 (anneau quotient)

Soit I un idéal bilatère d'un anneau A . La relation d'équivalence R définie par :

$$\forall x, y \in A, x \mathcal{R} y \iff x - y \in I$$

est compatible avec la structure d'anneau de A et l'ensemble quotient A/R aussi noté A/I est muni d'une structure d'anneau.

On peut munir l'ensemble quotient A/I (càd l'ensemble des classes d'équivalence sur A) des lois induites par I :

$$\begin{array}{ccc} + : & t & \longrightarrow a \\ & e & \longmapsto f \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} \cdot : & t & \longrightarrow a \\ & e & \longmapsto f \end{array}$$

Exemple 26

- $A/A = \{0\}$ car il n'y a qu'une seule unique classe d'équivalence
- $A/\{0\} = A$ car chaque classe d'équivalence ne possède qu'un seul élément de A

<https://www.bibmath.net/ressources/justeunexo.php?id=1368>

<idéaux d'un anneau quotient>

<image d'un idéal est un idéal par un morphisme?>

<noyau morphisme idéal?>

Lemme 27

Soit A un anneau, A est un corps si et seulement si on a :

- (1) $A \neq \{0\}$
- (2) les seuls idéaux de A sont $\{0\}$ et A

Démonstration. TODO □

Théorème 28 (Krull)

Soit I un idéal de A , $I \neq A$, il existe un idéal maximal de A contenant I .

Démonstration. Se montre à l'aide du théorème de Zorn, à voir. □

4.2 Propriétés remarquables

4.2.1 Théoreme d'isomorphisme

Théorème 29 (théoreme d'isomorphisme)

Soient A et B deux anneaux et $f : A \longrightarrow B$ un morphisme d'anneau. On pose $I = \ker f$. Soit J un idéal de A contenu dans I et $\pi : A \longrightarrow A/J$ la projection canonique. Alors on a :

- (a) il existe une unique morphisme $\bar{f} : A/J \longrightarrow B$ tel que $f = \bar{f} \circ \pi$ (on dit que f se factorise par A/J)
- (b) \bar{f} est injectif si et seulement si $J = I$
- (c) \bar{f} est surjectif si et seulement si f l'est aussi

En particulier on a $\text{Im } f \simeq A/\ker f$.

4.2.2 Opérations sur les idéaux

4.2.3 Algèbres

4.3 Types d'anneaux

4.3.1 Anneaux noethériens

On rappelle qu'un idéal I d'un anneau A est dit de type fini s'il est engendré par un nombre fini d'éléments.

Définition 30 (anneau noethérien)

Un anneau noethérien est un anneau qui vérifie l'une des trois propriétés équivalentes suivantes :

- (1) tout idéal de A est de type fini
- (2) toute suite croissante $(I_n)_n$ d'idéaux de A est stationnaire
- (3) tout ensemble non vide d'idéaux de A a un élément maximal pour l'inclusion

Démonstration.

(1) \Rightarrow (2) : On définit une suite $(I_n)_n$ croissante et on pose $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$. Alors il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $I \subseteq I_N$. On a par définition de I : $I_N \subseteq I$. Donc $I = I_N$

(2) \Rightarrow (3) : TODO

(3) \Rightarrow (1) : Pas compris

□

Théorème 31 (Hilbert)

Si A est noethérien, $A[X]$ est noethérien.

Corollaire 32

Si A est noethérien, $A[X_1, \dots, X_n]$ est noethérien.

4.3.2 Anneaux factoriels

La notion d'anneau factoriel généralise la propriété de décomposition unique en facteurs premiers dans \mathbb{Z} . Il faut noter que toutes les propriétés de \mathbb{Z} ne s'y appliquent pas forcément.

Définition 33

Soit A un anneau. L'anneau A est factoriel s'il vérifie ces trois propriétés :

- (1) A est intègre (il n'a pas de diviseur de zéro)
- (2) tout élément a non nul de A s'écrit $a = up_1 \dots p_r$ avec $u \in A^\times$ et p_1, \dots, p_r irréductible dans A
- (3) cette décomposition est unique, à permutation près et à des inversibles près : si $a = up_1 \dots p_r = vq_1 \dots q_s$, alors $r = s$ et il existe $\sigma \in \mathcal{S}_r$ tel que p_i et $q_{\sigma(i)}$ soient associés

4.3.3 Anneaux intégralement clos**Définition 34 (élément entier)**

Soit B un anneau et A un sous-anneau de B . On dit que $b \in B$ est entier sur A s'il est racine d'un polynôme unitaire à coefficients dans A . C'est à dire :

$$b \text{ entier} \iff \exists P \in A[X] \text{ unitaire, } P(b) = 0$$

Proposition 35 (anneau intégralement clos)

Soit A un anneau intègre. Il est dit intégralement clos si les seuls éléments entier sur A de son corps des fractions $Fr(A)$ sont les éléments de A .

Proposition 36

Tout anneau factoriel est intégralement clos.

Démonstration. Soit A un anneau factoriel, donc A intègre.

Soit $x \in Fr(A)$ entier sur A . Alors il existe $a_0, \dots, a_{n-1} \in A$ tel que :

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

On suppose par l'absurde que $x \notin A$.

On pose donc $x = \frac{y}{z}$ avec $y \in A$, $z \in A \setminus \{0,1\}$ et $y \wedge z = 1$. Donc :

$$z^n P\left(\frac{y}{z}\right) = z^n \frac{y^n}{z^n} + a_{n-1} z^n \frac{y^{n-1}}{z^{n-1}} + \dots + a_0 z^n = 0$$

$$z^n P\left(\frac{y}{z}\right) = y^n + a_{n-1} z y^{n-1} + \dots + a_0 z^n = 0$$

$$y^n = z(-a_{n-1}y^{n-1} - \dots - a_0 z^n)$$

Or $z \nmid y^n$ car ils sont premiers entre eux. Contradiction. Donc $x \in A$. □

Exemple 37

Soit $d \in \mathbb{Z}^*$ un entier sans facteur carré et différent de 1. On a alors :

$$d \equiv 1[4] \implies \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \text{ non intégralement clos}$$

On pensera à la contraposée comme exemple d'anneau intégralement clos.

5 Corps

5.1