

## METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

### Zadanie 1- Metody rozwiązywania równań nieliniowych

#### Opis rozwiązania

Zadanie polegało na zaimplementowaniu i porównaniu ze sobą dwóch metod rozwiązywania (znajdowania miejsca zerowego) równań nieliniowych – metoda bisekcji oraz metoda fałsi.

#### Metoda bisekcji

Dla wybranego przez użytkownika przedziału  $[a, b]$  algorytm metody bisekcji posiada następujące kroki:

1. Sprawdzenie czy  $f(a)f(b) < 0$
2. Określenie warunku zatrzymania
  - a. spełnienie warunku nałożonego na dokładność  $|x_i - x_{i-1}| < \epsilon$
  - b. osiągnięcie zadanej liczby iteracji
3. Znalezienie środka przedziału  $x_0 = \frac{a+b}{2}$
4. Wybranie nowego przedziału spełniającego warunek z kroku 1
5. Powrót do kroku 3 do momentu spełnienia warunku zatrzymania

#### Metoda fałsi

Dla wybranego przez użytkownika przedziału  $[a, b]$  algorytm metody fałsi posiada następujące kroki:


1. Sprawdzenie czy  $f(a)f(b) < 0$
2. Określenie warunku zatrzymania
  - a. spełnienie warunku nałożonego na dokładność  $|x_i - x_{i-1}| < \epsilon$
  - b. osiągnięcie zadanej liczby iteracji
3. Znalezienie punktu przecięcia się cięciwy łączącej punkty  $a$  i  $b$  z osią  $OX$   $x_0 = a - \frac{f(a)}{f(b)-f(a)}(b-a)$
4. Wybranie nowego przedziału spełniającego warunek z kroku 1
5. Powrót do kroku 3 do momentu spełnienia warunku zatrzymania

#### Wyniki


Funkcja	a	b	ε	Zadana liczba iteracji	x <sub>0</sub>				Rzeczywista wartość
					Metoda bisekcji		Metoda fałsi		
					Wynik	Liczba iteracji	Wynik	Liczba iteracji	
x <sup>3</sup> − 2x <sup>2</sup> − 5x + 6	1,5	4,0	0,001		3,000244140625	11	2,9990018144862574	11	3,0
				50	3,00000000000000013	50	3,0	47	
sin(2x − 1/2)	−1,2	1,8	0,0001		0,25001220703125004	14	0,2499856343254204	6	0,25
				50	0,25000000000000002	50	0,25	8	
2 <sup>(x−2)</sup> − 4	0	6,0	0,0001		3,99993896484375	15	3.999819877475282	17	4,0
				100	4,0	52	4,0	61	
sin(2π <sup>x</sup> )	0,75	1,2	0,0001		0,99993896484375	12	0,999999079581477	5	1,0
				50	1,00000000000000002	50	1,0	50	

$$f(x) = \sin\left(2x - \frac{1}{2}\right)$$

*Zadany epsilon*




*Zadana liczba iteracji*




$$f(x) = 2^{(x-2)} - 4$$

*Zadany epsilon*





*Zadana liczba iteracji*



$$f(x) = \sin(2\pi^x)$$

*Zadany epsilon*

*Zadana liczba iteracji*



## Wnioski

- Obie metody wyznaczają miejsca zerowe równe lub bliskie rzeczywistym
- Algorytmy obu metod są łatwe w implementacji
- Porównując wszystkie zbadane przypadki dla różnych funkcji metoda fałsi osiąga założoną dokładność w mniejszej liczbie iteracji a jej wyniki są częściej bliższe rzeczywistym
- Dokładność wyników zależy od odpowiednio dobranych parametrów: przedział początkowy, epsilon, liczba iteracji