

Spis treści

1	Cel	2
2	Zbiór danych	2
2.1	Opis zmiennych	2
3	Dopasowanie modelu	3
3.1	Model uwzględniający umiejętności rzutowe zawodników . . .	3
3.2	Model uwzględniający pozycje zawodników	4
3.3	Model uwzględniający pochodzenie zawodników	4
3.4	Inne testowane modele	4
3.5	Model uwzględniający cechy motoryczne zawodników	4
3.5.1	Model WWW	4
3.5.2	Model WW	4
3.5.3	Model WB	5
3.5.4	Porównanie modeli	5
4	Wybór najlepszego modelu	6
5	Podsumowanie	6

1 Cel

Celem prowadzonych badań jest odszukanie występowania zależności między statystykami, w koszykówce, przy użyciu modeli regresji.

2 Zbiór danych

Przedmiotem badań są statystyki poszczególnych zawodników występujących na parkietach NBA w sezonie 2014/2015. W omawianym okresie, w lidze wystąpiło 490 zawodników, co przekłada się na taką samą długość próbki. Polecenie wymaga próbki o długości co najmniej 500 pomiarów, jednak w związku z atrakcyjnością omawianych danych zdecydowaliśmy się na ich użycie. Dane pochodzą ze strony *kaggle.com*.

2.1 Opis zmiennych

Zmienne kategoryczne wyróżnione są poprzez nawiasy zawierające wartości, które zmienna może przyjąć. W sprawozdaniu zostały użyte następujące zmienne:

- „Name” – imię oraz nazwisko,
- „Age” – wiek,
- „Birth Place” – miejsce urodzenia (US, NONUS),
- „Height” – wzrost,
- „Pos” – pozycja, na której gra dany zawodnik (PG, SG, C, PF, SF),
- „Team” – ostatni zespół, w którym grał zawodnik,
- „Weight” – waga zawodnika,
- „BMI” – wskaźnik Body Mass Index,
- „Games Played” - ilość rozegranych meczy w sezonie,
- „MIN” – ilość minut spędzonych na boisku w sezonie,
- „PTS” – ilość punktów zdobytych w sezonie,
- „FGM” – ilość trafionych rzutów z gry w sezonie,
- „FGA” – ilość rzutów z gry w sezonie,
- „FGp” – procentowa skuteczność rzutów z gry w sezonie,
- „ThreePM” – ilość trafionych rzutów za 3 punkty w sezonie,

- „ThreePA” – ilość rzutów za 3 punkty w sezonie,
- „ThreePp” – procentowa skuteczność rzutów za trzy punkty w sezonie,
- „FTM” – ilość trafionych rzutów osobistych w sezonie,
- „FTA” – ilość rzutów osobistych w sezonie,
- „FTp” – procentowa skuteczność rzutów osobistych w sezonie,
- „OREB” – ilość zbiórek ofensywnych w sezonie,
- „DREB” – ilość zbiórek defensywnych w sezonie,
- „REB” – ilość zbiórek w sezonie,
- „AST” – ilość asyst w sezonie,
- „STL” – ilość przechwytów w sezonie,
- „BLK” – ilość bloków w sezonie,
- „TOV” – ilość strat w sezonie,
- „PF” – ilość fauli osobistych w sezonie,
- „EFF” – wydajność zawodnika,
- „AST/TOV” – stosunek ilości asyst do ilości strat,
- „STL/TOV” – stosunek ilości przechwytów do ilości strat,
- „PPG” – średnia ilość punktów zdobywanych na mecz,
- „MPG” – średnia ilość minut rozegranych na mecz.

3 Dopasowanie modelu

Jako zmienną zależną będziemy rozważać średnią ilość punktów zdobywanych na mecz. Zasugerowane przez nas modele będą się różnić doбором zmiennych niezależnych, jednakże w każdym z nich używać będziemy średniej ilości rozegranych minut na mecz, gdyż jest niezbędna informacja do analizy modelu.

3.1 Model uwzględniający umiejętności rzutowe zawodników

Przy pierwszym ze sprawdzanych przez nas modeli skupimy się na zdolnościach rzutowych, a więc zmiennymi objaśniającymi będą średnia ilość rzutów z pola, skuteczność z pola, średnia ilość rzutów za 3 punkty, skuteczność rzutów za 3 punkty, średnia ilość rzutów osobistych, skuteczność rzutów osobistych oraz średnia ilość minut przegranych w meczu.

3.2 Model uwzględniający pozycje zawodników

Podczas tworzenia tego modelu staraliśmy się określić, czy pozycja zawodnika wpływa na ilość zdobywanych przez niego punktów, dlatego jako zmienne objaśniające przyjęliśmy pozycję danego gracza, średnią ilość czasu spędzanego na boisku oraz jego wiek.

3.3 Model uwzględniający pochodzenie zawodników

Przy ostatnim z badanych modeli chcieliśmy zbadać, czy zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, stanowiący większość ligi, są lepszymi punktującymi niż obcokrajowcy. Jako zmienne objaśniające przyjęliśmy średnią ilość minut na mecz oraz pochodzenie zawodnika.

3.4 Inne testowane modele

3.5 Model uwzględniający cechy motoryczne zawodników

Podjęliśmy trzy próby doboru najlepszego modelu, który uzależniony jest od predyspozycji fizycznych zawodników. Oczywiście, model musi być rozszerzony o ilość rozegranych minut na mecz, gdyż jest niezbędna informacja do analizy modelu.

3.5.1 Model WWW

Pierwszy z dopasowywanych modeli uwzględnia wzrost, wiek oraz wagę zawodników. Zmienne istotne dla dobranego modelu to minuty na mecz (jak zakładaliśmy wyżej, jest to najważniejszy czynnik) oraz waga. W tabeli 1 przedstawione zostały wartości współczynników oraz pozostałe statystyki dla omawianego modelu.

Zmienna	Estymacja	Błąd standardowy	T-wartość	$\Pr(< t)$
Minuty na mecz	0.54219	0.01242	43.638	$<2e-16$
Wzrost	-0.03394	0.02154	-1.576	0.1156
Wiek	-0.01660	0.02667	-0.622	0.5340
Waga	0.02721	0.01462	1.861	0.0634
Stała	1.63120	3.35589	0.486	0.6271

Tabela 1: Model WWW - współczynniki modelu

3.5.2 Model WW

Drugi z dopasowywanych modeli uwzględnia wiek oraz wagę zawodników. Odjęcie wzrostu ma na celu sprawdzenie jak zachowa się model po odjęciu jednej zmiennej nie będącej zmienną istotną. W tabeli 2 przedstawione zostały współczynniki modelu WW. Jak można zauważyć zmienne istotne dla

modelu nie są już takie same, do minut na mecz dołączyła wartość stała. Ponadto waga zawodnika przestała należeć do istotnych zmiennych.

Zmienna	Estymacja	Błąd standardowy	T-wartość	$\Pr(< t)$
Minuty na mecz	0.54356	0.01241	43.78	$<2e-16$
Wiek	-0.01304	0.02661	-0.490	0.62428
Waga	0.00852	0.00857	0.994	0.32059
Stała	-3.35012	1.13018	-2.964	0.00318

Tabela 2: Model WW - współczynniki modelu

3.5.3 Model WB

Trzeci z dopasowywanych modeli uwzględnia wiek oraz wskaźnik BMI. Omawiany wskaźnik jest popularną statystyką mówiącą o stanie zdrowia fizycznego i wyliczana jest na podstawie poniższego wzoru:

$$BMI = \frac{waga}{wzrost^2}.$$

W związku z tym niejawnie do modelu włączamy wagę i wzrost zawodników ligi. Wyniki tego zabiegu przedstawione są w tabeli 3. Podobnie jak w modelu WW istotne zmienne to liczba minut na boisku oraz stała.

Zmienna	Estymacja	Błąd standardowy	T-wartość	$\Pr(< t)$
Minuty na mecz	0.54259	0.01238	43.838	$<2e-16$
Wiek	-0.01608	0.02667	-0.603	0.54676
BMI	0.09639	0.05878	1.640	0.10166
Stała	-4.84181	1.60703	-3.013	0.00272

Tabela 3: Model WB - współczynniki modelu

3.5.4 Porównanie modeli

Znając współczynniki dobranych modeli wyznaczyliśmy:

- skorygowany współczynnik determinacji, oznaczany jako R^2 ,
- kryterium Akaikego, oznaczane jako AIC ,
- logarytm wskaźnika wiarygodności, oznaczany jako $LogLik$,
- wartość w z testu Shapiro-Wilka, oznaczana jako W .

Model	R^2	AIC	LogLik	W
WWW	0.7977	2282.972	-1135.486	0.95495
WW	0.7971	2283.475	-1136.737	0.95403
WB	0.7978	2281.766	-1135.883	0.95493

Tabela 4: Porównanie modeli

Każdy z dopasowanych modeli jest „poprawnym modelem”, gdyż ich residua mają rozkład normalny. Sprawdzenia tej hipotezy dokonaliśmy przy użyciu testu Shapiro-Wilka (długość naszej próbki nie przekracza 5000). Wartość W jest mniejsza od liczby 0.947 (wartość zaczerpnięta z tablic), co oznacza, że nie ma podstaw by odrzucić hipotezę o normalności residuów. W tabeli 4 widać, że model WB cechuje się najlepszym dopasowaniem do danych według współczynnika R^2 . Kryterium informacyjne Akaikego również przemawia za wybraniem trzeciego modelu jako najlepiej opisującego badany zbiór wartości. Jediną statystyką przemawiającą za innym modelem niż WB jest logarytm wskaźnik wiarygodności, który wskazuje, że to pierwszy model jest najlepszy. Na podstawie zaprezentowanych wyników należy wybrać model uwzględniający wiek oraz BMI zawodników.

4 Wybór najlepszego modelu

5 Podsumowanie