
67143472

แบบฝึกที่ 2

1.จากแฟ้มข้อมูล data1.sav ให้สร้างตัวแปรใหม่ ชื่อ level จากตัวแปร gradePrg1 โดยค่าของตัวแปร gradePrg 1 ที่มีค่าเป็น A และ B ให้มีค่าเป็น 1 ในตัวแปร level และค่าของตัวแปร gradePrg1 ที่มีค่าเป็น C, D และ F ให้เป็น 0 ในตัวแปร level



*ข้อมูลเริ่มต้น.sav [] - IBM SPSS Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Extensions Window Help


11 :

	gender	age	status	gradePrg1	gradePrg2	GPA	level	var
1	male	18	Night	C	A	2.00	.00	
2	female	17	Norma	A	F	2.59	1.00	
3	male	16	Norma	B	C	3.45	1.00	
4	male	20	Norma	C	D	1.97	.00	
5	male	22	Norma	B	D	2.00	1.00	
6	male	25	Night	B	B	3.32	1.00	
7	male	19	Night	B	A	3.43	1.00	
8	male	19	Night	A	A	3.78	1.00	
9	male	17	Norma	D	C	2.00	.00	
10	male	17	Norma	C	B	2.67	.00	
11	female	18	Norma	C	B	2.00	.00	
12	female	19	Norma	C	A	2.99	.00	
13	female	21	Night	A	B	2.78	1.00	
14	female	21	Night	A	B	3.25	1.00	
15	male	19	Night	D	F	1.78	.00	
16	female	18	Night	D	C	2.76	.00	
17	male	17	Night	F	B	1.98	.00	
18	female	18	Night	B	A	3.01	1.00	
19	female	19	Night	B	B	3.05	1.00	
20	female	18	Norma	B	C	2.86	1.00	
21	male	18	Norma	D	C	1.89	.00	
22	female	20	Norma	D	B	2.43	.00	
23	male	22	Night	C	C	2.39	.00	
24	male	21	Night	C	B	2.55	.00	
25	female	25	Night	B	A	2.89	1.00	
26	female	24	Night	B	B	3.11	1.00	
27	female	19	Norma	A	A	2.76	1.00	
28	female	20	Norma	D	B	2.04	.00	
29	male	18	Norma	F	C	2.07	.00	
30	male	17	Norma	A	A	3.01	1.00	
31	female	19	Night	D	C	1.81	.00	
32	female	19	Night	A	B	2.67	1.00	
33	female	21	Night	D	C	2.23	.00	
34	male	20	Night	D	C	2.42	.00	
35	male	24	Night	C	B	2.60	.00	
36	male	19	Norma	C	C	2.45	.00	
37	male	19	Norma	C	A	2.32	.00	

Data View Variable View

67143472


2. จากข้อ 1 ให้สร้างตัวแปรใหม่ชื่อ age1 ที่บรรจุค่าลำดับที่ของข้อมูลตัวแปร age โดยเรียงจากอายุมากสุดไปน้อยสุด



67143472

3.จากแฟ้มข้อมูล data 1.sav และสร้างตัวแปรใหม่ ดังนี้

3.1 ตัวแปร up_age เกิดจากการนำตัวแปร age * 10%





	gender	age	status	gradePrg1	gradePrg2	GPA	level	age1	up_age	var
1	male	18	Night	C	A	2.00	.00	18	1.80	
2	female	17	Normal	A	F	2.59	1.00	17	1.70	
3	male	16	Normal	B	C	3.45	1.00	16	1.60	
4	male	20	Normal	C	D	1.97	.00	20	2.00	
5	male	22	Normal	B	D	2.00	1.00	22	2.20	
6	male	25	Night	B	B	3.32	1.00	25	2.50	
7	male	19	Night	B	A	3.43	1.00	19	1.90	
8	male	19	Night	A	A	3.78	1.00	19	1.90	
9	male	17	Normal	D	C	2.00	.00	17	1.70	
10	male	17	Normal	C	B	2.67	.00	17	1.70	
11	female	18	Normal	C	B	2.00	.00	18	1.80	
12	female	19	Normal	C	A	2.99	.00	19	1.90	
13	female	21	Night	A	B	2.78	1.00	21	2.10	
14	female	21	Night	A	B	3.25	1.00	21	2.10	
15	male	19	Night	D	F	1.78	.00	19	1.90	
16	female	18	Night	D	C	2.76	.00	18	1.80	
17	male	17	Night	F	B	1.98	.00	17	1.70	
18	female	18	Night	B	A	3.01	1.00	18	1.80	
19	female	19	Night	B	B	3.05	1.00	19	1.90	
20	female	18	Normal	B	C	2.86	1.00	18	1.80	
21	male	18	Normal	D	C	1.89	.00	18	1.80	
22	female	20	Normal	D	B	2.43	.00	20	2.00	
23	male	22	Night	C	C	2.39	.00	22	2.20	
24	male	21	Night	C	B	2.55	.00	21	2.10	
25	female	25	Night	B	A	2.89	1.00	25	2.50	
26	female	24	Night	B	B	3.11	1.00	24	2.40	
27	female	19	Normal	A	A	2.76	1.00	19	1.90	
28	female	20	Normal	D	B	2.04	.00	20	2.00	
29	male	18	Normal	F	C	2.07	.00	18	1.80	
30	male	17	Normal	A	A	3.01	1.00	17	1.70	
31	female	19	Night	D	C	1.81	.00	19	1.90	
32	female	19	Night	A	B	2.67	1.00	19	1.90	
33	female	21	Night	D	C	2.23	.00	21	2.10	
34	male	20	Night	D	C	2.42	.00	20	2.00	
35	male	24	Night	C	B	2.60	.00	24	2.40	
36	male	19	Normal	C	C	2.45	.00	19	1.90	
37	male	19	Normal	C	A	2.32	.00	19	1.90	

67143472

3.จากแฟ้มข้อมูล data 1.sav และสร้างตัวแปรใหม่ ดังนี้

3.2 ตัวแปร RGPA บรรจุค่าลำดับที่ของตัวแปร GPA จำแนกตามเพศ โดยให้หมายเลข 1 แทนค่ามากที่สุด





	gender	age	status	gradePrg1	gradePrg2	GPA	level	age1	up_age	RGPA	var	var
1	male	18	Night	C	A	2.00	.00	18	1.80	16.000		
2	female	17	Normal	A	F	2.59	1.00	17	1.70	13.000		
3	male	16	Normal	B	C	3.45	1.00	16	1.60	2.000		
4	male	20	Normal	C	D	1.97	.00	20	2.00	19.000		
5	male	22	Normal	B	D	2.00	1.00	22	2.20	16.000		
6	male	25	Night	B	B	3.32	1.00	25	2.50	4.000		
7	male	19	Night	B	A	3.43	1.00	19	1.90	3.000		
8	male	19	Night	A	A	3.78	1.00	19	1.90	1.000		
9	male	17	Normal	D	C	2.00	.00	17	1.70	16.000		
10	male	17	Normal	C	B	2.67	.00	17	1.70	7.000		
11	female	18	Normal	C	B	2.00	.00	18	1.80	18.000		
12	female	19	Normal	C	A	2.99	.00	19	1.90	6.000		
13	female	21	Night	A	B	2.78	1.00	21	2.10	9.000		
14	female	21	Night	A	B	3.25	1.00	21	2.10	1.000		
15	male	19	Night	D	F	1.78	.00	19	1.90	21.000		
16	female	18	Night	D	C	2.76	.00	18	1.80	10.500		
17	male	17	Night	F	B	1.98	.00	17	1.70	18.000		
18	female	18	Night	B	A	3.01	1.00	18	1.80	5.000		
19	female	19	Night	B	B	3.05	1.00	19	1.90	3.500		
20	female	18	Normal	B	C	2.86	1.00	18	1.80	8.000		
21	male	18	Normal	D	C	1.89	.00	18	1.80	20.000		
22	female	20	Normal	D	B	2.43	.00	20	2.00	14.000		
23	male	22	Night	C	C	2.39	.00	22	2.20	12.000		
24	male	21	Night	C	B	2.55	.00	21	2.10	9.000		
25	female	25	Night	B	A	2.89	1.00	25	2.50	7.000		
26	female	24	Night	B	B	3.11	1.00	24	2.40	2.000		
27	female	19	Normal	A	A	2.76	1.00	19	1.90	10.500		
28	female	20	Normal	D	B	2.04	.00	20	2.00	17.000		
29	male	18	Normal	F	C	2.07	.00	18	1.80	14.000		
30	male	17	Normal	A	A	3.01	1.00	17	1.70	6.000		
31	female	19	Night	D	C	1.81	.00	19	1.90	19.000		
32	female	19	Night	A	B	2.67	1.00	19	1.90	12.000		
33	female	21	Night	D	C	2.23	.00	21	2.10	16.000		
34	male	20	Night	D	C	2.42	.00	20	2.00	11.000		
35	male	24	Night	C	B	2.60	.00	24	2.40	8.000		
36	male	19	Normal	C	C	2.45	.00	19	1.90	10.000		
37	male	19	Normal	C	A	2.32	.00	19	1.90	13.000		