

**Автор** emazhnik

**Решение** В первую очередь докажем, что данный ряд сходится. Нетрудно понять, что  $f(n) \leq \log_2(n+1)$ . Теперь докажем, что начиная с некоторого  $n$  выполняется  $\log_2(n+1) < \sqrt{n}$ . Действительно, по правилу Лопиталя получим:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2(n+1)}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\ln 2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.$$

Отсюда получаем, что сходимость ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n(n+1)}$  эквивалентна сходимости ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n(n+1)}$ . Этот ряд нетрудно ограничить:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\sqrt{n}}{n} - \frac{\sqrt{n}}{n+1} \right) = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}}{n} < 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 2$$

(или воспользоваться фактом, что  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\varepsilon}}$  сходится при  $\varepsilon > 0$ ).

Для нахождения суммы ряда заметим, что  $f(2n) = f(n)$  и  $f(2n+1) = f(n) + 1$ . Тогда:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n(n+1)} &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(2n)}{2n(2n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(2n+1)}{(2n+1)(2n+2)} \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{2n(2n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)+1}{(2n+1)(2n+2)} \\ &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \left[ \frac{1}{2n(2n+1)} + \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} \right] + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+2)}. \end{aligned}$$

Поскольку ряд сходится, мы можем переписать:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n(n+1)} &= 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} = 1 + 2 \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \Big|_{x=1} = 2 \ln(1+x)|_{x=1} = 2 \ln 2. \end{aligned}$$