

(а) Исследуем на абсолютную сходимость.

Разберем сначала вспомогательное утверждение:

$$\left| \frac{\sin k}{k} \right| + \left| \frac{\sin(k+1)}{k+1} \right| \geq \frac{1}{6k}, \quad \forall k \geq 1.$$

Рассмотрим два случая:

(i) $|\sin k| \geq \frac{1}{3} \Rightarrow$ утверждение очевидно

(ii) $|\sin k| \leq \frac{1}{3}$

Рассмотрим единичную окружность и проведем две прямые: $y = \frac{1}{3}$ и $y = -\frac{1}{3}$. Тогда множество $|\sin k| \leq \frac{1}{3}$ расположено на окружности между двумя этими прямыми. Из геометрических соображений можно увидеть, что при повороте этого множества на 1 радиан, оно выйдет за пространство между прямыми. Это означает, что $|\sin(k+1)| \geq \frac{1}{3}$ и $\left| \frac{\sin(k+1)}{k+1} \right| \geq \frac{1}{3(k+1)} \geq \frac{1}{6k}$, откуда следует исходное утверждение. В частности, из этого утверждения следует расходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{\sin k}{k} \right|$.

Попробуем теперь на основе этой идеи получить оценку на сумму абсолютных значений соседних членов исходного ряда:

$$|a_k| + |a_{k+1}| = \left| \int_0^{\frac{\sin k}{k}} \frac{\sin t}{t} dt \right| + \left| \int_0^{\frac{\sin(k+1)}{k+1}} \frac{\sin t}{t} dt \right| = \int_0^{\left| \frac{\sin k}{k} \right|} \frac{\sin t}{t} dt + \int_0^{\left| \frac{\sin(k+1)}{k+1} \right|} \frac{\sin t}{t} dt.$$

(здесь мы воспользовались тем, что $\frac{\sin x}{x}$ — четная функция, первый нуль которой расположен в точках $\pm\pi$ и при интегрировании не достигается). Используя аналогичные рассуждения, получим:

$$|a_k| + |a_{k+1}| \geq \int_0^{\frac{1}{6k}} \frac{\sin t}{t} dt \geq \sin \frac{1}{6k}.$$

Воспользуемся неравенством $\sin x \geq \frac{2x}{\pi}$ при $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$. Тогда получим

$$|a_k| + |a_{k+1}| \geq \frac{1}{3\pi k},$$

и по признаку сравнения заключаем, что ряд не сходится абсолютно.

(б) Исследуем интеграл на условную сходимость.

Представим члены ряда в следующем виде:

$$a_k = \int_0^{\frac{\sin k}{k}} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{\frac{\sin k}{k}} 1 + O(t^2) dt = \frac{\sin k}{k} + O\left(\left(\frac{\sin k}{k}\right)^3\right).$$

Также заметим, что $O\left(\left(\frac{\sin k}{k}\right)^3\right)$ сходится, поскольку ряд $\left(\frac{\sin k}{k}\right)^3$ сходится абсолютно. Тогда по признаку сравнения, если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k}$ сходится, то

сходится и исходный ряд.

Воспользуемся признаком Дирихле для сходимости рядов Абелева типа.

Последовательность $\{\frac{1}{n}\}$ монотонна и стремится к нулю, осталось доказать

ограниченность последовательности частичных сумм $\sum_{k=1}^n \sin k$.

Поскольку

$$\sum_{k=1}^n \sin k = \frac{\sin(\frac{n}{2}) \sin(\frac{n+1}{2})}{\sin(\frac{1}{2})} \leq \frac{1}{\sin(\frac{1}{2})},$$

получаем, что ряд сходится условно (чтобы посчитать последнюю сумму, можно домножить ее на $2 \sin(\frac{1}{2})$ и расписать произведения синусов через разности косинусов).