

Статистика

Конспект практических занятий

Мат-Мех, ПМИ, СМ–СМ

\$Revision: ... (NEG: UNDER RECONSTRUCTION) \$



Оглавление

I. Оценки характеристик и параметров распределения	4
1. Выборка и эмпирическая случайная величина	5
2. Виды признаков	6
3. Характеристики распределений и метод подстановки	7
4. Характеристики распределений и их оценки	8
4.1. Характеристики положения	8
4.2. Характеристики разброса	9
4.3. Анализ характера разброса	10
4.4. Характеристики зависимости	11
5. Точечная оценка параметров распределения	12
5.1. Метод подстановки	12
5.2. Метод моментов	12
5.3. Метод оценки максимального правдоподобия	13
6. Свойства оценок	14
6.1. Несмещенность	14
6.2. Состоятельность	15
6.3. Асимптотическая нормальность	16
6.4. Эффективность	16
6.4.1. Эффективность и неравенство Рао-Крамера	16
6.5. Устойчивость оценок	18
II. Некоторые распределения, связанные с нормальным	19
1. Распределение $N(a, \sigma^2)$	20
2. Распределение $\chi^2(m)$	21
3. Распределение Стьюдента $t(m)$	22
4. Распределение Фишера	23
5. Квадратичные формы от нормально распределенных случайных величин	24
6. Распределение важных статистик	25
III. Проверка гипотез и доверительные интервалы	27
1. Построение критерия	29

2. Проверка гипотезы о значении параметра (характеристики)	30
2.1. Проверка гипотезы о значении мат. ожидания (t -критерий)	30
2.1.1. $D\xi = \sigma^2 < \infty$	30
2.1.2. $D\xi$ неизвестна	30
2.1.3. z -критерий для пропорции в модели Бернулли	30
2.2. Проверка гипотезы о значении дисперсии в нормальной модели (критерий χ^2)	30
2.2.1. $E\xi = a < \infty$	31
2.2.2. $E\xi$ неизвестно	31
3. Доверительные интервалы	32
3.1. Мотивация и определение	32
3.2. Доверительный интервал для проверки гипотезы о значении параметра	32
3.3. Доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии в нормальной модели	32
3.3.1. Доверительный интервал для a	32
3.3.2. Доверительный интервал для σ^2	33

Часть I.

Оценки характеристик и параметров распределения

1. Выборка и эмпирическая случайная величина

Пусть $\xi \sim \mathcal{P}$ — случайная величина с распределением \mathcal{P} .

Определение. Повторной независимой выборкой объема n (до эксперимента) называется набор

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n), \quad x_i \sim \mathcal{P} \quad \forall i \in 1:n, \quad x_1 \perp \dots \perp x_n$$

независимых в совокупности одинаково распределенных случайных величин с распределением \mathcal{P} .

Определение. Повторной независимой выборкой объема n (после эксперимента) называется набор реализаций, т.е. конкретных значений ξ , случайных величин x_i :

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n), \quad x_i \in \text{supp } \xi \quad \forall i \in 1:n.$$

Определение. Эмпирической случайной величиной $\hat{\xi}_n$ называется случайная величина с дискретным распределением

$$\hat{\xi}_n \sim \hat{\mathcal{P}}_n : \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ 1/n & \dots & 1/n \end{pmatrix}.$$

Замечание. Подходящее определение выбирается по контексту.

Если ξ имеет дискретное распределение, то выборку можно *сгруппировать*; тогда получим случайную величину $\hat{\xi}_m$ с распределением

$$\hat{\mathcal{P}}_m : \begin{pmatrix} x_1^* & \dots & x_m^* \\ \omega_1 & \dots & \omega_m \end{pmatrix} \quad \omega_i = \frac{\nu_i}{n},$$

где x_i^* — уникальные значения из выборки \mathbf{x} , а ν_i — число x_i^* в \mathbf{x} (т.н. «абсолютная частота»; тогда ω_i — «относительная частота»). В противном случае, можно разбить интервал всевозможных значений выборки на m подынтервалов: $\{[e_0, e_1), \dots, [e_{m-1}, e_m)\}$ и считать число наблюдений $\nu_i = \nu_i[e_{i-1}, e_i)$, попавших в интервал.

Следствие. По ЗБЧ (теореме Бернулли),

$$\omega_i \xrightarrow{P} p_i = P(e_{i-1} \leq \xi < e_i),$$

т.е. относительная частота является хорошей оценкой вероятности на больших объемах выборки.

2. Виды признаков

Виды признаков случайной величины $\xi : (\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow (V, \mathfrak{A})$ характеризуются тем, что из себя представляет множество V и что можно делать с его элементами.

Количественные признаки: $V \subset \mathbb{R}$

По типу операций:

- Аддитивные: заданы, т.е. имеют смысл в контексте данного признака, операции $+$, $-$
- Мультипликативные: заданы операции \cdot , $/$; признак принимает не отрицательные значения.

По типу данных:

- Непрерывные
- Дискретные

Порядковые признаки V — упорядоченное множество, определены отношения $>$, $=$.

Качественные признаки на V заданы отношения $=$, \neq

Пример. Цвет глаз, имена, пол.

3. Характеристики распределений и метод подстановки

Определение. *Статистика* — измеримая функция от выборки.

Обобщением статистики является понятие характеристики.

Определение. *Характеристика* — функционал от распределения:

$$T : \{\mathcal{P}\} \rightarrow V.$$

Где V — измеримое пространство, чтобы на нём можно было завести σ -алгебру.

Замечание. Чаще всего, $V = \mathbb{R}$.

Определение. Выделяют *генеральные* характеристики $T(\mathcal{P}) =: \theta$ и *выборочные* характеристики $T(\hat{\mathcal{P}}_n)$.

Определение. *Оценка* — выборочная характеристика $T(\hat{\mathcal{P}}_n) =: \hat{\theta}_n$, не зависящая от генеральной характеристики θ .

Следствие. *Выражения для вычисления генеральных и выборочных характеристик отличаются только используемыми мерами (\mathcal{P} и $\hat{\mathcal{P}}_n$ соответственно).*

Определение. Пусть $\hat{\mathcal{P}}_n$ — распределение эмпирической случайной величины. Тогда *эмпирическая функция распределения* есть

$$\widehat{\text{cdf}}_{\xi}(x) = \text{cdf}_{\hat{\mathcal{P}}_n}(x) = \hat{\mathcal{P}}_n((-\infty, x)) = \int_{-\infty}^x d\hat{\mathcal{P}}_n = \sum_{x_i: x_i \leq x} \frac{1}{n} = \frac{|\{x_i \in \mathbf{x} : x_i \leq x\}|}{n}.$$

Утверждение. Пусть $\widehat{\text{cdf}}_{\xi}$ — эмпирическая функция распределения, cdf_{ξ} — функция распределения ξ . Тогда, по теореме Гливенко-Кантелли,

$$\sup_x \left| \widehat{\text{cdf}}_{\xi}(x) - \text{cdf}_{\xi}(x) \right| \xrightarrow{\text{a.s.}} 0.$$

Более того, если cdf_{ξ} непрерывна, эта сходимость имеет порядок $1/\sqrt{n}$ по теореме Колмогорова:

$$\sqrt{n} \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \widehat{\text{cdf}}_{\xi}(x) - \text{cdf}_{\xi}(x) \right| \xrightarrow{d} \mathcal{P}_{\text{K.S.}},$$

где $\mathcal{P}_{\text{K.S.}}$ — распределение Колмогорова-Смирнова.

Замечание. Поскольку $\widehat{\text{cdf}}_{\xi}(x) = \omega_x$, где ω_x — частота попадания наблюдений в интервал в $(-\infty, x)$, а $\text{cdf}_{\xi}(x) = \mathbf{P}(\xi \in (-\infty, x))$ — вероятность того же события, то можно применить теорему Бернулли (ЗБЧ):

$$\widehat{\text{cdf}}_{\xi}(x) \xrightarrow{\mathbf{P}} \text{cdf}_{\xi}(x).$$

Следствие. *Значит, при достаточно больших n , в качестве интересующей характеристики θ распределения \mathcal{P} можем брать ее оценку $\hat{\theta}_n$ — аналогичную характеристику $\hat{\mathcal{P}}_n$.*

4. Характеристики распределений и их оценки

Определение. Генеральные и соответствующие им выборочные характеристики k -го момента и k -го центрального момента:

$$\begin{aligned} m_k &= \int_{\mathbb{R}} x^k d\mathcal{P} & \hat{m}_k &= \int_{\mathbb{R}} x^k d\hat{\mathcal{P}}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k \\ m_k^{(0)} &= \int_{\mathbb{R}} (x - m_1)^k d\mathcal{P} & \hat{m}_k^{(0)} &= \int_{\mathbb{R}} (x - \hat{m}_1)^k d\hat{\mathcal{P}}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{m}_1)^k. \end{aligned}$$

4.1. Характеристики положения

В качестве характеристики положения выделяется 1-й момент — математическое ожидание и выборочное среднее:

$$m_1 = E\xi, \quad \hat{m}_1 =: \bar{x} = \widehat{E\xi} = E\xi_n.$$

Замечание. В случае мультипликативных признаков можно посчитать среднее геометрическое; часто логарифмируют и считают среднее арифметическое.

Определение. Пусть $p \in [0, 1]$ и $\text{cdf} = \text{cdf}_P$. p -квантилью (квантилью уровня p) называется

$$\text{qnt}_P(p) =: z_p = \sup \{z : \text{cdf}(z) \leq p\}.$$

Квартиль есть квантиль уровня, кратного $1/4$; *дециль* — $1/10$; *перцентиль* — $1/100$.

Замечание. \sup берется для учета случая не непрерывных функций распределения.

Определение. Медиана есть $1/2$ -квантиль:

$$\text{med } \xi = z_{1/2}.$$

Определение. Мода ($\text{mode } \xi$) есть точка локального максимума плотности.

По методу подстановки можем получить аналогичные выборочные характеристики.

Определение. Выборочная p -квантиль есть такая точка \hat{z}_p , что она больше по значению $|\mathbf{x}| \cdot p = np$ точек из выборки:

$$\hat{z}_p = \sup \left\{ z : \widehat{\text{cdf}}_{\xi}(z) \leq p \right\} = x_{(\lfloor np \rfloor + 1)}.$$

Определение. Выборочная медиана упорядоченной выборки $\mathbf{x} = (x_{(1)}, \dots, x_{(n)})$ есть

$$\hat{z}_{1/2} = \widehat{\text{med}} = \begin{cases} x_{(k+1)} & n = 2k + 1 \\ \frac{x_{(k)} + x_{(k+1)}}{2} & n = 2k \end{cases}$$

Определение. Выборочная мода ($\widehat{\text{mode}}$) есть значение из выборки, которое чаще всего встречается.

4.2. Характеристики разброса

В качестве характеристики разброса выделяется 2-й центральный момент — дисперсия и выборочная дисперсия:

$$m_2^{(0)} = D\xi \quad \hat{m}_2^{(0)} =: s^2 = \widehat{D\xi} = D\hat{\xi}_n = \begin{cases} E\left(\hat{\xi}_n - E\hat{\xi}_n\right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ E\hat{\xi}_n^2 - \left(E\hat{\xi}_n\right)^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2\right) - \bar{x}^2. \end{cases}$$

Замечание. Если среднее $E\xi = \mu$ известно, то дополнительно вводится

$$s_\mu^2 := \begin{cases} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \\ \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2\right) - \mu^2. \end{cases}$$

Пример (Оценка дисперсии оценки мат. ожидания). Пусть строится оценка мат. ожидания \bar{x} . Может интересовать точность построенной оценки. Вычислим дисперсию теоретически, после чего оценим точность по выборке:

$$D\bar{x} = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n Dx_i = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D\xi = \frac{D\xi}{n},$$

откуда

$$\widehat{D\bar{x}} = \frac{s^2}{n}.$$

Пример (Дисперсия оценки дисперсии). См. по ссылке¹.

Определение (Энтропия). Количество информации, необходимое для выявления объекта из n -элементного множества вычисляется по *формуле Хартли*:

$$H = \log_2 n$$

(множество это следует итеративно разбивать пополам, откуда и оценка). Пусть теперь множество не равновероятно, т.е. задано дискретное распределение

$$\mathcal{P}_\xi : \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ p_1 & \dots & p_n \end{pmatrix}.$$

Тогда количество информации $H(\xi)$, которую нужно получить, чтобы узнать, какой исход эксперимента осуществлен, вычисляется по формуле Шеннона и называется *энтропией*:

$$H(\xi) = \sum_{i=1}^n p_i \log_2 \frac{1}{p_i}.$$

Замечание. В случае равномерного дискретного распределения, конечно, $H = H(\xi)$.

Определение. Выборочное стандартное отклонение есть

$$SD := \sqrt{\widehat{D\xi}} = s.$$

Это показатель разброса случайной величины; показатель того, насколько элементы выборки отличаются от выборочного среднего по значению.

¹<http://mathworld.wolfram.com/SampleVarianceDistribution.html>

SD позволяет оценивать стандартное отклонение распределения ξ .

Пусть $\hat{\theta}_n$ — статистика. Она имеет какое-то своё распределение, стандартное отклонение которого можно также оценить.

Определение. *Стандартная ошибка* оценки есть

$$SE(\hat{\theta}) := \sqrt{\widehat{D\hat{\theta}}}.$$

Это показатель разброса оценки случайной величины.

Замечание. В частном случае $\theta = E\xi$, $\hat{\theta} = \bar{x}$ получаем *выборочную стандартную ошибку среднего*

$$SE := SE(\bar{x}) = \sqrt{\widehat{D\bar{x}}} = \sqrt{\frac{\widehat{D\xi}}{n}} = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Это, в свою очередь, показатель того, насколько выборочное среднее отличается от истинного.

Пусть $c_\gamma = \text{qnt}_{N(0,1)} \gamma$.

Пример (С мостом и машинами). При возведении моста требуется, чтобы под ним могли проехать, условно, 95% машин. Чтобы эту высоту вычислить, достаточно собрать выборку высоты кузова проезжающих машин. Тогда нахождение искомой величины можно наглядно представить как выбор такой квантили гистограммы выборки, что суммирование соответствующих вероятностей даст 0.95. В предположении, что выборка из нормального распределения, с более устойчивой оценкой квантили, интервал будет иметь вид

$$(\bar{x} \pm SD \cdot c_\gamma).$$

SE как показатель разброса среднего использовать по смыслу нельзя.

Пример (С паромом). Число машин, которое способен перевезти паром, есть Грузоподъемность/ $E\xi$, где ξ — вес машины. Поскольку оценка \bar{x} всегда считается с погрешностью относительно истинного значения, интервал допустимого числа машин будет иметь вид

$$\frac{\text{Грузоподъемность}}{\bar{x} \pm SE \cdot c_\gamma}.$$

4.3. Анализ характера разброса

Определение. *Коэффициент асимметрии Пирсона* («скошенности»²)

$$\gamma_3 = A\xi = \frac{m_3^{(0)}}{\sigma^3}.$$

Замечание. Не зависит от линейных преобразований.

Замечание. Старое определение скошенности было $\frac{E\xi - \text{med}\xi}{\sigma}$.

Замечание. Типичный случай соответствует тому, что при положительном коэффициенте асимметрии ‘хвост вправо’.

Определение. *Коэффициент эксцесса* («крутизны», «kurtosis»):

$$\gamma_4 = K\xi = \frac{m_4^{(0)}}{\sigma^4} - 3.$$

Замечание. Величина $m_4^{(0)}/\sigma^4 = 3$ соответствует стандартному нормальному распределению. Так что можно сравнивать выборку и $\gamma_4 N(0, 1)$.

Замечание. Положительный коэффициент эксцесса соответствует медленному убыванию на концах отрезка. Причём, так как распределение стандартизуется, имеется в виду убывание на хвостах, которое медленнее по порядку (!), чем убывание на хвостах у нормального распределения. Например, сравните e^{-x^2} , $e^{-x^2/10}$ и e^{-10x} . Часто говорят об островершинности при положительном эксцессе, но это просто вторая сторона скорости убывания на хвостах.

²«Skewness».

4.4. Характеристики зависимости

Определение. Пусть $(\xi_1, \xi_2) \sim \mathcal{P}$ и $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) \sim \mathcal{P}(du \times dv)$. Тогда можно записать две другие важные характеристики: *ковариацию* и *коэффициент корреляции*:

$$\begin{aligned} \text{cov}(\xi_1, \xi_2) &= \iint_{\mathbb{R}^2} (u - \mathbf{m}_1(\xi_1))(v - \mathbf{m}_1(\xi_2)) \mathcal{P}(du \times dv) & \widehat{\text{cov}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \\ \text{cor}(\xi_1, \xi_2) &= \frac{\text{cov}(\xi_1, \xi_2)}{\sigma_{\xi_1} \sigma_{\xi_2}} & \widehat{\text{cor}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \frac{\widehat{\text{cov}}(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{s(\mathbf{x})s(\mathbf{y})}. \end{aligned}$$

5. Точечная оценка параметров распределения

5.1. Метод подстановки

Метод подстановки заключается в подстановке вместо неизвестного теоретического распределения известного эмпирического распределения. Например, вас интересует некоторая характеристика $f(\xi)$, а вы в качестве оценки предлагаете $\widehat{f(\xi)} = f(\xi_n)$, где ξ_n — эмпирическая случайная величина.

5.2. Метод моментов

Пусть $\mathcal{P}(\theta)$, $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_r)^\top$ — параметрическая модель. Найдем оценки для параметров $\hat{\theta}_i$, $i \in \overline{1:r}$, для чего составим и решим систему уравнений:

$$\begin{cases} \mathbb{E}g_1(\xi) = \phi_1(\theta_1, \dots, \theta_r) \\ \vdots \\ \mathbb{E}g_r(\xi) = \phi_r(\theta_1, \dots, \theta_r) \end{cases} \implies \begin{cases} \theta_1 = f_1(\mathbb{E}g_1(\xi), \dots, \mathbb{E}g_r(\xi)) \\ \vdots \\ \theta_r = f_r(\mathbb{E}g_1(\xi), \dots, \mathbb{E}g_r(\xi)). \end{cases}$$

Примем

$$\theta_i^* = f_i(\hat{\mathbb{E}}g_1(\xi), \dots, \hat{\mathbb{E}}g_r(\xi)).$$

Часто, $g_i(\xi) = \xi^i$. Или, еще чаще, $g_1(\xi) = \xi$ и $g_i(\xi) = (\xi - \mathbb{E}\xi)^i$, $i > 1$, так как для таких моментов обычно известны формулы.

Замечание. Случается, что решение находится вне пространства параметров. На практике, если пространство параметров компактное, можно взять точку, ближайшую к полученной оценке. Однако это свидетельствует о том, что модель плохо соответствует данным.

Пример 5.1 ($r = 1$). $\xi \sim U(0, \theta)$.

- Оценка по 1-му моменту: $g(\xi) = \xi$ и

$$\mathbb{E}\xi = \int_0^\theta \frac{1}{\theta} x \, dx = \frac{1}{\theta} \frac{x^2}{2} \Big|_0^\theta = \frac{\theta}{2} \implies \theta = 2\mathbb{E}\xi, \quad \theta^* = 2\bar{x}.$$

- Оценка по k -му моменту: $g(\xi) = \xi^k$ и

$$\mathbb{E}\xi^k = \frac{1}{\theta} \int_0^\theta x^k \, dx = \frac{1}{\theta} \frac{x^{k+1}}{k+1} \Big|_0^\theta = \frac{\theta^k}{k+1} \implies \theta^* = \sqrt[k]{(k+1) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k}.$$

Пример 5.2 ($r = 1$). Пусть $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$. Тогда $\mathbb{E}\xi = \lambda$ и $\bar{x} = \lambda$.

5.3. Метод оценки максимального правдоподобия

Пусть $\mathcal{P}_\xi(\boldsymbol{\theta})$, $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_r)^\top$ — параметрическая модель.

Определение. Пусть

$$P(\mathbf{y} \mid \boldsymbol{\theta}) = \begin{cases} P_{\boldsymbol{\theta}}(x_1 = y_1, \dots, x_n = y_n) & \mathcal{P}_\xi(\boldsymbol{\theta}) \text{ дискретно;} \\ p_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{y}) & \mathcal{P}_\xi(\boldsymbol{\theta}) \text{ абсолютно непрерывно.} \end{cases}$$

Тогда *функция правдоподобия* определяется как значение распределения выборки (плотности в непрерывном случае и вероятности значений в дискретном) с подстановкой выборки вместо аргумента:

$$L(\boldsymbol{\theta} \mid \mathbf{x}) = P(\mathbf{x} \mid \boldsymbol{\theta}).$$

Пример 5.3. Пусть $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$. По независимости x_i , $p_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x})$ распадается в произведение:

$$L(\boldsymbol{\theta} \mid \mathbf{x}) = p_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n p_{\boldsymbol{\theta}}(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\} = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sigma^n} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right\}.$$

Пример 5.4. $\xi \sim \text{Pois}(\lambda)$,

$$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \implies L(\boldsymbol{\theta} \mid \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i!} \lambda^{x_i} e^{-\lambda} = \frac{1}{\prod_{i=1}^n x_i!} \lambda^{n\bar{x}} e^{-n\lambda}.$$

Утверждение. Пусть \mathbf{x} — выборка. В качестве оценки максимального правдоподобия¹ $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{MLE}}$ следует взять

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{MLE}} = \underset{\boldsymbol{\theta}}{\operatorname{argmax}} \log L(\boldsymbol{\theta} \mid \mathbf{x}).$$

Пример. $\xi \sim \text{Pois}(\lambda)$.

$$\ln L(\lambda \mid \mathbf{x}) = -\sum_{i=1}^n \ln(x_i!) - n\lambda + n\bar{x} \ln \lambda \implies \frac{\partial \log L(\lambda \mid \mathbf{x})}{\partial \lambda} = -n + \frac{n\bar{x}}{\lambda}$$

откуда

$$\frac{\partial \log L(\lambda \mid \mathbf{x})}{\partial \lambda} = 0 \iff -n + \frac{n\bar{x}}{\lambda} = 0, \quad n\bar{x} - n\lambda = 0, \quad \lambda = \bar{x}.$$

Утверждение. В условиях регулярности:

1. Существует один глобальный максимум, так что

$$\left. \frac{\partial \log L(\lambda \mid \mathbf{x})}{\partial \lambda} \right|_{\boldsymbol{\theta}=\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{MLE}}} = 0.$$

2. $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{MLE}}$ обладает всеми свойствами (про определение этих свойств написано в следующих разделах):

- а) Состоятельность;
- б) Асимптотическая несмещенность;
- в) Асимптотическая нормальность;
- г) Асимптотическая эффективность.

¹Maximum likelihood estimate (MLE).

6. Свойства оценок

6.1. Несмещенность

Определение. Смещение¹ есть

$$\text{bias } \hat{\theta}_n := E\hat{\theta}_n - \theta \quad \forall \theta \in \Theta.$$

Определение. Среднеквадратичная ошибка² есть

$$\text{MSE } \hat{\theta}_n := E(\hat{\theta}_n - \theta)^2.$$

Замечание. Поскольку

$$D\hat{\theta}_n = D(\hat{\theta}_n - \theta) = E(\hat{\theta}_n - \theta)^2 - (E(\hat{\theta}_n - \theta))^2,$$

то

$$\underbrace{E(\hat{\theta}_n - \theta)^2}_{\text{MSE}} = D\hat{\theta}_n + \underbrace{(E(\hat{\theta}_n - \theta))^2}_{\text{bias}^2}.$$

Определение. Оценка называется *несмещенной*, если $\text{bias } \hat{\theta}_n = 0$, т.е.

$$E\hat{\theta}_n = \theta.$$

Предложение. \bar{x} — несмещенная оценка $E\xi$.

Доказательство. Пусть $\theta = E\xi$, $\hat{\theta}_n = E\hat{\xi}_n = \bar{x}$. Тогда

$$E\bar{x} = E\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E x_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\xi = E\xi \implies E\hat{\theta}_n = E\theta, \text{ bias } \hat{\theta}_n = 0.$$

□

Предложение. s^2 является только асимптотически несмещенной оценкой $D\xi$.

Доказательство. Это доказательство ‘в лоб’. Хорошее доказательство на основе разложения $E(\zeta - a)^2$ смотрите в конспекте.

Поскольку дисперсия не зависит от сдвига, обозначим $\eta = \xi - E\xi$ и $y_i = x_i - E\xi$; тогда

$$\begin{aligned} Es^2 &= E\widehat{D\xi} = E\widehat{D\eta} = E\left(\widehat{E\eta^2} - (\widehat{E\eta})^2\right) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i\right)^2\right) \\ &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{1}{n^2} \sum_{i,j=1}^n y_i y_j\right) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{1}{n^2} \sum_{i,j=1}^n y_i^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E y_i^2 - \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n E y_i^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E (x_i - E\xi)^2 - \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n E (x_i - E\xi)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D x_i - \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D x_i = D\xi - \frac{1}{n} D\xi \\ &= \frac{n-1}{n} D\xi \xrightarrow{n \rightarrow \infty} D\xi. \end{aligned}$$

□

¹Bias.

²Mean squared error (MSE).

Определение. Исправленная дисперсия:

$$\tilde{s}^2 := \frac{n}{n-1} s^2.$$

Очевидно, исправленная дисперсия — несмещенная оценка дисперсии.

6.2. Состоятельность

Определение. Оценка называется *состоятельной* в среднеквадратичном смысле, если

$$\text{MSE } \hat{\theta}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Определение. Оценка называется *состоятельной*, если

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{\text{P}} \theta.$$

Предложение. Если оценка несмещенная и состоятельная в среднеквадратичном смысле, то она состоятельная.

Доказательство. В самом деле, по неравенству Чебышева,

$$\text{P}(|\hat{\theta}_n - \theta| > \epsilon) = \text{P}(|\hat{\theta}_n - \text{E}\hat{\theta}_n| > \epsilon) \leq \frac{\text{D}\hat{\theta}_n}{\epsilon^2} = \frac{\text{MSE } \hat{\theta}_n}{\epsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

Предложение. $\hat{\mathbf{m}}_k$ является состоятельной оценкой \mathbf{m}_k .

Доказательство. Докажем для $\hat{\mathbf{m}}_1$. По определению выборки до эксперимента, $x_i \sim \mathcal{P}$. Тогда, по теореме Хинчина о ЗБЧ,

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \xrightarrow{\text{P}} \mathbf{m}_1(\mathcal{P}).$$

Для k -го момента доказывается аналогично заменой $y_i := x_i^k$.

□

Замечание. Для $\mathbf{m}_k^{(0)}$ доказательство не пройдет, потому что x_i и \bar{x} не будут независимыми.

Предложение. $\hat{\mathbf{m}}_k^{(0)}$ является состоятельной оценкой $\mathbf{m}_k^{(0)}$.

Утверждение. Пусть $\xi_n \xrightarrow{\text{P}} c$ и $f \in C(U_\epsilon(c))$. Тогда $f(\xi_n) \xrightarrow{\text{P}} f(c)$.

Доказательство предложения. Докажем для s^2 . Пусть $f : (x, y) \mapsto x - y^2$. Устроим последовательность $(\hat{\mathbf{m}}_2, \hat{\mathbf{m}}_1) \xrightarrow{\text{P}} (\mathbf{m}_2, \mathbf{m}_1)$. Тогда

$$f(\hat{\mathbf{m}}_2, \hat{\mathbf{m}}_1) = \hat{\mathbf{m}}_2 - \hat{\mathbf{m}}_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2 = s^2 \xrightarrow{\text{P}} f(\mathbf{m}_2, \mathbf{m}_1) = \text{D}\xi.$$

Для $\mathbf{m}_k^{(0)}$ доказывается аналогично.

□

Предложение. \bar{x} — состоятельная оценка $\text{E}\xi$.

Доказательство. Либо по (6.2) для $k = 1$, либо из того факта, что $\text{bias } \bar{x} = 0$, значит

$$\text{MSE } \bar{x} = \text{D}\bar{x} = \frac{\text{D}\xi}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

и по (6.2) получаем утверждение.

□

Предложение. s^2 — состоятельная оценка $\text{D}\xi$.

Доказательство. По (6.2) с $k = 2$.

□

6.3. Асимптотическая нормальность

Определение. Оценка $\hat{\theta}_n$ называется *асимптотически нормальной* оценкой параметра θ с коэффициентом $\sigma^2(\theta)$ если

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2(\theta)).$$

Пример. \bar{x} — асимптотически нормальная оценка, если $D\xi < \infty$, $D\xi \neq 0$:

$$\sqrt{n}(\bar{x} - E\xi) \xrightarrow{d} N(0, D\xi).$$

Доказательство. По ЦПТ,

$$\sqrt{n}(\bar{x} - E\xi) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i - nE\xi}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, D\xi).$$

□

Мы обсуждали, что асимптотическую нормальность можно определять и в слабом смысле — как сходимость по распределению к нормальному распределению $N(0, 1)$ стандартизированной случайной величины.

6.4. Эффективность

Определение. Говорят, что оценка $\hat{\theta}^{(1)}$ *лучше* $\hat{\theta}^{(2)}$ в *среднеквадратичном смысле*, если

$$\text{MSE } \hat{\theta}^{(1)} \leq \text{MSE } \hat{\theta}^{(2)}.$$

Замечание. Для несмещенных оценок определение эквивалентно, конечно,

$$D\hat{\theta}^{(1)} \leq D\hat{\theta}^{(2)}.$$

Определение. В классе несмещенных оценок оценка называется *эффективной* (в средне-квадратическом), если ее дисперсия минимальна. В классе асимптотически несмещенных оценок оценка $\hat{\theta}$ называется *асимптотически эффективной*, если для любой другой оценки $\hat{\theta}^*$ выполнено $D\hat{\theta} \leq D\hat{\theta}^* \leq 1$.

6.4.1. Эффективность и неравенство Рао-Крамера

Пусть $\mathcal{P}_\xi(\theta)$, $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_r)^\top$ — параметрическая модель. Пусть $r = 1$.

Определение. *Информанта n -го порядка:*

$$S_n(\mathbf{x}, \theta) = \frac{d^n \ln L(\theta | \mathbf{x})}{d\theta^n}.$$

Определение. *Информационное количество Фишера:*

$$I_n(\theta) := -ES_2(\mathbf{x}, \theta).$$

Утверждение.

$$I_n(\theta) = ES_1^2(\mathbf{x}, \theta).$$

Пример. $\xi \sim \text{Pois}(\lambda)$.

$$S_1(\mathbf{x}, \theta) = -n + \frac{n\bar{x}}{\lambda}, \quad S_2(\mathbf{x}, \theta) = -\frac{n\bar{x}}{\lambda^2} \implies I_n(\lambda) = E\frac{n\bar{x}}{\lambda^2} = \frac{n}{\lambda^2} E\bar{x} = \frac{n}{\lambda}.$$

Замечание.

$$\ln L(\theta | \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \ln p_{\theta}(x_i) \implies S_2 = \frac{d^2 \ln L(\theta | \mathbf{x})}{d\theta^2} = \sum_{i=1}^n (\ln p_{\theta}(x_i))'',$$

откуда, для повторной независимой выборки,

$$I_n(\theta) = - \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(\ln p_{\theta}(x_i))'' = n \cdot i(\theta), \quad \text{где } i(\theta) = -\mathbb{E}(\ln p_{\theta}(\xi))''.$$

Определение. $C \subset \mathbb{R}$ есть *носитель* параметрического семейства распределений $\mathcal{P}(\theta)$, если

$$\xi \sim \mathcal{P}(\theta) \implies \mathbb{P}(\xi \in C) = 1, \quad \forall \theta \in \Theta.$$

Определение. Условие регулярности: имеют отношение к независимости носителя распределения от параметра, а также к существованию и ограниченности производных функции лог-правдоподобия по параметру до определённого порядка дифференцирования.

Пример. $\text{Exp}(\lambda)$ — регулярное семейство; $U(0, \theta)$ — не является регулярным.

Утверждение. Для несмещенных оценок в условиях регулярности справедливо неравенство Рао–Крамера:

$$D\hat{\theta}_n \geq \frac{1}{I_n(\theta)}.$$

Для смещенных оценок,

$$D\hat{\theta}_n \geq \frac{(1 + \text{bias}'(\theta))^2}{I_n(\theta)}.$$

Следствие. Несмещенная оценка является эффективной, если:

$$D\hat{\theta}_n = \frac{1}{I_n(\theta)}.$$

Следствие. Асимптотически несмещенная оценка является асимптотически эффективной, если:

$$D\hat{\theta}_n \cdot I_n(\theta) \rightarrow 1 \text{ as } n \rightarrow \infty.$$

Упражнение (Хорошее). Показать, что \bar{x} является эффективной оценкой μ в модели $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Следствие. Пусть $\hat{\theta}_n$ — асимптотически несмещенная оценка. Тогда $\hat{\theta}_n$ — асимптотически эффективная, если

$$D\hat{\theta}_n \cdot I_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Пример. Пусть $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$. Можно посчитать, что s^2 является только асимптотически эффективной оценкой σ^2 ; \tilde{s}^2 — просто эффективной.

Пример. Пусть $\xi \sim \text{Pois}(\lambda)$. Поскольку

$$\begin{aligned} D\hat{\lambda}_n &= D\bar{x} = \mathbb{E}\xi/n = \lambda/n \\ I_n(\lambda) &= n/\lambda, \end{aligned}$$

то $\hat{\lambda}_n$ — эффективная оценка (как и ожидалась по свойствам $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$).

6.5. Устойчивость оценок

Так как в реальных данных часто бывают те или иные ошибки, часто жертвуют точностью для увеличения устойчивости (робастности) к выбросам. Устойчивые аналоги оценок часто строятся на основе рангов (номеров по порядку в упорядоченной выборке). Приведем пример.

Пример (Сравнение оценок мат. ожидания симметричного распределения). Пусть \mathcal{P} симметрично — в этом случае $\widehat{\text{med}} \xi = \bar{x}$ и имеет смысл сравнить две этих характеристики.

$$\begin{aligned} D\bar{x} &= \frac{D\xi}{n} \\ \widehat{D\text{med}} \xi &\sim \frac{1}{4n \text{pdf}_{N(\mu, \sigma^2)}^2(\text{med } \xi)} \quad \text{при } n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Так, если $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, то

$$\text{pdf}_{N(\mu, \sigma^2)}^2(\text{med } \xi) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp \left\{ -\frac{(\text{med } \xi - \mu)^2}{\sigma^2} \right\} = \frac{1}{2\pi\sigma^2},$$

откуда

$$\widehat{D\text{med}} \xi = \frac{\pi}{2} \frac{\sigma^2}{n} > \frac{\sigma^2}{n} = D\bar{x},$$

значит \bar{x} эффективнее $\widehat{\text{med}} \xi$.

Замечание. В то же время, $\widehat{\text{med}} \xi$ более устойчива к аутлаерам, чем \bar{x} , и этим лучше.

Часть II.

Некоторые распределения, связанные с нормальным

1. Распределение $N(a, \sigma^2)$

Свойства хорошо известны. TODO

Здесь пока напишу только про измерение расстояния в сигмах. Будет говорить, что точка далеко от мат.ожидания, если это и более далекие значения маловероятны.

Формально, пусть $\xi \sim N(a, \sigma^2)$. Рассмотрим $P(|\xi - a| > k\sigma)$. Эта вероятность не зависит от σ и равна $2(1 - \Phi(k))$, где $\Phi(x)$ — функция стандартного нормального распределения.

Значения $P(|\xi - a| > k\sigma)$:

k	Вероятность
1	0.317
1.64	0.101
1.96	0.050
2	0.046
3	2.70E-03
6	1.97E-09

2. Распределение $\chi^2(m)$

Определение (Распределение $\chi^2(m)$). η имеет распределение χ^2 с m степенями свободы:

$$\eta \sim \chi^2(m) \iff \eta = \sum_{i=1}^m \zeta_i^2, \quad \zeta_i \sim N(0, 1), \quad \zeta_i \text{ независимы.}$$

Свойства¹ $\chi^2(m)$

$$\begin{aligned} E\eta &= \sum_{i=1}^m E\zeta_i^2 = m \\ D\eta &= 2m \end{aligned}$$

Утверждение. Пусть $\eta_m \sim \chi^2(m)$. Тогда, по ЦПТ,

$$\frac{\eta_m - E\eta_m}{\sqrt{D\eta_m}} = \frac{\eta_m - m}{\sqrt{2m}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

Пример. $m = 50$, $\eta_m = 80$. Тогда

$$\frac{80 - 50}{10} = 3$$

и

$$\text{cdf}_{\chi^2(50)}(80) = 0.9955 \approx \Phi(3) = 0.9986.$$

Предложение. $\chi^2(m)/m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1$.

Доказательство. По ЗБЧ. □

¹Вычисление $D\eta$: <https://www.statlect.com/probability-distributions/chi-square-distribution>

3. Распределение Стьюдента $t(m)$

Определение (Распределение $t(m)$). ξ имеет распределение Стьюдента с m степенями свободы, если

$$\xi \sim t(m) \iff \xi = \frac{\zeta}{\sqrt{\eta/m}}, \quad \zeta \sim N(0, 1), \quad \eta \sim \chi^2(m).$$

Свойства $t(m)$

- При $m = 1$ это распределение Коши.
- При $m > 1$, $E\xi = 0$ по симметричности.
- При $m > 2$, $D\xi = m/(m - 2)$.
- При $m > 3$, $A\xi = 0$ по симметричности.
- При $m > 4$, $K\xi = 6/(m - 4)$.

Предложение. *Распределение Стьюдента сходится к стандартному нормальному:*

$$t \Rightarrow N(0, 1).$$

Соображения по поводу. $D\xi \rightarrow 1$, $K\xi \rightarrow 0$.

□

4. Распределение Фишера

Определение. Распределение Фишера имеет вид

$$F(m, k) = \frac{\chi^2(m)/m}{\chi^2(k)/k}.$$

Замечание. $F(1, k) \sim t^2(k)$; $F(m, \infty) = \chi^2(m)/m$ потому что $\chi^2(k)/k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 1$.

5. Квадратичные формы от нормально распределенных случайных величин

(Это на след. семестр, сейчас можно не вникать.)

Пусть $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_p)^\top \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_p)$, \mathbf{B} — симметричная, неотрицательно определенная матрица. Найдем распределение $\boldsymbol{\xi}^\top \mathbf{B} \boldsymbol{\xi}$.

Утверждение. Пусть $\boldsymbol{\xi} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_p)$, \mathbf{B}, \mathbf{C} — симметричные матрицы размерности $p \times p$. Тогда $\boldsymbol{\xi}^\top \mathbf{B} \boldsymbol{\xi} \perp \boldsymbol{\xi}^\top \mathbf{C} \boldsymbol{\xi} \iff \mathbf{BC} = \mathbf{0}$.

Пример (Независимость \bar{x}^2 и s^2). Запишем

$$\begin{aligned}\bar{x}^2 &= \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j = \frac{1}{n} \mathbf{x} \underbrace{\begin{pmatrix} 1/n & \dots & 1/n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/n & \dots & 1/n \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}} \mathbf{x}^\top \\ s^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \mathbf{x} \mathbf{B} \mathbf{x}^\top = \frac{1}{n} \left(\mathbf{x} \mathbf{I}_n \mathbf{x}^\top - \mathbf{x} \mathbf{B} \mathbf{x}^\top \right) = \frac{1}{n} \mathbf{x} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 - 1/n & \dots & -1/n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -1/n & \dots & 1 - 1/n \end{pmatrix}}_{\mathbf{C} = \mathbf{I}_n - \mathbf{B}} \mathbf{x}^\top.\end{aligned}$$

Таким образом, $n\bar{x}^2 = \mathbf{x} \mathbf{B} \mathbf{x}^\top$ и $ns^2 = \mathbf{x} \mathbf{C} \mathbf{x}^\top$. Но

$$\mathbf{BC} = \mathbf{B}(\mathbf{I}_n - \mathbf{B}) = \mathbf{B} - \mathbf{B}^2 = \mathbf{0},$$

так как

$$\mathbf{B}^2 = \begin{pmatrix} 1/n & \dots & 1/n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/n & \dots & 1/n \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} n \cdot 1/n & \dots & n \cdot 1/n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ n \cdot 1/n & \dots & n \cdot 1/n \end{pmatrix} = \mathbf{B}.$$

Значит, $\bar{x}^2 \perp s^2$.

Видно, что $\sigma^{-2} \boldsymbol{\xi}^\top \mathbf{I}_p \boldsymbol{\xi} \sim \chi^2(p)$. На самом деле справедливо

Утверждение. Пусть $\boldsymbol{\xi} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_p)$, \mathbf{B} — симметричная, неотрицательно неопределенная матрица размерности $p \times p$ и $\text{rk } \mathbf{B} = r$. Тогда

$$\sigma^{-2} \boldsymbol{\xi}^\top \mathbf{B} \boldsymbol{\xi} \sim \chi^2(r) \iff \mathbf{B}^2 = \mathbf{B}.$$

Пример. Покажем, что

$$n\sigma^{-2}s^2 \sim \chi^2(p-1).$$

Воспользуемся представлением из предыдущего примера: $ps^2 = \mathbf{x}^\top \mathbf{C} \mathbf{x}$. Но $\text{rk } \mathbf{C} = \text{rk}(\mathbf{I}_p - \mathbf{B}) = p-1$; $\mathbf{B}^2 = \mathbf{B}$, значит $p\sigma^{-2}s^2 \sim \chi^2(p-1)$.

Утверждение (Cochran). Пусть $\boldsymbol{\xi} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}_p)$, $\boldsymbol{\xi}^\top \boldsymbol{\xi} = \sum_i Q_i$, где Q_i — квадратичная форма, заданная \mathbf{B}_i , $\text{rk } \mathbf{B}_i = r_i$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. $\sum r_i = p$
2. $Q_i \sim \chi^2(r_i)$
3. $Q_i \perp Q_j, \quad \forall i \neq j$, т.е. $\mathbf{B}_i \mathbf{B}_j = \mathbf{0}$.

6. Распределение важных статистик

Пусть $\xi \sim N(a, \sigma^2)$.

Предложение. $t = \sqrt{n} \frac{(\bar{x} - E\xi)}{\sigma}$ имеет стандартное нормальное распределение.

Доказательство.

$$t = \frac{\bar{x} - a}{\sqrt{D\bar{x}}} = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - a}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

□

Определим $s_a^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 / n$.

Предложение. $ns_a^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n)$.

Доказательство.

$$\chi^2 = \frac{ns_a^2}{\sigma^2} = \frac{n \cdot 1/n \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - a}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n).$$

□

Предложение. $ns^2 / \sigma^2 = (n-1)\hat{s}^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$.

Доказательство. См. раздел 5).

□

Альтернативное доказательство. По определению запишем

$$\underbrace{D\hat{\xi}_n}_{s^2} = D(\hat{\xi}_n - a) = \underbrace{E(\hat{\xi}_n - a)^2}_{s_a^2} - \underbrace{(E(\hat{\xi}_n - a))^2}_{(\bar{x} - a)^2}.$$

Домножив обе части на n/σ^2 , получим

$$\frac{ns^2}{\sigma^2} = \frac{ns_a^2}{\sigma^2} - \frac{n(\bar{x} - a)^2}{\sigma^2} = \underbrace{\frac{ns_a^2}{\sigma^2}}_{\sim \chi^2(n)} - \underbrace{\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - a)}{\sigma} \right)^2}_{\sim \chi^2(1)} \Rightarrow \frac{ns^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

□

Замечание. Для строгого доказательства, нужно использовать независимость \bar{x}^2 и s^2 (см. раздел 5).

Предложение. Следующая статистика имеет распределение Стьюдента:

$$t = \sqrt{n-1} \frac{\bar{x} - a}{s} = \frac{\sqrt{n-1}(\bar{x} - a)}{\sqrt{n-1}/\sqrt{n} \cdot \tilde{s}} = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - a}{\tilde{s}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(0, 1).$$

Предложение. $t = \sqrt{n-1} \frac{\bar{x}-a}{s} = \sqrt{n} \frac{\bar{x}-a}{\tilde{s}} \sim t(n-1)$.

Доказательство.

$$t = \frac{\sqrt{n-1}(\bar{x} - a)}{s} = \frac{\sqrt{n-1}\left(\frac{\bar{x} - a}{\sigma}\right)}{s/\sigma} = \frac{\left(\frac{\bar{x} - a}{\sigma}\right)}{\sqrt{\frac{s^2/\sigma^2}{n-1}}} = \frac{\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - a)}{\sigma}}{\sqrt{\frac{ns^2/\sigma^2}{n-1}}} = \frac{\zeta}{\sqrt{\eta/(n-1)}} \sim t(n-1),$$

поскольку

$$\zeta = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - a)}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad \eta = \frac{ns^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

и они независимы (также пока без доказательства — используется техника квадратичных форм или можно доказать через разложение дисперсии). \square

Часть III.

Проверка гипотез и доверительные интервалы

Этот раздел иногда называется «Confirmatory Data Analysis» в противовес «Exploratory Data Analysis», не включающему в себя понятие *гипотезы*.

1. Построение критерия

Тут должно быть про определение критерия и построение его через статистику критерия.

2. Проверка гипотезы о значении параметра (характеристики)

2.1. Проверка гипотезы о значении мат. ожидания (t -критерий)

$H_0 : E\xi = a = a_0$. Соответствие оценки математического ожидания гипотезе удобно выражать разницей $\bar{x} - a_0$ с «идеальным» значением 0. Отнормировав эту разницу, получим статистику, распределение которой известно.

2.1.1. $D\xi = \sigma^2 < \infty$

Предложение. Пусть $D\xi = \sigma^2 < \infty$; тогда используется следующая статистика (z -score)

$$t = z = \sqrt{n} \frac{(\bar{x} - a_0)}{\sigma} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(0, 1)$$

Предложение. При условии $\xi \sim N(a, \sigma^2)$,

$$t = z \sim N(0, 1).$$

Доказательство.

$$z = \frac{\bar{x} - a_0}{\sqrt{D\bar{x}}} = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - a_0}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

□

2.1.2. $D\xi$ неизвестна

Предложение. Пусть $D\xi$ неизвестна; тогда используется следующая статистика

$$t = \sqrt{n-1} \frac{\bar{x} - a_0}{s} = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - a_0}{\tilde{s}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(0, 1).$$

Предложение. При условии нормальности данных,

$$t \sim t(n-1).$$

2.1.3. z -критерий для пропорции в модели Бернулли

Пусть $\xi \sim \text{Ber}(p)$. Поскольку $E\xi = p$, можно воспользоваться только что введенной статистикой; учитывая $D\xi = p(1-p)$,

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

Разница с общим случаем состоит в том, что в параметрической модели с одним параметром не нужно оценивать дисперсию. Так как все выражается через этот параметр, то имеет формулу для дисперсии через значение параметра, предполагаемое в нулевой гипотезе.

2.2. Проверка гипотезы о значении дисперсии в нормальной модели (критерий χ^2)

Пусть $\xi \sim N(a, \sigma^2)$. $H_0 : D\xi = \sigma^2 = \sigma_0^2$. Соответствие оценки дисперсии гипотезе удобно выражать отношением s^2/σ_0^2 (или s_a/σ_0^2 если a известно) с «идеальным» значением 1. Домножив на n , получим статистику, распределение которой известно.

2. Проверка гипотезы о значении параметра (характеристики)

2.2.1. $E\xi = a < \infty$

Предложение. Пусть $E\xi = a < \infty$; При условии нормальности данных используется следующая статистика:

$$\chi^2 = n \frac{s_a^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n).$$

2.2.2. $E\xi$ неизвестно

Предложение. Пусть $E\xi$ неизвестно. При условии нормальности данных используется следующая статистика:

$$\chi^2 = n \frac{s^2}{\sigma_0^2} = (n-1) \frac{\tilde{s}^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1).$$

Упражнение. $s^2 = 1.44, \bar{x} = 55, n = 101$. Проверить гипотезу $\sigma_0^2 = 1.5$ в нормальной модели.

Решение. Воспользуемся статистикой

$$\chi^2 = \frac{ns^2}{\sigma_0^2} = 101 \cdot 0.96 = 96.96.$$

«Идеальные» значения близки к $E\xi_{\chi^2(100)} = 100$, так что определим критическую область на концах плотности:

$$p\text{-value}/2 = \text{cdf}_{\chi^2(100)}(96.96) = \text{pchisq}(96.96, 100) \approx 0.43 \implies p\text{-value} \approx 0.86.$$

Замечание. Можно посчитать и по таблицам для нормального распределения. Раз

$$\frac{\eta_m - E\eta_m}{\sqrt{D\eta_m}} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} N(0, 1),$$

то

$$\frac{96.96 - 100}{\sqrt{200}} \approx -0.215 \implies p\text{-value}/2 = \Phi(-0.215) \approx 0.415.$$

┘

3. Доверительные интервалы

3.1. Мотивация и определение

Точечные оценки не дают информации о том, насколько (количественно) настоящее значение далеко от оценки.

Определение. $[b_1, b_2]$ — *доверительный интервал* для параметра θ с уровнем доверия $\gamma \in [0, 1]$, если $\forall \theta$

$$P(\theta \in [b_1, b_2]) = \gamma, \quad \text{где } b_1 = b_1(\mathbf{x}), b_2 = b_2(\mathbf{x}) \text{ — статистики.}$$

Замечание. Если выборка из дискретного распределения, то b_1, b_2 — тоже дискретны. Поэтому наперед заданную точность получить может не получиться; в таких случаях знак « $=$ » заменяют « \geq ». Аналогично с заменой на « $\xrightarrow{n \rightarrow \infty}$ » для асимптотических доверительных интервалов, когда точные получить невозможно или трудоемко.

3.2. Доверительный интервал для проверки гипотезы о значении параметра

Зафиксируем $H_0 : \theta = \theta_0$ и $\gamma = 1 - \alpha$, где α играет роль уровня значимости. По определению доверительного интервала, $P(\theta \in [a_\gamma(\mathbf{x}), b_\gamma(\mathbf{x})]) = \gamma$. Тогда

$$P(\theta \in [b_1(\mathbf{x}), b_2(\mathbf{x})]) = \gamma = 1 - \alpha \implies \alpha = 1 - P(\theta \in [a_\gamma(\mathbf{x}), b_\gamma(\mathbf{x})]) = P(\theta \notin [a_\gamma(\mathbf{x}), b_\gamma(\mathbf{x})])$$

и $\mathcal{A}_{\text{крит}} = \mathbb{R} \setminus [b_1(\mathbf{x}), b_2(\mathbf{x})]$. Соответственно,

$$\begin{cases} \text{отвергаем } H_0, & \text{если } \theta_0 \notin [b_1(\mathbf{x}), b_2(\mathbf{x})] \\ \text{не отвергаем } H_0, & \text{если } \theta_0 \in [b_1(\mathbf{x}), b_2(\mathbf{x})]. \end{cases}$$

Вероятность ошибки первого рода равно α , что соответствует определению критерия. Заметим, что здесь мы пользуемся общим определением критерия, а не частным случаем, когда критерий строится через статистику критерия.

3.3. Доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии в нормальной модели

Предположение. Пусть $\xi \sim N(a, \sigma^2)$.

3.3.1. Доверительный интервал для a

- Пусть σ^2 известно. Свяжем a с выборкой через статистику критерия $t = \sqrt{n} \frac{(\bar{x} - a)}{\sigma} \sim N(0, 1)$:

$$\gamma = P(c_1 < t < c_2) = P\left(c_1 < \sqrt{n} \frac{(\bar{x} - a)}{\sigma} < c_2\right) = P\left(a \in \left(\bar{x} - \frac{\sigma c_2}{\sqrt{n}}, \bar{x} - \frac{\sigma c_1}{\sqrt{n}}\right)\right).$$

Решений уравнения $P(c_1 < \sqrt{n}(\bar{x} - a)/\sigma < c_2) = \Phi(c_2) - \Phi(c_1) = \gamma$ бесконечно много. Чем $[c_1, c_2]$ короче, тем лучше. Поскольку Φ симметрична и унимодальна,

$$\begin{aligned} c_1 &= -c_\gamma \\ c_2 &= c_\gamma, \end{aligned} \quad \text{где } c_\gamma = \text{cdf}_{N(0,1)}^{-1}\left(\gamma + \frac{1-\gamma}{2}\right) = x_{\frac{1+\gamma}{2}}.$$

Наконец,

$$P\left(a \in \left(\bar{x} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} c_\gamma\right)\right) = \gamma.$$

- Пусть σ^2 неизвестно. По аналогии,

$$\gamma = P\left(c_1 < \frac{\sqrt{n-1}(\bar{x} - a)}{s} < c_2\right) = P\left(a \in \left(\bar{x} \pm \frac{c_\gamma s}{\sqrt{n-1}}\right)\right), \quad c_\gamma = \text{cdf}_{t(n-1)}^{-1}\left(\frac{1+\gamma}{2}\right)$$

и

$$P\left(a \in \left(\bar{x} \pm \frac{\tilde{s}}{\sqrt{n}} c_\gamma\right)\right) = \gamma.$$

Упражнение. Пусть $s^2 = 1.21$, $\bar{x} = 1.9$, $n = 36$. Построить 95% доверительный интервал для $E\xi$.

Решение.

$$c_\gamma = \text{qt}(0.975, 35) \approx 2.03 \implies \left(1.9 \pm \frac{2.03 \cdot \sqrt{1.21}}{\sqrt{35}}\right) = (1.52; 2.28).$$

┘

3.3.2. Доверительный интервал для σ^2

- Пусть a известно. Поскольку плотность χ^2 становится все более симметричной с ростом n , примем

$$c_1 = \text{cdf}_{\chi^2(n)}^{-1}\left(\frac{1-\gamma}{2}\right), \quad c_2 = \text{cdf}_{\chi^2(n)}^{-1}\left(\frac{1+\gamma}{2}\right).$$

Тогда

$$P\left(c_1 < \frac{ns_a^2}{\sigma^2} < c_2\right) = \gamma \iff P\left(\sigma^2 \in \left(\frac{ns_a^2}{c_2}, \frac{ns_a^2}{c_1}\right)\right) = \gamma.$$

- Пусть a неизвестно. Тогда аналогично

$$P\left(\sigma^2 \in \left(\frac{ns^2}{c_2}, \frac{ns^2}{c_1}\right)\right) = \gamma,$$

где

$$c_1 = \text{cdf}_{\chi^2(n-1)}^{-1}\left(\frac{1-\gamma}{2}\right), \quad c_2 = \text{cdf}_{\chi^2(n-1)}^{-1}\left(\frac{1+\gamma}{2}\right).$$