

Indice

1	Lezione 1 - 24/09	3
1.1	Operazione Binaria	3
1.2	Strutture Algebriche	3
1.2.1	Gruppo	4
1.2.2	Anello	5
1.2.3	Campo	6
1.2.4	Spazio Vettoriale	6
2	Lezione 2 - 26/09	8
2.1	Polinomi	8
2.2	Matrici	10
3	Lezione 3 - 01/10	12
3.1	Matrice Trasposta	12
3.2	Prodotto Scalare	12
3.3	Matrice Conformabile	12
3.4	Prodotto Riga per Colonna	13
3.5	Sistema Lineare	13
3.6	Operazioni o Trasformazioni Elementari sulle Righe di una Matrice	15
4	Lezione 4 - 3/10 (Teams)	16
4.1	Matrice a Gradini e Completamente a Gradini	16
4.2	Algoritmo di Gauss	16
4.3	Teorema di struttura	18
4.4	Proprietà dell'insieme S_0 come sottospazio vettoriale	19
5	Lezione 5 - 08/10	20
5.1	Sistemi di Generatori	20
5.2	Dipendenza e indipendenza lineare	21
6	Lezione 6 - 10/10	23
6.1	Basi	23
6.1.1	Teorema di estrazione di una base	23
6.2	Teorema di equipotenza della base	26
7	Lezione 7 - 15/10	29
7.1	Lemma di Steinitz	29
7.2	Isomorfismo delle Coordinate	31
7.3	Proprietà dell'Isomorfismo delle Coordinate	33
7.4	Relzioni tra dimensioni di spazio vettoriale e di un suo sottospazio	34
8	Lezione 8 - 17/10	36
8.1	L'intersezione di sottospazi è un sottospazio	36
8.2	Sottospazio Somma	37
8.3	Somma di sottospazi generati da insiemi	38
8.4	Regola di Grassman	39

9	Lezione 9 - 22/10	44
9.1	Applicazioni Lineari	44
9.2	Kernel	46
9.3	Teorema dell'Equazione Dimensionale	49
10	Lezione 10 - 24/10	50
10.1	Rango	51
10.2	Teorema del Rango	51
10.3	Rango di matrici a gradini	53
10.4	Teorema di Rouche Capelli	55

Capitolo 1

Lezione 1 - 24/09

1.1 Operazione Binaria

Definizione (Operazioni su Insiemi)

Siano A, B, C insiemi. Diremo **operazione binaria** ogni applicazione

$$\varphi : A \times B \rightarrow C.$$

- Se in particolare $A = B = C$, allora diremo che $\varphi : A \times A \rightarrow A$ è un'operazione binaria interna su A .
- Se $B = C$, allora diremo che φ si dice esterna con operatori in A .

1.2 Strutture Algebriche

Ricorda: Strutture Algebriche

- $(S, \perp)$ si dice **semigrupp** se $\perp$ è associativa;
- $(S, \perp)$ si dice **semigrupp commutativo** se $\perp$ è semigrupp con commutatività;
- $(S, \perp)$ si dice **monoide** se $\perp$ è semigrupp dotato di neutro;
- $(S, \perp)$ si dice **monoide commutativo** se $\perp$ è monoide con commutatività;
- $(S, \perp)$ si dice **gruppo** se $\perp$ è monoide dove ogni elemento è simmetrizzabile;
- $(S, \perp)$ si dice **gruppo abeliano** se $\perp$ è gruppo con commutatività.

Definizione (Struttura Algebrica)

Per **struttura algebrica** si intende una n -upla costituita da insiemi e operazioni su di essi. La più semplice struttura algebrica, spesso detta *gruppoide*, è una coppia $(X, \perp)$, dove X è un insieme e $\perp$ è un'operazione binaria interna su X .

1.2.1 Gruppo

Definizione (Gruppo)

Un **gruppo** è una struttura algebrica $(G, \perp)$ formata da un insieme G e da un'operazione binaria interna $\perp: G \times G \rightarrow G$, che soddisfa le seguenti proprietà:

1. **Associatività:** $\forall a, b, c \in G, (a \perp b) \perp c = a \perp (b \perp c)$;
2. **Elemento neutro:** esiste un elemento $e \in G$ tale che $\forall a \in G, a \perp e = e \perp a = a$;
3. **Elemento inverso:** per ogni $a \in G$ esiste un elemento $\bar{a} \in G$ tale che $a \perp \bar{a} = \bar{a} \perp a = e$.

Se inoltre vale la **proprietà commutativa**

$$a \perp b = b \perp a \quad \forall a, b \in G,$$

allora il gruppo si dice **abeliano**.

Proposizione: Proprietà elementari in un gruppo

Sia $(X, \perp)$ un gruppoide (cioè X insieme non vuoto con un'operazione binaria $\perp$ su X). Valgono le seguenti proprietà.

1. Se $(X, \perp)$ ammette un elemento neutro, questo è unico.
2. Se $(X, \perp)$ ammette un elemento neutro e e $\perp$ è associativa, allora per ogni $x \in X$ invertibile l'inverso di x è unico.
3. Inoltre, se $\perp$ è associativa e ha elemento neutro $u \in A$ e abbiamo $x, y \in A$ che hanno i loro inversi $\bar{x}, \bar{y}$, allora $x \perp y$ è invertibile e il suo inverso è $\bar{y} \perp \bar{x}$.

Dimostrazioni:

Dimostrazione della proprietà 1 (unicità dell'elemento neutro). Supponiamo che e ed e' siano due elementi neutri in $(X, \perp)$. Per definizione di elemento neutro:

$$\forall x \in X : \quad e \perp x = x \quad \text{e} \quad e' \perp x = x.$$

In particolare, considerando $x = e'$ nella prima uguaglianza e $x = e$ nella seconda otteniamo

$$e \perp e' = e' \quad \text{e} \quad e' \perp e = e.$$

Se non assumiamo necessariamente commutatività, bperpa usare una delle due uguaglianze applicata all'altro neutro: usando $e \perp e' = e'$ e insieme $e' \perp e = e$ otteniamo

$$e = e' \quad (\text{poiché } e = e' \perp e = e').$$

Quindi $e = e'$ e l'elemento neutro è unico. □

Dimostrazione della proprietà 2 (unicità dell'inverso e formula dell'inverso del prodotto). Sia $(X, \perp)$ associativo e con elemento neutro e .

Unicità dell'inverso. Sia $x \in X$ e supponiamo che y e y' siano due inversi di x , cioè

$$x \perp y = e = y \perp x, \quad x \perp y' = e = y' \perp x.$$

Allora, usando l'associatività,

$$y = y \perp e = y \perp (x \perp y') = (y \perp x) \perp y' = e \perp y' = y'.$$

Quindi $y = y'$ e l'inverso è unico. □

Dimostrazione della proprietà 3. Siano $(A, \perp)$ un insieme con operazione binaria $\perp$, associativa, e dotato di elemento neutro $u \in A$. Supponiamo $x, y \in A$ invertibili e indichiamo con $\bar{x}$ e $\bar{y}$ i loro inversi, cioè

$$x \perp \bar{x} = \bar{x} \perp x = u, \quad y \perp \bar{y} = \bar{y} \perp y = u.$$

Consideriamo il candidato $\bar{y} \perp \bar{x}$ come possibile inverso di $x \perp y$. Calcoliamo il prodotto a destra:

$$\begin{aligned} (x \perp y) \perp (\bar{y} \perp \bar{x}) &\stackrel{(\text{assoc.})}{=} x \perp (y \perp (\bar{y} \perp \bar{x})) \\ &= x \perp ((y \perp \bar{y}) \perp \bar{x}) \\ &= x \perp (u \perp \bar{x}) \\ &= x \perp \bar{x} \\ &= u. \end{aligned}$$

Analogamente, il prodotto a sinistra:

$$\begin{aligned} (\bar{y} \perp \bar{x}) \perp (x \perp y) &\stackrel{(\text{assoc.})}{=} \bar{y} \perp (\bar{x} \perp (x \perp y)) \\ &= \bar{y} \perp ((\bar{x} \perp x) \perp y) \\ &= \bar{y} \perp (u \perp y) \\ &= \bar{y} \perp y \\ &= u. \end{aligned}$$

Quindi $\bar{y} \perp \bar{x}$ è sia inverso a destra sia inverso a sinistra di $x \perp y$. Poiché in una struttura con elemento neutro e operazione associativa l'inverso (se esiste) è unico, segue che

$$\overline{(x \perp y)} = \bar{y} \perp \bar{x},$$

come volevamo dimostrare. □

1.2.2 Anello

Definizione (Anello)

Un **anello** è una struttura algebrica $(A, +, \cdot)$ formata da un insieme A e da due operazioni binarie interne:

$$+ : A \times A \rightarrow A, \quad \cdot : A \times A \rightarrow A,$$

tali che valgono le seguenti proprietà:

1. $(A, +)$ è un **gruppo abeliano**
2. L'operazione $\cdot$ (detta *moltiplicazione*) è associativa
3. La moltiplicazione è distributiva rispetto all'addizione:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c, \quad \forall a, b, c \in A.$$

Se esiste un elemento $1 \in A$ tale che $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ per ogni $a \in A$, l'anello si dice **unitario** o **con elemento neutro moltiplicativo**.

Se inoltre la moltiplicazione è commutativa, l'anello si dice **commutativo**.

1.2.3 Campo

Definizione (Campo)

Un **campo** è una struttura algebrica $(K, +, \cdot)$ formata da un insieme K e da due operazioni binarie interne:

$$+ : K \times K \rightarrow K, \quad \cdot : K \times K \rightarrow K,$$

che soddisfano le seguenti proprietà:

1. $(K, +)$ è un **gruppo abeliano**:
2. $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ è un **gruppo abeliano** rispetto alla moltiplicazione:
3. Le due operazioni sono collegate dalle proprietà distributive:

In altre parole, un campo è un **anello commutativo con elemento unità** in cui **ogni elemento non nullo è invertibile**.

1.2.4 Spazio Vettoriale

Definizione (Spazio vettoriale)

Diremo che $(V, \boxplus, \boxminus)$ è **spazio vettoriale** sul campo $\mathbb{R}$ se:

1. $V \neq \emptyset$
Operazione interna: $\boxplus : V \times V \rightarrow V, (u, v) \mapsto u + v$
Operazione esterna: $\boxminus : K \times V \rightarrow V, (\lambda, v) \mapsto \lambda v$
2. $(V, \boxplus)$ è gruppo abeliano, $\forall \underline{v}, \underline{w}, \underline{z} \in V$
 - (a) Proprietà associativa: $(\underline{v} \boxplus \underline{w}) \boxplus \underline{z} = \underline{v} \boxplus (\underline{w} \boxplus \underline{z})$
 - (b) Proprietà commutativa: $\underline{v} \boxplus \underline{w} = \underline{w} \boxplus \underline{v}$
 - (c) Esiste opposto: $\underline{v} \boxplus (-\underline{v}) = \underline{0}$
 - (d) Esiste elemento neutro: $\underline{v} \boxplus \underline{0} = \underline{0} \boxplus \underline{v} = \underline{v}$
3. Esiste elemento neutro rispetto a $\boxminus$: $1 \boxminus \underline{v} = \underline{v} = \underline{v} \boxminus 1$
4. **Per tutti** $h, k \in \mathbb{R}, \underline{v}, \underline{w} \in V$ valgono le seguenti proprietà:
 - (a) Compatibilità della moltiplicazione scalare: $(h \cdot k) \boxminus \underline{v} = h \boxminus (k \boxminus \underline{v})$
 - (b) Distributività rispetto alla somma scalare: $(h + k) \boxminus \underline{v} = (h \boxminus \underline{v}) \boxplus (k \boxminus \underline{v})$
 - (c) Distributività rispetto alla somma vettoriale: $h \boxminus (\underline{v} \boxplus \underline{w}) = (h \boxminus \underline{v}) \boxplus (h \boxminus \underline{w})$

Proposizione: Proprietà aritmetiche degli Spazi Vettoriali

Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall v \in V$ si ha:

1. $\alpha \boxminus v = 0 \iff \alpha = 0$ oppure $v = 0$
2. $(-\alpha) \boxminus v = \alpha \boxminus (-v) = -(\alpha \boxminus v)$
3. se $\alpha \boxminus v = \beta \boxminus v$ e $v \neq \emptyset$, allora $\alpha = \beta$
4. se $\alpha \boxminus u = \alpha \boxminus v$ e $\alpha \neq \emptyset$, allora $u = v$

Dimostrazione delle proprietà. (i) Dimostriamo che

$$av = 0 \iff a = 0 \text{ oppure } v = 0.$$

Direzione “ $\Rightarrow$ ”: se $a = 0$ oppure $v = 0$, allora chiaramente $av = 0$. Infatti:

- se $a = 0$, per le proprietà dello spazio vettoriale abbiamo $0 \cdot v = 0$;
- se $v = 0$, allora $a \cdot 0 = 0$.

Direzione “ $\Leftarrow$ ”: supponiamo che $av = 0$ e $a \neq 0$. Poiché $a \neq 0$, esiste l'inverso $a^{-1} \in K$. Moltiplicando entrambi i membri per a^{-1} otteniamo:

$$a^{-1}(av) = a^{-1} \cdot 0 = 0.$$

Usando l'associatività della moltiplicazione scalare:

$$(a^{-1}a)v = 1 \cdot v = v = 0.$$

Quindi, se $a \neq 0$ e $av = 0$, necessariamente $v = 0$. Pertanto, la proprietà (i) è dimostrata.

(ii) Dimostriamo ora che

$$(-a)v = a(-v) = -(av).$$

Si ha immediatamente:

$$av + (-a)v = (a + (-a))v = 0v = 0,$$

e anche

$$av + a(-v) = a(v + (-v)) = a0 = 0.$$

Poiché in entrambi i casi la somma è nulla, segue che

$$(-a)v = -(av) = a(-v).$$

(iii) Se $av = \beta v$, allora

$$(a + (-\beta))v = av + (-\beta)v = \beta v + (-\beta)v = 0.$$

Poiché $v \neq 0$ per ipotesi, per la proprietà (i) segue che $a + (-\beta) = 0$, e quindi $a = \beta$.

(iv) Se $au = av$ e $a \neq 0$, allora

$$a(u + (-v)) = au + a(-v) = au - av = 0.$$

Poiché $a \neq 0$, per la proprietà (i) si ha $u + (-v) = 0$, cioè $u = v$.

□

Capitolo 2

Lezione 2 - 26/09

2.1 Polinomi

Definizione (Polinomi)

Sia $(K, +, \cdot)$ un campo e x una variabile (detta anche *incognita*).

- Per ogni $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ si definisce $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ volte}}$, con la convenzione $x^0 = 1$.
- Un **polinomio** nella variabile x a coefficienti in K è una somma finita di potenze di x moltiplicate per scalari in K :

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_dx^d = \sum_{i=0}^d a_ix^i,$$

dove $a_0, a_1, \dots, a_d \in K$ e $a_d \neq 0$.

Il numero naturale d è detto **grado** del polinomio, e si indica con

$$\text{gr}(p) = \max\{i \mid a_i \neq 0\}.$$

L'insieme di tutti i polinomi in una variabile x a coefficienti in K si indica con

$$K[x] = \{p(x) \mid p(x) \text{ è un polinomio in } x \text{ con coefficienti in } K\}.$$

Osservazione: Operazioni in $K[x]$

In $K[x]$ sono definite naturalmente le seguenti operazioni:

- **Somma di polinomi:**

$$(p+q)(x) = \sum_{i=0}^{\max(d_p, d_q)} (a_i + b_i)x^i, \quad p(x) = \sum a_i x^i, \quad q(x) = \sum b_i x^i.$$

Esempio:

$$(2x^2 + 3x + 1) + (x^2 - x + 4) = 3x^2 + 2x + 5.$$

- **Moltiplicazione per scalare:**

$$(\lambda p)(x) = \sum_{i=0}^d (\lambda a_i)x^i, \quad \lambda \in K.$$

Esempio:

$$3(2x^2 + x + 1) = 6x^2 + 3x + 3.$$

- **Prodotto di polinomi:**

$$(p \cdot q)(x) = \left(\sum_{i=0}^d a_i x^i \right) \left(\sum_{\alpha=0}^e b_{\alpha} x^{\alpha} \right) = \sum_{k=0}^{d+e} \left(\sum_{i+\alpha=k} a_i b_{\alpha} \right) x^k.$$

Esempio:

$$(x+1)(x^2+x+1) = x^3 + 2x^2 + 2x + 1.$$

Con queste operazioni $(K[x], +, \cdot)$ è un **anello commutativo con identità** e, rispetto alla sola somma, uno **spazio vettoriale** su K .

Definizione (Polinomi in più variabili)

Siano $x_1, x_2, \dots, x_n$ variabili e K un campo.

Un **monomio** nelle variabili $x_1, \dots, x_n$ è un prodotto del tipo

$$x^{\alpha} = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n},$$

dove $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$.

Un **polinomio in n variabili** a coefficienti in K è una somma finita di monomi moltiplicati per scalari:

$$p(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\alpha \in A} a_{\alpha} x^{\alpha}, \quad a_{\alpha} \in K,$$

dove $A \subset \mathbb{N}^n$ è un insieme finito.

L'insieme di tutti i polinomi in n variabili a coefficienti in K si indica con

$$K[x_1, \dots, x_n].$$

Definizione (Grado di un polinomio in più variabili)

Sia $p(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\alpha} a_{\alpha} x^{\alpha}$, con $a_{\alpha} \neq 0$ per un certo numero finito di α .

- Il **grado del monomio** $x^{\alpha} = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$ è

$$\text{gr}(x^{\alpha}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

- Il **grado del polinomio** è

$$\text{gr}(p) = \max\{\text{gr}(x^{\alpha}) \mid a_{\alpha} \neq 0\}.$$

Esempio:

$$p(x, y, z) = 2x^2y + 3xyz^3 - 5z^2 \Rightarrow \text{gr}(p) = \max\{3, 5, 2\} = 5.$$

Definizione (Polinomio lineare)

Un **polinomio lineare** in una variabile x su un campo K è un polinomio del tipo

$$p(x) = a_1x + a_0,$$

dove $a_1, a_0 \in K$ e $a_1 \neq 0$.

- Il **grado** di un polinomio lineare è 1, poiché il termine di grado più alto è a_1x .
- Il termine a_1 si chiama **coefficiente angolare** o **coefficiente direttore**.
- Il termine a_0 si chiama **termine noto**.

Nel caso di più variabili, un **polinomio lineare** in $x_1, x_2, \dots, x_n$ è della forma

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + a_0,$$

con $a_0, a_1, \dots, a_n \in K$ e almeno uno tra $a_1, \dots, a_n$ non nullo.

2.2 Matrici

Definizione (Matrice)

Siano $m, n \in \mathbb{N}$ e sia X un insieme non vuoto. Una **matrice di tipo** $m \times n$ a valori in X è una applicazione

$$A : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \longrightarrow X$$

che associa a ogni coppia (i, j) un elemento $a_{ij} \in X$.

Scriviamo

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

L'insieme di tutte le matrici $m \times n$ a valori in X si indica con $M_{m,n}(X)$.

Esempio

Matrice 3×2 su un insieme X Siano

$$m = 3, \quad n = 2, \quad X = \{\pi, \sqrt{2}, \square, \star, y\}.$$

Definiamo

$$A : \{1, 2, 3\} \times \{1, 2\} \longrightarrow X$$

tale che:

$$\begin{aligned} A(1, 1) &= \pi, & A(1, 2) &= \sqrt{2}, \\ A(2, 1) &= \square, & A(2, 2) &= \star, \\ A(3, 1) &= y, & A(3, 2) &= \pi. \end{aligned}$$

Allora la matrice A è:

$$A = \begin{pmatrix} \pi & \sqrt{2} \\ \square & \star \\ y & \pi \end{pmatrix}.$$

Osservazioni: Operazioni sulle matrici

Siano $A, B \in M_{m,n}(K)$.

- La loro somma è la matrice $C = A + B$ definita da:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad \forall i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Esempio

Somma di matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow A + B = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}.$$

- Sia $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(K)$ e $\lambda \in K$. Definiamo la matrice $\lambda A = (\lambda a_{ij})$, cioè:

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}.$$

Esempio

Moltiplicazione per uno scalare

$$\lambda = 3, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow 3A = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

Capitolo 3

Lezione 3 - 01/10

3.1 Matrice Trasposta

Definizione (Matrice Trasposta)

Sia $A \in M_{m,n}(K)$. La trasposta di A , denotata tA , è la matrice del tipo $[n, m]$ che come righe ha le colonne di A .

$${}^tA = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \in M_{n,m}(K), \text{ ottenuta scambiando righe e colonne di } A.$$

3.2 Prodotto Scalare

Definizione (Prodotto scalare)

Sia $K = \mathbb{R}$ e siano due vettori $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n), \mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in K^n$.

Il **prodotto scalare** è la funzione

$$K^n \times K^n \longrightarrow K, \quad (\mathbf{a}, \mathbf{b}) \longmapsto a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle,$$

che associa la coppia di vettori ad uno scalare, dato dalla somma delle componenti omonime dei due vettori.

3.3 Matrice Conformabile

Definizione (Matrice Conformabile)

Due matrici $A \in M_{m,n}(K)$ e $B \in M_{p,q}(K)$ si dicono **conformabili** per il prodotto se e solo se il numero di colonne di A è uguale al numero di righe di B , cioè $n = p$. In tal caso, il prodotto AB è definito ed è una matrice di dimensione $m \times q$.

Esempio: Siano

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \in M_{3,2}(K), \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \in M_{2,3}(K).$$

Allora A e B sono conformabili e

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 10 & 1 \cdot 8 + 2 \cdot 11 & 1 \cdot 9 + 2 \cdot 12 \\ 3 \cdot 7 + 4 \cdot 10 & 3 \cdot 8 + 4 \cdot 11 & 3 \cdot 9 + 4 \cdot 12 \\ 5 \cdot 7 + 6 \cdot 10 & 5 \cdot 8 + 6 \cdot 11 & 5 \cdot 9 + 6 \cdot 12 \end{bmatrix} \in M_{3,3}(K).$$

3.4 Prodotto Riga per Colonna

Definizione (Prodotto Riga Per Colonna)

Siano $A \in M_{m,n}(K)$ e $B \in M_{n,p}(K)$. Il prodotto di una riga i -esima di A per una colonna j -esima di B è definito come la somma dei prodotti delle componenti corrispondenti:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}.$$

In altre parole, per ottenere l'elemento in posizione (i, j) del prodotto AB , si moltiplicano elemento per elemento la riga i di A con la colonna j di B e si sommano i risultati.

Esempio: Siano

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}.$$

Allora

$$(AB)_{11} = 1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 = 58, \quad (AB)_{12} = 1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 12 = 68,$$

e così via per gli altri elementi del prodotto.

Osservazione: Proprietà Prodotto riga per colonna

- Non è commutativa.
- Distributività destra e sinistra.
- È associativa.
- Ha elemento neutro formato dalla matrice identica I_n .

3.5 Sistema Lineare

Definizione (Sistema Lineare)

Siano $m, n \in \mathbb{N}$, e sia K un campo. Un **sistema lineare** di m equazioni in n incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$ su un campo K è un insieme di m equazioni del tipo:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n - b_1 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n - b_2 = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n - b_m = 0 \end{cases}$$

In forma compatta, un sistema lineare può essere scritto come:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

dove:

- $A \in M_{m,n}(K)$ è la **matrice dei coefficienti**;
- $\mathbf{x} \in K^n$ è il **vettore incognite**;
- $\mathbf{b} \in K^m$ è il **vettore dei termini noti**.

Osservazione: Soluzioni di un sistema lineare

L'insieme delle soluzioni di un sistema lineare è dato da

S_1 soluzioni della prima equazione $E_1(x)$

S_2 soluzioni della seconda equazione $E_2(x)$

...

S_m soluzioni della m-esima equazione $E_m(x)$

Noi siamo interessati a

$$S = \bigcap_{i=1}^m S_i,$$

ovvero l'intersezione di tutte le soluzioni del sistema.

Definizione (Compatibilità di un sistema lineare)

Un sistema lineare Σ si dice **compatibile** se ammette almeno una soluzione, ossia se l'insieme delle soluzioni è diverso dal vuoto.

Altrimenti se $S = \emptyset$, allora il sistema si dice **incompatibile**.

Definizione (Matrice completa e incompleta)

Dato un sistema lineare Σ si distinguono due matrici:

- La **matrice incompleta** (o matrice dei coefficienti) di un sistema lineare contiene solo i coefficienti delle incognite.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- La **matrice completa** (o matrice dei coefficienti estesa) si ottiene aggiungendo a quella incompleta una colonna aggiuntiva con i termini noti del sistema.

$$C = (A | \mathbf{b}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

Esempi di matrici complete e incomplete

Consideriamo due sistemi lineari in due incognite x_1, x_2 .

- **Sistema omogeneo** Σ (con termini noti nulli):

$$\Sigma_0 : \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

- Matrice incompleta:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

- **Sistema non omogeneo** Σ (con termini noti $\neq 0$):

$$\Sigma : \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_4 - 3 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 5 = 0 \end{cases}$$

- Matrice completa:

$$A = \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 3 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 5 \end{array} \right]$$

3.6 Operazioni o Trasformazioni Elementari sulle Righe di una Matrice

Definizione (Operazioni elementari sulle righe)

Sia $A \in M_{m,n}(K)$ una matrice. Si chiamano **operazioni elementari sulle righe** le seguenti trasformazioni che possono essere applicate alle righe di A :

1. **Scambio di due righe:** per ogni $h, k \in \{1, \dots, m\}$,

$$\mathbf{b}^{(h)} \longleftrightarrow \mathbf{b}^{(k)}.$$

2. **Moltiplicazione di una riga per uno scalare non nullo:** per ogni $h \in \{1, \dots, m\}$ e per ogni $\lambda \in K \setminus \{0\}$,

$$\mathbf{b}^{(h)} \longrightarrow \lambda \mathbf{b}^{(h)}.$$

3. **Somma di una riga con un multiplo di un'altra:** per ogni $h, k \in \{1, \dots, m\}$ e per ogni $\beta \in K$,

$$\mathbf{b}^{(h)} \longrightarrow \mathbf{b}^{(h)} + \beta \mathbf{b}^{(k)}.$$

Osservazione: Invarianza dell'insieme delle soluzioni

Le operazioni elementari sulle righe di una matrice (e quindi sul sistema lineare associato) **modificano la forma del sistema**, ma **non alterano il suo insieme delle soluzioni**.

Capitolo 4

Lezione 4 - 3/10 (Teams)

4.1 Matrice a Gradini e Completamente a Gradini

Definizione (Matrice ridotta a gradini)

Una matrice si dice a gradini se ha le seguenti proprietà:

- Se una riga è nulla, tutte le righe successive sono nulle:

$$\exists h \in \{1, \dots, m\} \mid a^h = 0 \Rightarrow a^i = 0 \quad \forall i > h$$

- Il primo elemento diverso da zero di una riga non nulla, detto *pivot*, è più a sinistra del primo elemento non nullo delle righe successive:

$$\text{Se } a_{ij} \neq 0 \text{ e } a_{ih} = 0, \forall h < j, \text{ allora } a_{i+1,h} = 0, \forall h \leq j.$$

Definizione (Matrice completamente ridotta a gradini)

Una matrice si dice completamente ridotta a gradini se oltre le precedenti due proprietà verifica anche le seguenti:

- il pivot di una qualunque riga non nulla è 1;
- ogni colonna che contiene il pivot di una riga ha tutti gli altri elementi nulli.

4.2 Algoritmo di Gauss

Teorema (Algoritmo di Gauss)

Ogni matrice su un campo K può essere ridotta o completamente ridotta a gradini mediante un numero finito di operazioni elementari.

Dimostrazione (per induzione)

Procediamo per induzione sul numero di righe m :

- **Per $m = 1$:**

$$A = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$$

Se a_{1j} è il pivot, basta eseguire la seguente operazione di normalizzazione (ridurre a 1):

$$a^{(1)} \rightarrow \frac{1}{a_{1j}} a^{(1)}.$$

- **Per $m > 1$:** Dimostriamo che, se vale per $m - 1$, allora vale anche per m . Prima di tutto,

individuiamo la prima riga non nulla:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Sia

$$j = \min\{l \in \{1, \dots, n\} \mid a_{1l} \neq 0\}$$

la posizione del primo elemento non nullo nella prima riga.

Analogamente, poniamo

$$k = \min\{i \in \{1, \dots, m\} \mid a_{ij} \neq 0\},$$

cioè l'indice della prima riga (a partire dall'alto) che contiene un elemento non nullo nella colonna j .

Una volta individuati tali indici, scambiamo la riga a_k con la prima riga a_1 :

$$a_k \longleftrightarrow a_1.$$

Dopo lo scambio, otteniamo:

$$A' = \begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{1j} & \cdots & a'_{1n} \\ a'_{21} & a'_{2j} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{m1} & a'_{mj} & \cdots & a'_{mn} \end{bmatrix}.$$

Dato a'_{1j} (pivot della prima riga, diverso da 0), dobbiamo annullare tutti gli elementi sottostanti:

Per la riga 2, basta prendere $B = -\frac{a'_{2j}}{a'_{1j}}$ in modo che

$$a'_{2j} + Ba'_{1j} = 0.$$

Procediamo quindi in questo modo per tutte le righe sottostanti, ottenendo:

$$\begin{aligned} a^{(2)} &\rightarrow a^{(2)} - \frac{a'_{2j}}{a'_{1j}} a^{(1)}, \\ a^{(3)} &\rightarrow a^{(3)} - \frac{a'_{3j}}{a'_{1j}} a^{(1)}, \\ &\vdots \\ a^{(m)} &\rightarrow a^{(m)} - \frac{a'_{mj}}{a'_{1j}} a^{(1)}. \end{aligned}$$

Se si vuole la matrice completamente ridotta, bisogna normalizzare il pivot a''_{kj} di ogni riga e annullare gli elementi della stessa colonna che si trovano sopra ai pivot delle righe successive.

Osservazione: Derivata dal Teorema di Rouché-Capelli

Un sistema lineare $\Sigma : Ax = b$ è compatibile $\Leftrightarrow$ la matrice completa, una volta ridotta a gradini tramite operazioni elementari, non presenta una riga in cui tutti gli elementi della matrice dei coefficienti sono 0 ma l'elemento nella colonna dei termini noti è diverso da 0.

$$\Sigma : \begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

$$\text{Matrice completa: } C = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{array} \right]$$

Applichiamo $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$:

$$C = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Il sistema è impossibile.

4.3 Teorema di struttura

Teorema (Teorema di struttura dell'insieme delle soluzioni di un sistema lineare)

Sia $\Sigma : Ax = b$ un sistema lineare di equazioni in n incognite e sia $\Sigma_0 : Ax = 0$ il sistema lineare omogeneo associato.

Sia

$$\mathbf{S} = \{(y_1, \dots, y_n) \in K^n \mid A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = b\}$$

l'insieme delle soluzioni di Σ , e sia

$$\mathbf{S}_0 = \{(z_1, \dots, z_n) \in K^n \mid A \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = 0\}$$

l'insieme delle soluzioni di Σ_0 .

Allora, se $(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) \in \mathbf{S}$, si ha

$$\mathbf{S} = \{(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) + (z_1, \dots, z_n) \mid (z_1, \dots, z_n) \in \mathbf{S}_0\} = \mathbf{X}.$$

Dimostrazione:

Mostriamo che $\mathbf{S} \subseteq \mathbf{X}$ verificando le due inclusioni:

1. $\mathbf{S} \subseteq \mathbf{X}$: Sia $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbf{S}$. Consideriamo $(z_1, \dots, z_n) = (y_1, \dots, y_n) - (\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)$. Poiché

$$Az = A(y - \bar{y}) = Ay - A\bar{y} = b - b = 0,$$

si ha $z \in \mathbf{S}_0$. Quindi $y = \bar{y} + z \in \mathbf{X}$.

2. $\mathbf{X} \subseteq \mathbf{S}$: Sia $x \in \mathbf{X}$. Allora $x = \bar{y} + z$ con $z \in \mathbf{S}_0$. Allora

$$Ax = A(\bar{y} + z) = A\bar{y} + Az = b + 0 = b,$$

quindi $x \in \mathbf{S}$.

Da queste due inclusioni segue che $\mathbf{S} = \mathbf{X}$. $\square$

4.4 Proprietà dell'insieme S_0 come sottospazio vettoriale

Proposizione: Proprietà dell'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo

Sia $\Sigma_0 : A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ un sistema lineare omogeneo in n incognite, e sia

$$S_0 = \{ \mathbf{z} \in K^n \mid A\mathbf{z} = \mathbf{0} \}$$

l'insieme delle sue soluzioni. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. Il vettore nullo $\mathbf{0}$ appartiene a S_0 .
2. Se $\mathbf{z}, \mathbf{z}' \in S_0$, allora $\mathbf{z} + \mathbf{z}' \in S_0$.
3. Se $\alpha \in K$ e $\mathbf{z} \in S_0$, allora $\alpha\mathbf{z} \in S_0$.

In conclusione, S_0 è chiuso rispetto alla somma e alla moltiplicazione per scalari, e quindi costituisce un sottospazio vettoriale di K^n .

Definizione (Sottospazio vettoriale)

Un sottoinsieme V si dice *linearmente chiuso* se:

1. $V \neq \emptyset$;
2. $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$;
3. $\forall \alpha \in K, \mathbf{u} \in V \Rightarrow \alpha\mathbf{u} \in V$.

Poiché S_0 soddisfa esattamente queste proprietà, segue che l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo è un sottospazio vettoriale di K^n .

Proposizione: Sottoinsiemi linearmente chiusi come sottospazi vettoriali

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K e sia

$$W \subseteq V$$

un sottoinsieme non vuoto tale che:

1. $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in W \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$;
2. $\forall \alpha \in K, \mathbf{u} \in W \Rightarrow \alpha\mathbf{u} \in W$.

Allora W è un sottospazio vettoriale di V .

Osservazione: Operazioni interne

Le proprietà di chiusura rispetto alla somma e al prodotto per scalare garantiscono che le operazioni siano interne anche se considerate come:

$$+ : W \times W \rightarrow W, \quad \cdot : K \times W \rightarrow W.$$

In altre parole, la somma di due elementi di W appartiene ancora a W e il prodotto di uno scalare con un elemento di W appartiene sempre a W .

Capitolo 5

Lezione 5 - 08/10

5.1 Sistemi di Generatori

Definizione (Combinazione Lineare)

Consideriamo $(V, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale su K . Sia $(u_1, \dots, u_n)$ una n-upla di vettori di V . Un vettore u si dice **combinazione lineare** di questa n-upla se esiste una n-upla di scalari $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K$ tali che

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$$

Se vogliamo permettere che ci siano ripetizioni tra i vettori e gli scalari, allora consideriamo t-uple $(u_1, \dots, u_t) \in V^t$, $(\alpha_1, \dots, \alpha_t) \in K^t$.

Definizione (Sistema di Generatori)

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K . Un insieme $S \subseteq V$ si dice **sistema di generatori** di V se ogni vettore di V può essere espresso come combinazione lineare di un numero finito di vettori di S . In simboli:

$$V = L(S) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \mid v_i \in S, \lambda_i \in K, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

In altre parole, i vettori di S *generano* lo spazio V . Se esiste un insieme finito S che genera V , allora si dice che V è **finitamente generato**.

Definizione (Chiusura Lineare)

Dato un sottoinsieme $X \neq \emptyset$ di V , diremo **chiusura lineare** di X il sottoinsieme $L(X)$ di V , costituito da tutti e soli i vettori che sono combinazioni lineari di vettori di X . Se:

- $X = \emptyset$, porremo convenzionalmente $L(\emptyset) = 0$
- $X = x_1, \dots, x_t$ è un insieme finito, scriveremo $L(x_1, \dots, x_t)$.

Esempio: $L((2, 3), (1, 1)) = \{\alpha_1(2, 3) + \alpha_2(1, 1) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\}$.

Proposizione: Importante sulla chiusura lineare

Sia $X \subseteq V$. Allora valgono le seguenti proprietà:

- $X \subseteq L(X)$;
- $L(X)$ è un sottospazio vettoriale di V ;
- Se $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale di V tale che $X \subseteq W$, allora $L(X) \subseteq W$.

Dimostrazione del primo punto. Consideriamo un qualunque $u \in X$. Poiché $u = 1 \cdot u$, ed $1 \in K$, si ha che u è combinazione lineare di un elemento di X . Dunque $u \in L(X)$, e quindi:

$$X \subseteq L(X).$$

□

Dimostrazione del secondo punto. Dimostriamo che $L(X)$ è un sottospazio vettoriale di V .

(1) **Non vuoto.** Poiché $L(X) \supseteq X$ e $X \neq \emptyset$, segue immediatamente che $L(X) \neq \emptyset$.

(2) **Chiusura rispetto all'addizione.** Siano $u, u' \in L(X)$. Allora, per definizione di chiusura lineare, esistono $t, t' \in \mathbb{N}$, vettori $u_1, \dots, u_t, u'_1, \dots, u'_{t'} \in X$ e scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha'_1, \dots, \alpha'_{t'} \in K$ tali che:

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t, \quad u' = \alpha'_1 u'_1 + \dots + \alpha'_{t'} u'_{t'}.$$

Sommando membro a membro otteniamo:

$$u + u' = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t + \alpha'_1 u'_1 + \dots + \alpha'_{t'} u'_{t'} \in L(X),$$

poiché è ancora una combinazione lineare di vettori di X .

(3) **Chiusura rispetto alla moltiplicazione per scalare.** Sia $\lambda \in K$. Allora:

$$\lambda u = \lambda(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t) = (\lambda \alpha_1) u_1 + \dots + (\lambda \alpha_t) u_t \in L(X),$$

poiché anche in questo caso otteniamo una combinazione lineare di elementi di X .

Pertanto, $L(X)$ è chiuso rispetto alla somma e alla moltiplicazione per scalare, quindi è un sottospazio vettoriale di V . □

Dimostrazione del terzo punto. Ipotizziamo che W sia un sottospazio vettoriale di V tale che $X \subseteq W$.

Vogliamo mostrare che $L(X) \subseteq W$; cioè, per ogni $u \in L(X)$, si ha $u \in W$.

Sia dunque $u \in L(X)$. Per definizione di chiusura lineare, esistono $u_1, \dots, u_t \in X$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_t \in K$ tali che:

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t.$$

Poiché $X \subseteq W$, ciascun $u_i \in W$. Poiché W è sottospazio vettoriale, è chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalare:

$$\alpha_i u_i \in W \quad \forall i.$$

Inoltre, W è chiuso rispetto all'addizione, dunque:

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t \in W.$$

Quindi $u \in W$, e pertanto $L(X) \subseteq W$. □

5.2 Dipendenza e indipendenza lineare

Definizione (Linearmente dipendente e indipendente)

Una $n - pla(v_1, \dots, v_n)$ di vettori di V spazio vettoriale su K sarà detta **linearmente dipendente** se esiste una $n - pla(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K$ di scalari non tutti nulli, tale che

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0.$$

In caso contrario, e cioè se gli scalari sono tutti nulli

$$(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) \Rightarrow (\alpha_i = 0, \forall i \in \mathbb{N}_n)$$

la $n - pla(v_1, \dots, v_n)$ sarà detta **linearmente indipendente**.

Osservazione:

Se $X \subseteq T \subseteq V$, con X linearmente **dipendente** $\Rightarrow T$ è linearmente **dipendente**.

Se $Y \subseteq X \subseteq V$, con X linearmente **indipendente** $\Rightarrow Y$ è linearmente **indipendente**.

Teorema (Caratterizzazione della dipendenza lineare)

Un sottoinsieme X di V è **linearmente dipendente** se e solo se

$$\exists u \in X \text{ tale che } L(X) = L(X \setminus \{u\}).$$

Non consideriamo il caso $X = \emptyset$, poiché l'insieme vuoto è per definizione linearmente indipendente. Quindi supponiamo $X \neq \emptyset$.

Dimostrazione.

(Direzione “ $\Rightarrow$ ”): Sia X linearmente dipendente. Per definizione, esistono $u_1, \dots, u_t \in X$ e scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_t \in K$, non tutti nulli, tali che:

$$\vec{0} = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_t u_t.$$

Sia $\alpha_t \neq 0$. Allora esiste $\alpha_t^{-1} \in K$. Moltiplicando entrambi i membri per α_t^{-1} , otteniamo:

$$\vec{0} = (\alpha_t^{-1} \alpha_1) u_1 + \dots + (\alpha_t^{-1} \alpha_{t-1}) u_{t-1} + (\alpha_t^{-1} \alpha_t) u_t.$$

Ma $\alpha_t^{-1} \alpha_t = 1$, quindi:

$$u_t = -(\alpha_t^{-1} \alpha_1) u_1 - \dots - (\alpha_t^{-1} \alpha_{t-1}) u_{t-1}.$$

Da cui segue che u_t è combinazione lineare degli altri vettori $u_1, \dots, u_{t-1}$, cioè:

$$u_t \in L(\{u_1, \dots, u_{t-1}\}) \subseteq L(X \setminus \{u_t\}).$$

Quindi:

$$L(X) = L(X \setminus \{u_t\}),$$

perché rimuovere u_t non cambia la chiusura lineare dell'insieme. Ciò dimostra la direzione “ $\Rightarrow$ ”.

(Direzione “ $\Leftarrow$ ”): Supponiamo ora che esista $u \in X$ tale che $L(X) = L(X \setminus \{u\})$. Allora $u \in L(X \setminus \{u\})$, cioè:

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t,$$

con $u_1, \dots, u_t \in X \setminus \{u\}$ e $\alpha_i \in K$.

Portando tutto a primo membro otteniamo:

$$\vec{0} = (-1)u + \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t.$$

Questa è una combinazione lineare non banale (poiché il coefficiente di u è $-1 \neq 0$) che dà il vettore nullo. Quindi X è linearmente dipendente.

□

Capitolo 6

Lezione 6 - 10/10

6.1 Basi

Definizione (Base)

Una **base** B di uno spazio vettoriale V è un insieme di vettori tale che:

- B è **linearmente indipendente**;
- B è un **sistema di generatori** di V , cioè $L(B) = V$.

In altre parole, ogni vettore di V può essere scritto in modo unico come combinazione lineare dei vettori di B .

6.1.1 Teorema di estrazione di una base

Teorema (di estrazione di una base)

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato sul campo K . Sia $S = \{v_1, \dots, v_t\}$ un sistema finito di generatori di V . Allora esiste una base B di V tale che $B \subseteq S$.

Dimostrazione. Consideriamo due casi.

Caso 1: $S = \emptyset$. In questo caso, $V = L(\emptyset) = \{\vec{0}\}$, ossia V è lo spazio vettoriale nullo. La base di V è per definizione l'insieme vuoto stesso, quindi $B = S = \emptyset$.

Caso 2: $S \neq \emptyset$. Verifichiamo se S è linearmente indipendente.

- Se S è linearmente indipendente, allora essendo anche un sistema di generatori, è già una base di V ; dunque $B = S$.
- Se invece S è linearmente dipendente, allora per il teorema della dipendenza lineare esiste un vettore $u \in S$ tale che

$$L(S) = L(S \setminus \{u\}).$$

Ciò significa che possiamo eliminare u dall'insieme dei generatori senza modificare lo spazio generato. Poniamo quindi $S_1 = S \setminus \{u\}$.

Ora applichiamo lo stesso ragionamento a S_1 :

- se S_1 è linearmente indipendente, allora $B = S_1$ è una base di V ;
- se S_1 è ancora dipendente, allora esiste $v \in S_1$ tale che $L(S_1) = L(S_1 \setminus \{v\})$, e possiamo quindi togliere anche v .

Procedendo in questo modo, ad ogni passo eliminiamo un vettore “superfluo” mantenendo lo stesso spazio generato. Poiché S è finito, dopo un numero finito di eliminazioni otterremo un sottoinsieme $B \subseteq S$ che:

$$L(B) = V \quad \text{e} \quad B \text{ è linearmente indipendente.}$$

Pertanto B è una base di V contenuta in S . □

Proposizione:

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K , e sia $S = \{u_1, \dots, u_h\} \subseteq V$ un insieme linearmente indipendente. Se $u \in V \setminus L(S)$, allora anche l'insieme $S \cup \{u\}$ è linearmente indipendente.

Dimostrazione (per assurdo). Procediamo per assurdo. Supponiamo che $S \cup \{u\}$ non sia linearmente indipendente. Allora, per definizione, esistono scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_h, \beta \in K$, non tutti nulli, tali che:

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_h u_h + \beta u = \vec{0}.$$

Caso 1: $\beta = 0$. Allora la relazione diventa:

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_h u_h = \vec{0}.$$

Ma S è linearmente indipendente per ipotesi, quindi necessariamente:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_h = 0.$$

Ciò implica che tutti gli scalari sono nulli, il che contraddice l'assunzione iniziale ("non tutti nulli"). Quindi $\beta \neq 0$.

Caso 2: $\beta \neq 0$. Possiamo allora isolare u :

$$\beta u = -(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_h u_h).$$

Moltiplicando ambo i membri per β^{-1} (che esiste, poiché $\beta \neq 0$):

$$u = (-\beta^{-1}\alpha_1)u_1 + (-\beta^{-1}\alpha_2)u_2 + \dots + (-\beta^{-1}\alpha_h)u_h.$$

Ma questo significa precisamente che $u \in L(S)$.

Tuttavia, per ipotesi, $u \notin L(S)$. Questa è una contraddizione.

Pertanto, la nostra ipotesi iniziale è falsa, e $S \cup \{u\}$ deve essere linearmente indipendente.

$$S \cup \{u\} \text{ è linearmente indipendente.}$$

□

Teorema (Lemma di Steinitz)

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato su un campo K e sia $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ un suo sistema di generatori finito, cioè $L(S) = V$.

Sia $X = \{v_1, \dots, v_m\}$ un insieme di vettori di V .

Se $m = |X| > n = |S|$, allora X è linearmente dipendente.

Proposizione: Corollario

Utilizzando le stesse notazioni del Lemma di Steinitz, se X è linearmente indipendente, allora:

$$|X| \leq |S|.$$

Dimostrazione

Iniziamo con un caso banale: se il vettore nullo $\mathbf{0} \in X$, allora X è linearmente dipendente (poiché contiene il sottoinsieme $\{\mathbf{0}\}$ che è L.D.), e la tesi è dimostrata.

Supponiamo quindi $\mathbf{0} \notin X$. Ciò implica che tutti i vettori $v_i \in X$ sono non nulli.

Passo 1: Scambio di v_1

Consideriamo il primo vettore $v_1 \in X$. Poiché $v_1 \in V$ e $L(S) = V$, v_1 è combinazione lineare dei vettori di S :

$$v_1 = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_n u_n$$

Poiché abbiamo supposto $v_1 \neq \mathbf{0}$, almeno uno dei coefficienti $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ deve essere non nullo. A meno di riordinare i vettori u_i (operazione che non altera $L(S)$), possiamo supporre che $\lambda_1 \neq 0$. Esistendo $\lambda_1^{-1} \in K$, possiamo isolare u_1 :

$$\lambda_1 u_1 = v_1 - \lambda_2 u_2 - \cdots - \lambda_n u_n$$

$$u_1 = \lambda_1^{-1} v_1 - (\lambda_1^{-1} \lambda_2) u_2 - \cdots - (\lambda_1^{-1} \lambda_n) u_n$$

Questa equazione mostra che $u_1 \in L(\{v_1, u_2, \dots, u_n\})$.

Definiamo il nuovo insieme $S_1 = \{v_1, u_2, \dots, u_n\}$. Dimostriamo che $L(S_1) = V$. Osserviamo che:

- $u_1 \in L(S_1)$ (come appena mostrato).
- $u_2, \dots, u_n \in S_1 \subseteq L(S_1)$ (banalmente).

Dato che tutti i generatori originali $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ appartengono a $L(S_1)$, si ha che $S \subseteq L(S_1)$. Questo implica $V = L(S) \subseteq L(S_1) \subseteq V \Rightarrow L(S_1) = V$. Abbiamo quindi sostituito u_1 con v_1 ottenendo un nuovo sistema di n generatori.

Passo 2: Scambio di v_2

Consideriamo il secondo vettore $v_2 \in X$. Per la nostra ipotesi, $v_2 \neq \mathbf{0}$. Poiché $v_2 \in V$ e (dal passo precedente) $V = L(S_1)$, possiamo scrivere v_2 come combinazione lineare dei vettori di S_1 :

$$v_2 = \beta_1 v_1 + \beta_2 u_2 + \beta_3 u_3 + \cdots + \beta_n u_n$$

Ora abbiamo due possibilità:

Caso A: Tutti i coefficienti dei vettori u_i sono nulli. Cioè, $\beta_2 = \beta_3 = \cdots = \beta_n = 0$. L'equazione diventa:

$$v_2 = \beta_1 v_1 \Rightarrow \beta_1 v_1 - v_2 = \mathbf{0}$$

Poiché $v_2 \neq \mathbf{0}$, questa è una combinazione lineare non banale (il coefficiente di v_2 è -1) di vettori di X . Dunque $\{v_1, v_2\} \subseteq X$ è linearmente dipendente, e di conseguenza X è linearmente dipendente. In questo caso, la tesi è dimostrata.

Caso B: Almeno uno dei coefficienti $\beta_2, \dots, \beta_n$ è non nullo. A meno di riordinare i restanti u_i , supponiamo $\beta_2 \neq 0$. Possiamo allora isolare u_2 :

$$\beta_2 u_2 = v_2 - \beta_1 v_1 - \beta_3 u_3 - \cdots - \beta_n u_n$$

$$u_2 = (-\beta_2^{-1} \beta_1) v_1 + \beta_2^{-1} v_2 - (\beta_2^{-1} \beta_3) u_3 - \cdots - (\beta_2^{-1} \beta_n) u_n$$

Questo mostra che $u_2 \in L(\{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\})$.

Definiamo $S_2 = \{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\}$. Come prima, dimostriamo che $L(S_2) = V$ osservando che $S_1 \subseteq L(S_2)$:

- $v_1 \in S_2 \subseteq L(S_2)$.
- $u_2 \in L(S_2)$ (come appena mostrato).
- $u_3, \dots, u_n \in S_2 \subseteq L(S_2)$.

Dunque $V = L(S_1) \subseteq L(S_2)$, e concludiamo $L(S_2) = V$.

Iterazione e Conclusione

Si ripete questo procedimento ("così via"). Ad ogni passo $k \leq n$, si considera v_k e lo si scrive come C.L. dei generatori ottenuti al passo $k-1$: $S_{k-1} = \{v_1, \dots, v_{k-1}, u_k, \dots, u_n\}$.

O si incontra il **Caso A** (tutti i coefficienti dei restanti u_i sono nulli), il che dimostra che $\{v_1, \dots, v_k\}$ è L.D. e quindi X è L.D. (e la dimostrazione termina).

Dimostrazione

Oppure si procede con il **Caso B** (almeno un coefficiente di un u_i è non nullo), e si "scambia" quel vettore (diciamo u_k) con v_k , ottenendo un nuovo sistema di generatori $S_k = \{v_1, \dots, v_k, u_{k+1}, \dots, u_n\}$. Se non si incontra mai il Caso A, dopo n passi avremo sostituito tutti i vettori u_i , ottenendo il sistema di generatori:

$$S_n = \{v_1, \dots, v_n\}$$

(che hai chiamato S'').

Ora usiamo l'ipotesi fondamentale: $m > n$. Questo significa che in X esiste almeno un altro vettore, v_{n+1} . Poiché $v_{n+1} \in V$ e $V = L(S_n) = L(\{v_1, \dots, v_n\})$, v_{n+1} deve essere combinazione lineare di S_n :

$$v_{n+1} = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \dots + \gamma_n v_n$$

Riscrivendo l'equazione, otteniamo:

$$\gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \dots + \gamma_n v_n - v_{n+1} = \mathbf{0}$$

Questa è una combinazione lineare non banale (il coefficiente di v_{n+1} è $-1 \neq 0$) dei vettori $\{v_1, \dots, v_{n+1}\} \subseteq X$.

Pertanto, X è linearmente dipendente. In ogni possibile scenario, la tesi è dimostrata.

6.2 Teorema di equipotenza della base

Teorema (Teorema di equipotenza della base)

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato su un campo K . Allora tutte le basi di V hanno la stessa cardinalità.

Questa cardinalità comune alle basi di V viene detta **dimensione** di V e si indica con:

$$\dim V.$$

Dimostrazione

Poiché V è finitamente generato, esiste un sistema di generatori finito $S \subseteq V$. Sia B una base di V estratta da S . Allora:

$$|B| = n < +\infty.$$

Sia B' un'altra base di V .

1. Dimostriamo che $|B'| = h < +\infty$. Se così non fosse, esisterebbe un insieme $X \subseteq B'$ tale che $|X| = n+1 > |B|$, ma questo è impossibile per il **Lemma di Steinitz**, poiché un insieme di vettori con più elementi di un sistema di generatori sarebbe linearmente dipendente.

2. Dimostriamo ora che $|B'| = |B|$.

- Poiché B' è linearmente indipendente in V e B è un sistema di generatori di V , per il Corollario del Lemma di Steinitz si ha:

$$|B'| \leq |B|.$$

- Analogamente, poiché B è linearmente indipendente in V e B' è un sistema di generatori di V , si ha:

$$|B| \leq |B'|.$$

Dalle due disuguaglianze segue che:

$$|B| = |B'|.$$

Quindi tutte le basi di V hanno la stessa cardinalità, che chiamiamo **dimensione** di V :

$$\dim V = |B|.$$

□

Proposizione: Caratterizzazione dei sistemi di generatori di dimensione n

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K , con $\dim V = n$. Sia $S = \{u_1, \dots, u_n\} \subseteq V$ un insieme di n vettori.

Allora valgono le seguenti equivalenze:

$$S \text{ è un sistema di generatori di } V \iff S \text{ è linearmente indipendente.}$$

Dimostrazione

($\Rightarrow$) Supponiamo per assurdo che S sia linearmente dipendente. Allora esiste $v \in S$ tale che:

$$L(S) = L(S \setminus \{v\}).$$

Ma in tal caso $L(S \setminus \{v\})$ genererebbe ancora tutto V , pur avendo $|S \setminus \{v\}| = n - 1 < n = \dim V$, il che è impossibile per la definizione stessa di dimensione (nessun insieme di meno di n vettori può generare V). Dunque S deve essere linearmente indipendente.

($\Leftarrow$) Supponiamo ora per assurdo che S sia linearmente indipendente ma non generi V , cioè:

$$L(S) \subsetneq V.$$

Allora esiste $u \in V \setminus L(S)$. Consideriamo quindi l'insieme $S' = S \cup \{u\}$.

Poiché $u \notin L(S)$, il nuovo insieme S' risulta ancora linearmente indipendente. Tuttavia:

$$|S'| = n + 1,$$

il che è impossibile per il **Lemma di Steinitz**, che vieta l'esistenza di un insieme linearmente indipendente con più di n elementi in uno spazio vettoriale di dimensione n .

Quindi $L(S) = V$ e S è un sistema di generatori. $\square$

Teorema (Di completamento in una base)

Sia V uno spazio vettoriale su K con $\dim V = n$. Sia $X = \{v_1, \dots, v_t\} \subseteq V$ un insieme linearmente indipendente. Allora esiste un sottoinsieme $Y = \{v_{t+1}, \dots, v_n\} \subseteq V$ tale che $B := X \cup Y$ è una base di V .

Dimostrazione. Se $t = n$, allora X ha già n vettori linearmente indipendenti. Poiché la dimensione di V è n , ogni insieme di n vettori linearmente indipendenti è una base di V . Quindi in questo caso possiamo prendere $Y = \emptyset$ e $B = X$.

Supponiamo ora $t < n$. Allora X non può generare tutto V , cioè $L(X) \neq V$. Infatti se $L(X) = V$ avremmo che X è un sistema di generatori con t elementi e quindi $\dim V \leq t$, contraddicendo $t < n$. Quindi esiste almeno un vettore $v_{t+1} \in V \setminus L(X)$.

Per la proposizione già vista, poiché $v_{t+1} \notin L(X)$, l'insieme

$$X_1 := X \cup \{v_{t+1}\} = \{v_1, \dots, v_t, v_{t+1}\}$$

è ancora linearmente indipendente. Se $|X_1| = t + 1 = n$ abbiamo finito: $B = X_1$ è una base. Altrimenti $t + 1 < n$ e ripetiamo lo stesso ragionamento.

In generale, costruiamo per induzione una successione di insiemi linearmente indipendenti

$$X = X_0 \subset X_1 \subset X_2 \subset \dots$$

in cui $X_{k+1} = X_k \cup \{v_{t+k+1}\}$ con $v_{t+k+1} \in V \setminus L(X_k)$. Ad ogni passo il numero di vettori aumenta di 1. Poiché $\dim V = n$, non è possibile continuare indefinitamente: non esistono insiemi di più di n vettori linearmente indipendenti in V . Quindi il processo termina dopo al più $n - t$ passaggi, producendo un insieme

$$B = X_m = \{v_1, \dots, v_t, v_{t+1}, \dots, v_{t+m}\}$$

con $|B| = n$ e B linearmente indipendente.

Un insieme di n vettori linearmente indipendenti in uno spazio di dimensione n genera V , dunque $L(B) = V$ e quindi B è una base di V . Ponendo $Y = \{v_{t+1}, \dots, v_n\}$ otteniamo la conclusione voluta. $\square$

Osservazioni:

- Sia V uno spazio vettoriale su K e siano $S, T \subseteq V$. Allora

$$L(S) = L(T) \iff S \subseteq L(T) \text{ e } T \subseteq L(S).$$

($\Rightarrow$) Poiché $S \subseteq L(S)$ e $L(S) = L(T)$, si ha $S \subseteq L(T)$; analogamente $T \subseteq L(S)$.

($\Leftarrow$) Se $S \subseteq L(T)$ allora $L(S) \subseteq L(T)$ (perché $L(T)$ è un sottospazio che contiene S); analogamente $T \subseteq L(S)$ implica $L(T) \subseteq L(S)$. Da entrambe le inclusioni segue $L(S) = L(T)$.

Da questa osservazione segue la seguente proprietà sulle righe di matrici: se $A \in M_{m,n}(K)$ e B è ottenuta da A mediante un numero finito di operazioni elementari, allora indicando con $a^1, \dots, a^{\bar{m}}$ le righe di A e con $b^1, \dots, b^{\bar{m}}$ le righe di B , si ha

$$\{b^1, \dots, b^{\bar{m}}\} \subseteq L(a^1, \dots, a^{\bar{m}}) \quad \text{e} \quad \{a^1, \dots, a^{\bar{m}}\} \subseteq L(b^1, \dots, b^{\bar{m}}),$$

da cui segue

$$L(b^1, \dots, b^{\bar{m}}) = L(a^1, \dots, a^{\bar{m}}).$$

- Per vettori $u, v, w \in V$ (con V uno spazio vettoriale) valgono le seguenti equivalenze geometriche:
 - u, v sono linearmente dipendenti $\iff u$ e v sono paralleli (cioè uno è multiplo scalare dell'altro);
 - u, v, w sono linearmente dipendenti $\iff u, v, w$ sono complanari (cioè esiste un piano che contiene i tre vettori).

Definizione (Rango di una matrice)

$A \in M_{mn}(K)$. Il rango di A è la dimensione dello spazio vettoriale generato dalle sue righe e dallo spazio vettoriale generato dalle sue colonne.

Capitolo 7

Lezione 7 - 15/10

7.1 Lemma di Steinitz

Teorema (Lemma di Steinitz (o dello Scambio))

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato su un campo K . Sia $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ un sistema di generatori per V , la cui cardinalità è $|S| = n$. Sia $X = \{v_1, \dots, v_m\}$ un sottoinsieme di vettori di V , la cui cardinalità è $|X| = m$.

Se $m > n$, allora l'insieme X è linearmente dipendente.

Proposizione: Corollario (dalla contronominale)

Nelle stesse ipotesi del Lemma di Steinitz, se l'insieme $X = \{v_1, \dots, v_m\}$ è linearmente indipendente, allora $m \leq n$.

Attenzione: Non vale il viceversa di questo corollario. Un insieme X con $m \leq n$ vettori non è automaticamente linearmente indipendente.

(Ad esempio, in $\mathbb{R}^2$ generato da $S = \{(1, 0), (0, 1)\}$, abbiamo $n = 2$. L'insieme $X = \{(1, 1), (2, 2)\}$ ha $m = 2$, quindi $m \leq n$, ma X è palesemente linearmente dipendente.)

Dimostrazione

Iniziamo con un caso banale: se il vettore nullo $\mathbf{0} \in X$, allora X è linearmente dipendente (poiché contiene il sottoinsieme $\{\mathbf{0}\}$ che è L.D.), e la tesi è dimostrata.

Supponiamo quindi $\mathbf{0} \notin X$. Ciò implica che tutti i vettori $v_i \in X$ sono non nulli.

Passo 1: Scambio di v_1

Consideriamo il primo vettore $v_1 \in X$. Poiché $v_1 \in V$ e $L(S) = V$, v_1 è combinazione lineare dei vettori di S :

$$v_1 = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n$$

Poiché abbiamo supposto $v_1 \neq \mathbf{0}$, almeno uno dei coefficienti $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ deve essere non nullo. A meno di riordinare i vettori u_i (operazione che non altera $L(S)$), possiamo supporre che $\lambda_1 \neq 0$.

Esistendo $\lambda_1^{-1} \in K$, possiamo isolare u_1 :

$$\lambda_1 u_1 = v_1 - \lambda_2 u_2 - \dots - \lambda_n u_n$$

$$u_1 = \lambda_1^{-1} v_1 - (\lambda_1^{-1} \lambda_2) u_2 - \dots - (\lambda_1^{-1} \lambda_n) u_n$$

Questa equazione mostra che $u_1 \in L(\{v_1, u_2, \dots, u_n\})$.

Definiamo il nuovo insieme $S_1 = \{v_1, u_2, \dots, u_n\}$. Dimostriamo che $L(S_1) = V$. Osserviamo che:

- $u_1 \in L(S_1)$ (come appena mostrato).
- $u_2, \dots, u_n \in S_1 \subseteq L(S_1)$ (banalmente).

Dato che tutti i generatori originali $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ appartengono a $L(S_1)$, si ha che $S \subseteq L(S_1)$. Questo implica $V = L(S) \subseteq L(L(S_1)) = L(S_1)$. Poiché banalmente $L(S_1) \subseteq V$, concludiamo che $L(S_1) = V$. Abbiamo quindi sostituito u_1 con v_1 ottenendo un nuovo sistema di n generatori.

Dimostrazione

Passo 2: Scambio di v_2

Consideriamo il secondo vettore $v_2 \in X$. Per la nostra ipotesi, $v_2 \neq \mathbf{0}$. Poiché $v_2 \in V$ e (dal passo precedente) $V = L(S_1)$, possiamo scrivere v_2 come combinazione lineare dei vettori di S_1 :

$$v_2 = \beta_1 v_1 + \beta_2 u_2 + \beta_3 u_3 + \cdots + \beta_n u_n$$

Ora abbiamo due possibilità:

Caso A: Tutti i coefficienti dei vettori u_i sono nulli. Cioè, $\beta_2 = \beta_3 = \cdots = \beta_n = 0$. L'equazione diventa:

$$v_2 = \beta_1 v_1 \Rightarrow \beta_1 v_1 - v_2 = \mathbf{0}$$

Poiché $v_2 \neq \mathbf{0}$, questa è una combinazione lineare non banale (il coefficiente di v_2 è -1) di vettori di X . Dunque $\{v_1, v_2\} \subseteq X$ è linearmente dipendente, e di conseguenza X è linearmente dipendente. In questo caso, la tesi è dimostrata.

Caso B: Almeno uno dei coefficienti $\beta_2, \dots, \beta_n$ è non nullo. A meno di riordinare i restanti u_i , supponiamo $\beta_2 \neq 0$. Possiamo allora isolare u_2 :

$$\beta_2 u_2 = v_2 - \beta_1 v_1 - \beta_3 u_3 - \cdots - \beta_n u_n$$

$$u_2 = (-\beta_2^{-1} \beta_1) v_1 + \beta_2^{-1} v_2 - (\beta_2^{-1} \beta_3) u_3 - \cdots - (\beta_2^{-1} \beta_n) u_n$$

Questo mostra che $u_2 \in L(\{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\})$.

Definiamo $S_2 = \{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\}$. Come prima, dimostriamo che $L(S_2) = V$ osservando che $S_1 \subseteq L(S_2)$:

- $v_1 \in S_2 \subseteq L(S_2)$.
- $u_2 \in L(S_2)$ (come appena mostrato).
- $u_3, \dots, u_n \in S_2 \subseteq L(S_2)$.

Dunque $V = L(S_1) \subseteq L(S_2)$, e concludiamo $L(S_2) = V$.

Iterazione e Conclusione

Si ripete questo procedimento ("così via"). Ad ogni passo $k \leq n$, si considera v_k e lo si scrive come C.L. dei generatori ottenuti al passo $k-1$: $S_{k-1} = \{v_1, \dots, v_{k-1}, u_k, \dots, u_n\}$.

O si incontra il **Caso A** (tutti i coefficienti dei restanti u_i sono nulli), il che dimostra che $\{v_1, \dots, v_k\}$ è L.D. e quindi X è L.D. (e la dimostrazione termina). Oppure si procede con il **Caso B** (almeno un coefficiente di un u_i è non nullo), e si "scambia" quel vettore (diciamo u_k) con v_k , ottenendo un nuovo sistema di generatori $S_k = \{v_1, \dots, v_k, u_{k+1}, \dots, u_n\}$.

Se non si incontra mai il Caso A, dopo n passi avremo sostituito tutti i vettori u_i , ottenendo il sistema di generatori:

$$S_n = \{v_1, \dots, v_n\}$$

(che hai chiamato S'').

Ora usiamo l'ipotesi fondamentale: $m > n$. Questo significa che in X esiste almeno un altro vettore, v_{n+1} . Poiché $v_{n+1} \in V$ e $V = L(S_n) = L(\{v_1, \dots, v_n\})$, v_{n+1} deve essere combinazione lineare di S_n :

$$v_{n+1} = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \cdots + \gamma_n v_n$$

Riscrivendo l'equazione, otteniamo:

$$\gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \cdots + \gamma_n v_n - v_{n+1} = \mathbf{0}$$

Questa è una combinazione lineare non banale (il coefficiente di v_{n+1} è $-1 \neq 0$) dei vettori $\{v_1, \dots, v_{n+1}\} \subseteq X$.

Pertanto, X è linearmente dipendente. In ogni possibile scenario, la tesi è dimostrata.

7.2 Isomorfismo delle Coordinate

Proposizione: Caratterizzazione delle Basi e Isomorfismo delle Coordinate

Sia V uno spazio vettoriale sul campo K con $\dim(V) = n$ (per $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$).

Un'n-upla ordinata $\mathcal{B} = (l_1, \dots, l_n) \in V^n$ è una **base** di $V \iff$ per ogni vettore $u \in V$, esiste ed è unica un'n-upla di scalari $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$ tale che:

$$u = \alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2 + \dots + \alpha_n l_n$$

L'n-upla $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ è detta **n-upla delle componenti** (o coordinate) di u rispetto alla base $\mathcal{B}$.

L'applicazione $\phi_{\mathcal{B}}$ che associa ad ogni vettore le sue componenti:

$$\phi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow K^n$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(u) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \quad (\text{dove } u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i)$$

è un isomorfismo di spazi vettoriali, detto **isomorfismo delle coordinate** associato alla base $\mathcal{B}$.

Esempio

Sia $V = \mathbb{R}^2$ come spazio vettoriale sul campo $K = \mathbb{R}$. La dimensione è $\dim(V) = n = 2$. Scegliamo una base ordinata (non canonica) $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{B} = (l_1, l_2) = ((1, 1), (1, 0))$$

Ora prendiamo un vettore arbitrario $u \in V$, ad esempio $u = (3, 4)$.

Secondo la proposizione, devono esistere e essere unici due scalari $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ tali che:

$$u = \alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2$$

$$(3, 4) = \alpha_1(1, 1) + \alpha_2(1, 0)$$

Sviluppando i calcoli:

$$(3, 4) = (\alpha_1, \alpha_1) + (\alpha_2, 0)$$

$$(3, 4) = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1)$$

Questo ci porta a un sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 3 \\ \alpha_1 = 4 \end{cases}$$

Risolvendo (per sostituzione) troviamo immediatamente:

$$\alpha_1 = 4$$

$$4 + \alpha_2 = 3 \implies \alpha_2 = -1$$

L'unica n-upla (in questo caso, coppia) di componenti è quindi $(4, -1)$. Questo dimostra che $u = 4l_1 - 1l_2$.

L'isomorfismo delle coordinate $\phi_{\mathcal{B}}$ associa quindi il vettore u a questa coppia:

$$\phi_{\mathcal{B}}(u) = \phi_{\mathcal{B}}((3, 4)) = (4, -1) \in \mathbb{R}^2$$

Dimostrazione

Sia $\mathcal{B} = (l_1, \dots, l_n)$ una n-upla ordinata di vettori di V . Dobbiamo dimostrare la doppia implicazione:

$$\mathcal{B} \text{ è una base} \iff \forall u \in V, \exists! (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$$

(Direzione “ $\Leftarrow$ ”) (Ipotesi: Esistenza e Unicità delle coordinate $\implies$ Tesi: $\mathcal{B}$ è una base)

Per ipotesi, per ogni $u \in V$ esiste ed è unica un’ n-upla $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$ tale che $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i$. Dobbiamo dimostrare che $\mathcal{B}$ è una base, cioè che è un sistema di generatori e che è linearmente indipendente.

- **$\mathcal{B}$ è un sistema di generatori:** L’ipotesi “esiste ed è unica” ($\exists!$) implica in particolare l’“esistenza” ($\exists$). Il fatto che per ogni $u \in V$ esista una n-upla tale che $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i$ è la definizione stessa di sistema di generatori. Quindi $L(\mathcal{B}) = V$.
- **$\mathcal{B}$ è linearmente indipendente:** Dobbiamo dimostrare che l’unica combinazione lineare dei vettori di $\mathcal{B}$ che dà il vettore nullo è quella con tutti i coefficienti nulli. L’ipotesi di unicità vale per qualsiasi vettore, quindi anche per il vettore nullo $\mathbf{0} \in V$. Sappiamo che una combinazione per il vettore nullo esiste sempre:

$$\mathbf{0} = 0l_1 + 0l_2 + \dots + 0l_n$$

Questa corrisponde all’ n-upla $(0, 0, \dots, 0)$. Per l’ipotesi di unicità, questa deve essere l’unica n-upla possibile. Pertanto, l’unica soluzione dell’equazione $\sum_{i=1}^n \alpha_i l_i = \mathbf{0}$ è $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Questa è la definizione di lineare indipendenza.

Avendo dimostrato che $\mathcal{B}$ è sia un sistema di generatori sia linearmente indipendente, $\mathcal{B}$ è una base.

(Direzione “ $\Rightarrow$ ”) (Ipotesi: $\mathcal{B}$ è una base $\implies$ Tesi: Esistenza e Unicità delle coordinate)

Per ipotesi, $\mathcal{B}$ è una base di V . Dobbiamo dimostrare due cose per ogni $u \in V$:

- **Esistenza ($\exists$):** Poiché $\mathcal{B}$ è una base, è (per definizione) un sistema di generatori. La definizione di sistema di generatori è che per ogni $u \in V$, esiste almeno una n-upla $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ tale che $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i$.
- **Unicità ($\exists!$):** Dobbiamo dimostrare che tale n-upla è unica. Supponiamo (per assurdo) che esistano due n-uple distinte, $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ e $(\beta_1, \dots, \beta_n)$, che generano lo stesso vettore u :

$$\begin{aligned} u &= \alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2 + \dots + \alpha_n l_n \\ u &= \beta_1 l_1 + \beta_2 l_2 + \dots + \beta_n l_n \end{aligned}$$

Sottraiamo la seconda equazione dalla prima:

$$u - u = (\alpha_1 l_1 + \dots + \alpha_n l_n) - (\beta_1 l_1 + \dots + \beta_n l_n)$$

Raccogliendo i termini comuni:

$$\mathbf{0} = (\alpha_1 - \beta_1)l_1 + (\alpha_2 - \beta_2)l_2 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)l_n$$

Ora usiamo la seconda parte della nostra ipotesi: $\mathcal{B}$, essendo una base, è linearmente indipendente. Per la definizione di lineare indipendenza, l’unica combinazione lineare che dà $\mathbf{0}$ è quella con tutti i coefficienti nulli. Di conseguenza:

$$(\alpha_1 - \beta_1) = 0, \quad (\alpha_2 - \beta_2) = 0, \quad \dots, \quad (\alpha_n - \beta_n) = 0$$

Questo implica:

$$\alpha_1 = \beta_1, \quad \alpha_2 = \beta_2, \quad \dots, \quad \alpha_n = \beta_n$$

Le due n-uple non erano distinte, ma sono identiche. Questo dimostra l’unicità della n-upla delle componenti.

7.3 Proprietà dell'Isomorfismo delle Coordinate

Osservazione: Proprietà di $\phi_{\mathcal{B}}$

Sia $\mathcal{B} = (l_1, \dots, l_n)$ una base di V e sia $\phi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow K^n$ l'isomorfismo delle coordinate associato. Dimostriamo che $\phi_{\mathcal{B}}$ è effettivamente un isomorfismo, verificando che sia lineare, iniettiva e suriettiva. Siano $u, v \in V$ e $\lambda \in K$. Grazie all'unicità delle coordinate, possiamo scrivere:

$$u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i \implies \phi_{\mathcal{B}}(u) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

$$v = \sum_{i=1}^n \beta_i l_i \implies \phi_{\mathcal{B}}(v) = (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

- **$\phi_{\mathcal{B}}$ è lineare (conserva la somma e il prodotto esterno):**

Verifichiamo separatamente le due proprietà della linearità.

1. **Conserva la somma:** Dobbiamo dimostrare $\phi_{\mathcal{B}}(u + v) = \phi_{\mathcal{B}}(u) + \phi_{\mathcal{B}}(v)$. Calcoliamo $u + v$:

$$u + v = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i l_i \right) + \left(\sum_{i=1}^n \beta_i l_i \right) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) l_i$$

Applicando $\phi_{\mathcal{B}}$ a $u + v$, per definizione, otteniamo le sue componenti:

$$\phi_{\mathcal{B}}(u + v) = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n)$$

Ma questo è esattamente il risultato della somma (definita componente per componente) in K^n :

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \dots, \beta_n) = \phi_{\mathcal{B}}(u) + \phi_{\mathcal{B}}(v)$$

Quindi $\phi_{\mathcal{B}}(u + v) = \phi_{\mathcal{B}}(u) + \phi_{\mathcal{B}}(v)$.

2. **Conserva il prodotto esterno:** Dobbiamo dimostrare $\phi_{\mathcal{B}}(\lambda u) = \lambda \phi_{\mathcal{B}}(u)$. Calcoliamo λu :

$$\lambda u = \lambda \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i l_i \right) = \sum_{i=1}^n (\lambda \alpha_i) l_i$$

Applicando $\phi_{\mathcal{B}}$ a λu , otteniamo le sue componenti:

$$\phi_{\mathcal{B}}(\lambda u) = (\lambda \alpha_1, \dots, \lambda \alpha_n)$$

Questo è esattamente il risultato del prodotto per scalare (definito componente per componente) in K^n :

$$\lambda(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \lambda \phi_{\mathcal{B}}(u)$$

Quindi $\phi_{\mathcal{B}}(\lambda u) = \lambda \phi_{\mathcal{B}}(u)$.

Avendo dimostrato entrambe le proprietà, $\phi_{\mathcal{B}}$ è un'applicazione lineare.

- **$\phi_{\mathcal{B}}$ è iniettiva:** Dobbiamo dimostrare che $\phi_{\mathcal{B}}(u) = \phi_{\mathcal{B}}(v) \implies u = v$.

Supponiamo $\phi_{\mathcal{B}}(u) = \phi_{\mathcal{B}}(v)$. Per definizione di $\phi_{\mathcal{B}}$, questo significa che le n-uple delle loro componenti sono uguali:

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

L'uguaglianza in K^n implica l'uguaglianza componente per componente, cioè $\alpha_i = \beta_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$.

Ma allora, riconsiderando i vettori u e v , essi sono la stessa combinazione lineare:

$$u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i = \sum_{i=1}^n \beta_i l_i = v$$

Abbiamo dimostrato $\phi_{\mathcal{B}}(u) = \phi_{\mathcal{B}}(v) \implies u = v$. L'applicazione è iniettiva.

Osservazione: Proprietà di ϕ_B

- ϕ_B è **suriettiva**: La Tesi è: $\forall y \in K^n, \exists v \in V$ tale che $\phi_B(v) = y$.

Sia $y = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ una qualsiasi n-upla in K^n . Basta prendere il vettore $v \in V$ costruito usando proprio questa n-upla come sue componenti:

$$v = \beta_1 l_1 + \beta_2 l_2 + \dots + \beta_n l_n$$

Questo v appartiene a V (essendo C.L. di vettori di V). Per la definizione stessa di ϕ_B , l'immagine di v è proprio l'n-upla delle sue componenti:

$$\phi_B(v) = (\beta_1, \dots, \beta_n) = y$$

Abbiamo trovato un vettore v la cui immagine è y . L'applicazione è suriettiva.

Avendo dimostrato che ϕ_B è lineare, iniettiva e suriettiva, ϕ_B è un **isomorfismo**.

7.4 Relazioni tra dimensioni di spazio vettoriale e di un suo sottospazio

Proposizione: Relazioni tra la dimensione di uno spazio vettoriale e quella di un suo sottospazio

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K , con $\dim V = n$. Sia $W \subseteq V$ un sottospazio vettoriale. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. $\dim W = 0 \iff W = \{\bar{0}\}$;
2. $\dim W \leq \dim V$;
3. $\dim W = \dim V \iff W = V$.

Dimostrazione

1) $\dim W = 0 \iff W = \{\bar{0}\}$

Infatti, $\dim W = 0$ significa che l'unica base di W è l'insieme vuoto $\emptyset$. Per definizione di sottospazio generato (span), lo span dell'insieme vuoto è il sottospazio contenente solo il vettore nullo:

$$W = L(\emptyset) = \{\bar{0}\}.$$

Viceversa, se $W = \{\bar{0}\}$, l'unico sottoinsieme linearmente indipendente che si può estrarre da W è l'insieme vuoto (poiché ogni insieme non vuoto conterrebbe $\bar{0}$ e sarebbe L.D.). Quindi la base è $\emptyset$ e $\dim W = 0$.

2) $\dim W \leq \dim V$

Sia $\dim W = h$. Sia $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_h\}$ una base di W . Per definizione di base, $\mathcal{B}_W$ è un insieme di vettori linearmente indipendenti.

Poiché $W \subseteq V$, l'insieme $\mathcal{B}_W$ è un sottoinsieme di V di vettori linearmente indipendenti. Per il **Corollario del Lemma di Steinitz**, il numero di vettori in un qualsiasi insieme linearmente indipendente di V (in questo caso h) non può superare la dimensione di V (cioè n):

$$h \leq n$$

Dunque $\dim W \leq \dim V$.

3) $\dim W = \dim V \iff W = V$

($\Leftarrow$) Se $W = V$, allora i due insiemi sono identici, e quindi hanno banalmente la stessa dimensione: $\dim W = \dim V$.

($\Rightarrow$) Supponiamo ora che $\dim W = \dim V = n$. Sia $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_n\}$ una base di W .

Poiché $\mathcal{B}_W$ è una base di W , i suoi vettori sono linearmente indipendenti. Poiché $W \subseteq V$, $\mathcal{B}_W$ è un insieme di n vettori di V linearmente indipendenti.

Ora, per un **teorema fondamentale sulle basi** (diretta conseguenza del Lemma di Steinitz), qualsiasi insieme contenente n vettori linearmente indipendenti in uno spazio V di dimensione n è anche un sistema di generatori per V , e quindi è una base di V .

Pertanto, $\mathcal{B}_W$ è una base sia per W (per ipotesi) sia per V (per questo teorema). Da ciò segue che:

- $W = L(\mathcal{B}_W)$ (perché $\mathcal{B}_W$ è base di W)
- $V = L(\mathcal{B}_W)$ (perché $\mathcal{B}_W$ è base di V)

Concludiamo che $W = V$. $\square$

Capitolo 8

Lezione 8 - 17/10

8.1 L'intersezione di sottospazi è un sottospazio

Proposizione: L'intersezione di sottospazi è un sottospazio

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K . Siano $W_1, \dots, W_p \subseteq V$ sottospazi vettoriali di V , con $p \geq 2$. Definiamo W come la loro intersezione:

$$W = W_1 \cap \dots \cap W_p = \bigcap_{i=1}^p W_i$$

Allora W è un sottospazio vettoriale di V .

Dimostrazione

Per dimostrare che W è un sottospazio vettoriale, dobbiamo verificare le tre proprietà (il test dei sottospazi).

1. **Contiene il vettore nullo** ($W \neq \emptyset$): Poiché ogni W_i (per $i = 1, \dots, p$) è un sottospazio, ognuno di essi contiene il vettore nullo:

$$\bar{0} \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Per definizione di intersezione, se $\bar{0}$ appartiene a tutti gli insiemi, allora appartiene anche alla loro intersezione:

$$\bar{0} \in W = \bigcap_{i=1}^p W_i$$

Questo dimostra che W non è l'insieme vuoto.

2. **Chiusura rispetto alla somma**: Siano $u, v \in W$. Dobbiamo dimostrare che $u + v \in W$. Per definizione di W , se $u, v \in W$, allora u e v appartengono a ciascun W_i :

$$u \in W_i \text{ e } v \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Poiché ogni W_i è un sottospazio, è chiuso rispetto alla somma. Dunque:

$$u + v \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Dato che $u + v$ appartiene a tutti i sottospazi W_i , appartiene anche alla loro intersezione:

$$u + v \in W$$

Proposizione: L'intersezione di sottospazi è un sottospazio

Dimostrazione

- **Chiusura rispetto al prodotto per scalare:** Siano $u \in W$ e $\alpha \in K$. Dobbiamo dimostrare che $\alpha u \in W$. Per definizione di W , se $u \in W$, allora u appartiene a ciascun W_i :

$$u \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Poiché ogni W_i è un sottospazio, è chiuso rispetto al prodotto per scalare. Dunque:

$$\alpha u \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Dato che αu appartiene a tutti i sottospazi W_i , appartiene anche alla loro intersezione:

$$\alpha u \in W$$

Avendo verificato le tre proprietà, W è un sottospazio vettoriale di V .

8.2 Sottospazio Somma

Definizione (Sottospazio Somma)

Siano $W_1, \dots, W_p$ sottospazi vettoriali di V . Si definisce **sottospazio somma** l'insieme:

$$W_1 + \dots + W_p = \{w_1 + \dots + w_p \mid w_i \in W_i \text{ per } i = 1, \dots, p\}$$

Questo è l'insieme di tutti i vettori di V che si possono scrivere come somma di vettori appartenenti a ciascun sottospazio.

Proposizione: Il sottospazio somma è un sottospazio

Siano $W_1, \dots, W_p$ sottospazi vettoriali di V . L'insieme $W = W_1 + \dots + W_p$ è un sottospazio vettoriale di V .

Dimostrazione

Dobbiamo verificare le tre proprietà dei sottospazi (test dei sottospazi).

- **Contiene il vettore nullo** ($W \neq \emptyset$): Poiché ogni W_i è un sottospazio, $\bar{0} \in W_i$ per ogni $i = 1, \dots, p$. Possiamo quindi scrivere il vettore nullo come somma di elementi dei W_i :

$$\bar{0} = \underbrace{\bar{0}}_{\in W_1} + \underbrace{\bar{0}}_{\in W_2} + \dots + \underbrace{\bar{0}}_{\in W_p}$$

Dato che questa somma appartiene alla definizione di W , si ha $\bar{0} \in W$. Quindi W non è l'insieme vuoto.

- **Chiusura rispetto alla somma:** Siano $u, v \in W$. Dobbiamo dimostrare che $u + v \in W$. Per definizione di W , se $u, v \in W$, allora esistono:

$$u_1 \in W_1, \dots, u_p \in W_p \text{ tali che } u = u_1 + \dots + u_p$$

$$v_1 \in W_1, \dots, v_p \in W_p \text{ tali che } v = v_1 + \dots + v_p$$

Calcoliamo la loro somma $u + v$ e usiamo la proprietà associativa e commutativa della somma in V per riordinare i termini:

$$u + v = (u_1 + \dots + u_p) + (v_1 + \dots + v_p) = (u_1 + v_1) + \dots + (u_p + v_p)$$

Proposizione: Il sottospazio somma è un sottospazio

Dimostrazione

Poiché ogni W_i è un sottospazio, è chiuso rispetto alla somma. Dunque:

$$(u_1 + v_1) \in W_1, \quad \dots, \quad (u_p + v_p) \in W_p$$

Abbiamo scritto $u + v$ come somma di elementi (dove l' i -esimo termine è $u_i + v_i \in W_i$). Per definizione, questo significa che $u + v \in W$.

- **Chiusura rispetto al prodotto per scalare:** Siano $u \in W$ e $\lambda \in K$. Dobbiamo dimostrare che $\lambda u \in W$.

Come prima, $u \in W \implies u = u_1 + \dots + u_p$, con $u_i \in W_i$ per ogni i .

Calcoliamo il prodotto λu , usando la proprietà distributiva:

$$\lambda u = \lambda(u_1 + \dots + u_p) = (\lambda u_1) + \dots + (\lambda u_p)$$

Poiché ogni W_i è un sottospazio, è chiuso rispetto al prodotto per scalare. Dunque:

$$(\lambda u_1) \in W_1, \quad \dots, \quad (\lambda u_p) \in W_p$$

Abbiamo scritto λu come somma di elementi (dove l' i -esimo termine è $\lambda u_i \in W_i$). Per definizione, questo significa che $\lambda u \in W$.

Avendo verificato le tre proprietà, W è un sottospazio vettoriale di V .

8.3 Somma di sottospazi generati da insiemi

Proposizione: Somma di sottospazi generati da insiemi

Siano $S_1, S_2, \dots, S_p$ insiemi tali che

$$W_1 = L(S_1), \quad W_2 = L(S_2), \quad \dots, \quad W_p = L(S_p)$$

siano sottospazi vettoriali di V . Allora:

$$W_1 + W_2 + \dots + W_p = L(S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_p).$$

Dimostrazione

“ $\supseteq$ ”

Poiché

$$S_1 \cup \dots \cup S_p \subseteq W_1 \cup \dots \cup W_p \subseteq W_1 + \dots + W_p,$$

per definizione di chiusura lineare segue immediatamente che:

$$L(S_1 \cup \dots \cup S_p) \subseteq W_1 + \dots + W_p.$$

Dimostrazione

“ $\subseteq$ ”

Sia

$$u \in W_1 + \cdots + W_p.$$

Allora esistono vettori

$$u_1 \in W_1, u_2 \in W_2, \dots, u_p \in W_p$$

tali che

$$u = u_1 + u_2 + \cdots + u_p.$$

Poiché ogni S_i genera W_i , ciascun u_i può essere scritto come combinazione lineare di vettori di S_i . Cioè:

$$\exists v_1, \dots, v_t \in S_1, \alpha_1, \dots, \alpha_t \in K \quad \text{tali che} \quad u_1 = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_t v_t,$$

$$\exists w_1, \dots, w_s \in S_2, \beta_1, \dots, \beta_s \in K \quad \text{tali che} \quad u_2 = \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_s w_s,$$

...

$$\exists z_1, \dots, z_r \in S_p, \gamma_1, \dots, \gamma_r \in K \quad \text{tali che} \quad u_p = \gamma_1 z_1 + \cdots + \gamma_r z_r.$$

Sommando queste combinazioni lineari otteniamo:

$$u = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_t v_t + \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_s w_s + \cdots + \gamma_1 z_1 + \cdots + \gamma_r z_r.$$

Poiché tutti i vettori v_i, w_j, z_k appartengono all'unione $S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p$, segue che $u \in L(S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p)$. Pertanto:

$$W_1 + \cdots + W_p \subseteq L(S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p).$$

Combinando le due inclusioni otteniamo l'uguaglianza desiderata:

$$W_1 + \cdots + W_p = L(S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p).$$

8.4 Regola di Grassman

Teorema (Regola di Grassmann)

Siano W_1 e W_2 sottospazi vettoriali di uno spazio V finitamente generato. Siano $\dim W_1 = r$ e $\dim W_2 = s$.

Allora $W_1 + W_2$ e $W_1 \cap W_2$ sono anch'essi finitamente generati e vale la seguente relazione:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

(ovvero $\dim(W_1 + W_2) = r + s - i$, usando le notazioni della dimostrazione).

Dimostrazione

Sia $W_{12} = W_1 \cap W_2$. Poiché W_{12} è un sottospazio di W_1 (che è finitamente generato), anche W_{12} è finitamente generato. Sia $\dim(W_{12}) = i$. Sia $\mathcal{B}_{12} = \{u_1, \dots, u_i\}$ una sua base.

Poiché $W_{12} \subseteq W_1$, possiamo usare il **Teorema del Completamento della Base** per estendere $\mathcal{B}_{12}$ a una base di W_1 . Sia $\mathcal{B}_{W_1} = \{u_1, \dots, u_i, v_{i+1}, \dots, v_r\}$ tale base (quindi $\dim W_1 = r$).

Allo stesso modo, poiché $W_{12} \subseteq W_2$, completiamo $\mathcal{B}_{12}$ a una base di W_2 . Sia $\mathcal{B}_{W_2} = \{u_1, \dots, u_i, w_{i+1}, \dots, w_s\}$ tale base (quindi $\dim W_2 = s$).

Ora consideriamo l'insieme $\mathcal{B}_{SUM}$ dato dall'unione delle due basi:

$$\mathcal{B}_{SUM} = \mathcal{B}_{W_1} \cup \mathcal{B}_{W_2} = \{u_1, \dots, u_i, v_{i+1}, \dots, v_r, w_{i+1}, \dots, w_s\}$$

Il nostro obiettivo è dimostrare che $\mathcal{B}_{SUM}$ è una base per $W_1 + W_2$.

1. $\mathcal{B}_{SUM}$ genera $W_1 + W_2$ Per definizione, il sottospazio somma $W_1 + W_2$ è generato dall'unione dei sistemi di generatori:

$$W_1 + W_2 = L(\mathcal{B}_{W_1}) + L(\mathcal{B}_{W_2}) = L(\mathcal{B}_{W_1} \cup \mathcal{B}_{W_2}) = L(\mathcal{B}_{SUM})$$

Quindi $\mathcal{B}_{SUM}$ è un sistema di generatori per $W_1 + W_2$.

2. $\mathcal{B}_{SUM}$ è linearmente indipendente Questa è la parte cruciale. Dobbiamo dimostrare che l'unica combinazione lineare dei vettori di $\mathcal{B}_{SUM}$ che dà il vettore nullo è quella con tutti i coefficienti nulli. Impostiamo l'equazione:

$$\sum_{k=1}^i \alpha_k u_k + \sum_{j=i+1}^r \beta_j v_j + \sum_{l=i+1}^s \gamma_l w_l = \bar{0}$$

Isoliamo i termini di $\mathcal{B}_{W_1}$ da un lato:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^i \alpha_k u_k + \sum_{j=i+1}^r \beta_j v_j}_{\text{chiamiamolo } z_1} = - \underbrace{\sum_{l=i+1}^s \gamma_l w_l}_{\text{chiamiamolo } z_2}$$

Analizziamo il vettore z_1 : per costruzione, z_1 è C.L. della base $\mathcal{B}_{W_1}$, quindi $z_1 \in W_1$.

Analizziamo il vettore z_2 : per costruzione, z_2 è C.L. di vettori di $\mathcal{B}_{W_2}$, quindi $z_2 \in W_2$.

Dall'uguaglianza $z_1 = -z_2$, deduciamo che il vettore z_1 appartiene anche a W_2 (essendo uguale a $-z_2 \in W_2$).

Quindi $z_1 \in W_1$ e $z_1 \in W_2$, il che significa $z_1 \in W_1 \cap W_2 = W_{12}$.

Poiché $z_1 \in W_{12}$, esso si deve poter scrivere come C.L. della base di W_{12} , $\mathcal{B}_{12} = \{u_1, \dots, u_i\}$.

Esistono quindi $\lambda_1, \dots, \lambda_i \in K$ tali che:

$$z_1 = \sum_{k=1}^i \lambda_k u_k$$

Ora confrontiamo le due espressioni che abbiamo per $-z_2$:

$$- \sum_{l=i+1}^s \gamma_l w_l = z_1 = \sum_{k=1}^i \lambda_k u_k$$

Spostando tutto sullo stesso lato otteniamo:

$$\bar{0} = \sum_{k=1}^i \lambda_k u_k + \sum_{l=i+1}^s \gamma_l w_l$$

Questa è una combinazione lineare dei vettori di $\mathcal{B}_{W_2} = \{u_1, \dots, u_i, w_{i+1}, \dots, w_s\}$. Poiché $\mathcal{B}_{W_2}$ è una base, i suoi vettori sono linearmente indipendenti, e quindi tutti i coefficienti devono essere nulli:

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_i = 0 \quad \text{e} \quad \gamma_{i+1} = \dots = \gamma_s = 0$$

Dimostrazione

Abbiamo dimostrato che tutti i γ_l sono nulli.

Torniamo all'equazione di partenza. Sapendo che i γ_l sono nulli, essa si riduce a:

$$\sum_{k=1}^i \alpha_k u_k + \sum_{j=i+1}^r \beta_j v_j = \bar{0}$$

Questa è una C.L. dei vettori di $\mathcal{B}_{W_1} = \{u_1, \dots, u_i, v_{i+1}, \dots, v_r\}$. Poiché $\mathcal{B}_{W_1}$ è una base, anche i suoi vettori sono L.I., e quindi tutti i coefficienti devono essere nulli:

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_i = 0 \quad \text{e} \quad \beta_{i+1} = \dots = \beta_r = 0$$

Avendo dimostrato che tutti i coefficienti α, β, γ sono nulli, $\mathcal{B}_{SUM}$ è linearmente indipendente.

3. Conclusione Poiché $\mathcal{B}_{SUM}$ è un sistema di generatori L.I. per $W_1 + W_2$, è una sua base. La dimensione di $W_1 + W_2$ è la cardinalità (il numero di vettori) di $\mathcal{B}_{SUM}$:

$$\dim(W_1 + W_2) = |\mathcal{B}_{SUM}| = \underbrace{i}_{(\text{vettori } u)} + \underbrace{(r-i)}_{(\text{vettori } v)} + \underbrace{(s-i)}_{(\text{vettori } w)}$$

$$\dim(W_1 + W_2) = i + r - i + s - i = r + s - i$$

Sostituendo i nomi delle dimensioni:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

Osservazione: Caso di Somma Diretta con intersezione banale

Siano W_1, W_2 sottospazi di V . Se la loro intersezione è banale, cioè $W_1 \cap W_2 = \{\bar{0}\}$, allora dalla Formula di Grassmann abbiamo:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) = r + s - 0 = r + s$$

Dalla dimostrazione di Grassmann, segue anche che l'unione delle basi $\mathcal{B}_{W_1}$ e $\mathcal{B}_{W_2}$ (che in questo caso non hanno vettori in comune, a parte lo $\bar{0}$ che non è in nessuna base) forma una base per la somma:

$$\mathcal{B}_{W_1+W_2} = \mathcal{B}_{W_1} \cup \mathcal{B}_{W_2}$$

La cardinalità della base è infatti $|\mathcal{B}_{W_1+W_2}| = |\mathcal{B}_{W_1}| + |\mathcal{B}_{W_2}| = r + s$.

Definizione (Somma Diretta)

Siano $W_1, \dots, W_p$ sottospazi vettoriali di V , con $p \geq 2$.

La somma $W = W_1 + \dots + W_p$ si dice **somma diretta** (e si scrive $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_p$) se vale la seguente condizione:

$$\forall i \in \{1, \dots, p\}, \quad W_i \cap \left(\sum_{j=1, j \neq i}^p W_j \right) = \{\bar{0}\}$$

(Cioè, l'intersezione di ogni sottospazio con la somma di *tutti gli altri* è il solo vettore nullo).

Proposizione: Caratterizzazione della Somma Diretta

Sia $W = W_1 + \dots + W_p$ un sottospazio somma (con $p \geq 2$).

La somma è **diretta** (cioè $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_p$) $\iff$ ogni vettore $u \in W$ si scrive in **modo unico** come somma di vettori $w_i \in W_i$.

Ossia, se $u \in W$ e abbiamo due decomposizioni:

1. $u = u_1 + u_2 + \dots + u_p$ (con $u_i \in W_i$ per ogni i)
2. $u = v_1 + v_2 + \dots + v_p$ (con $v_i \in W_i$ per ogni i)

allora le due decomposizioni devono essere identiche:

$$u_1 = v_1, \quad u_2 = v_2, \quad \dots, \quad u_p = v_p$$

Proposizione: Dimensione e Basi della Somma Diretta

Siano $W_1, \dots, W_p$ sottospazi vettoriali di V , con $\dim(W_i) = r_i$.

Se la somma $W = W_1 + \dots + W_p$ è **diretta** (cioè $W = W_1 \boxplus \dots \boxplus W_p$), e $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$ sono basi di $W_1, \dots, W_p$ rispettivamente, allora:

1. L'unione delle basi $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_p$ è una base di W .
2. La dimensione della somma è la somma delle dimensioni:

$$\dim(W_1 \boxplus \dots \boxplus W_p) = r_1 + \dots + r_p$$

Dimostrazione

Dimostriamo per induzione sul numero p di sottospazi.

- **Base dell'induzione ($p = 2$):** Dobbiamo dimostrare la tesi per $W = W_1 \boxplus W_2$. La somma è diretta, quindi per definizione $W_1 \cap W_2 = \{\bar{0}\}$. Usando la Regola di Grassmann:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2)$$

$$\dim(W) = r_1 + r_2 - 0 = r_1 + r_2$$

Come visto nell'Osservazione precedente, quando l'intersezione è banale, la base della somma è l'unione delle basi $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$. La sua cardinalità è $|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}_1| + |\mathcal{B}_2| = r_1 + r_2$, che corrisponde alla dimensione. Il caso $p = 2$ è verificato.

- **Passo induttivo ($p-1 \implies p$):** Supponiamo (Ipotesi Induttiva) che la proposizione sia vera per $p-1$ sottospazi. Cioè, per il sottospazio $U = W_1 \boxplus \dots \boxplus W_{p-1}$:

- La sua base è $\mathcal{B}_U = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_{p-1}$.
- La sua dimensione è $\dim(U) = r_1 + \dots + r_{p-1}$.

Ora consideriamo la somma a p termini:

$$W = W_1 \boxplus \dots \boxplus W_p = (W_1 \boxplus \dots \boxplus W_{p-1}) + W_p = U + W_p$$

Per la definizione di somma diretta, l'intersezione di W_p con la somma di tutti gli altri è banale:

$$W_p \cap (W_1 + \dots + W_{p-1}) = W_p \cap U = \{\bar{0}\}$$

Ci siamo ricondotti al caso base (somma di *due* sottospazi, U e W_p , con intersezione nulla).

Proposizione: Dimensione e Basi della Somma Diretta

Dimostrazione

(Dimensione) Appliciamo di nuovo Grassmann a $U + W_p$:

$$\dim(W) = \dim(U + W_p) = \dim(U) + \dim(W_p) - \dim(U \cap W_p)$$

Sostituendo i valori (dall'ipotesi induttiva e dai dati):

$$\dim(W) = (r_1 + \cdots + r_{p-1}) + r_p - 0 = r_1 + \cdots + r_p$$

(La parte 2 della tesi è dimostrata).

(Base) Sempre per il caso $p = 2$, la base della somma $U \boxplus W_p$ è l'unione delle loro basi:

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_p$$

Sostituendo la base $\mathcal{B}_U$ (dall'ipotesi induttiva):

$$\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_{p-1}) \cup \mathcal{B}_p = \mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_p$$

(La parte 1 della tesi è dimostrata).

Avendo dimostrato il passo induttivo, la proposizione è vera per ogni $p \geq 2$.

Capitolo 9

Lezione 9 - 22/10

9.1 Applicazioni Lineari

Definizione (Applicazione Lineare (Omomorfismo))

Siano V e W due spazi vettoriali definiti sullo stesso campo K .

Un'applicazione $T : V \rightarrow W$ si dice **lineare** (o **omomorfismo** di spazi vettoriali) se soddisfa le seguenti due proprietà:

1. **Additività:** $\forall u, v \in V, \quad T(u + v) = T(u) + T(v)$ (Conserva la somma di vettori).
2. **Omogeneità:** $\forall v \in V, \forall \lambda \in K, \quad T(\lambda v) = \lambda T(v)$ (Conserva il prodotto per scalare).

In base alle proprietà di T e agli spazi V, W , un omomorfismo può essere classificato come:

- **Isomorfismo:** se T è un omomorfismo biiettivo (iniettivo e suriettivo).
- **Monomorfismo:** se T è un omomorfismo iniettivo.
- **Epimorfismo:** se T è un omomorfismo suriettivo.
- **Endomorfismo:** se lo spazio di partenza e di arrivo coincidono, $V = W$.
- **Automorfismo:** se $V = W$ e T è biettiva (è un endomorfismo biiettivo).

Osservazioni: Proprietà delle Applicazioni Lineari

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare.

- **T manda il vettore nullo nel vettore nullo:** L'immagine del vettore nullo di V è il vettore nullo di W :

$$T(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$$

Dimostrazione: Sfruttiamo la proprietà $\bar{0}_V = 0 \cdot v$ (dove 0 è lo scalare) e l'omogeneità di T :

$$T(\bar{0}_V) = T(0 \cdot \bar{0}_V) \stackrel{\text{omogeneità}}{=} 0 \cdot T(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$$

(L'ultimo passaggio è vero perché il prodotto di uno scalare zero per qualsiasi vettore di W dà il vettore nullo $\bar{0}_W$).

- **Le applicazioni lineari conservano le combinazioni lineari:** Per ogni $h \geq 1$, $\forall u_1, \dots, u_h \in V$ e $\forall \lambda_1, \dots, \lambda_h \in K$, si ha:

$$T(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_h u_h) = \lambda_1 T(u_1) + \dots + \lambda_h T(u_h)$$

Dimostrazione (per induzione sul numero h di vettori):

Base ($h=1$): Dobbiamo dimostrare $T(\lambda_1 u_1) = \lambda_1 T(u_1)$. Questo è vero per definizione, essendo la proprietà di **omogeneità** (la seconda proprietà delle applicazioni lineari).

Passo induttivo ($h-1 \implies h$): Supponiamo (Ipotesi Induttiva) che la tesi sia vera per $h-1$ vettori, cioè:

$$T(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{h-1} u_{h-1}) = \lambda_1 T(u_1) + \dots + \lambda_{h-1} T(u_{h-1})$$

Vogliamo dimostrare la tesi per h vettori. Consideriamo la combinazione lineare:

$$T(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{h-1} u_{h-1} + \lambda_h u_h)$$

Possiamo raggruppare i termini e usare le proprietà di T . Sia $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{h-1} u_{h-1}$ e $v = \lambda_h u_h$.

$$T(u + v) \stackrel{\text{additività}}{=} T(u) + T(v)$$

Sostituendo u e v :

$$T(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{h-1} u_{h-1}) + T(\lambda_h u_h)$$

Applichiamo ora l'ipotesi induttiva al primo termine e l'omogeneità (passo base) al secondo termine:

$$\underbrace{(\lambda_1 T(u_1) + \dots + \lambda_{h-1} T(u_{h-1}))}_{\text{da Ip. Induttiva}} + \underbrace{\lambda_h T(u_h)}_{\text{da Omogeneità}}$$

Che è esattamente la tesi per h :

$$\lambda_1 T(u_1) + \dots + \lambda_{h-1} T(u_{h-1}) + \lambda_h T(u_h)$$

La proposizione è dimostrata.

Proposizione: Le applicazioni lineari conservano la dipendenza lineare

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare tra due K -spazi vettoriali V e W .

Se l' n -upla $(u_1, \dots, u_n)$ di vettori di V è **linearmente dipendente**, allora la n -upla delle immagini $(T(u_1), \dots, T(u_n))$ è un' n -upla di vettori di W **linearmente dipendente**.

Dimostrazione

Ipotesi: L' n -upla $(u_1, \dots, u_n)$ è linearmente dipendente. Questo significa che esistono scalari $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$, **non tutti nulli**, tali che:

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \bar{0}_V$$

(dove $\bar{0}_V$ è il vettore nullo di V).

Tesi: L' n -upla $(T(u_1), \dots, T(u_n))$ è linearmente dipendente. Dobbiamo cioè dimostrare che esistono scalari $(\beta_1, \dots, \beta_n) \in K^n$, **non tutti nulli**, tali che:

$$\beta_1 T(u_1) + \dots + \beta_n T(u_n) = \bar{0}_W$$

(dove $\bar{0}_W$ è il vettore nullo di W).

Svolgimento: Appliciamo l'applicazione lineare T ad entrambi i membri dell'equazione che abbiamo per ipotesi:

$$T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = T(\bar{0}_V)$$

Per la **linearità** di T (proprietà di conservare le combinazioni lineari), il primo membro diventa:

$$T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n)$$

Per una proprietà fondamentale delle applicazioni lineari, il secondo membro (l'immagine del vettore nullo) è:

$$T(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$$

Uguagliando i due risultati, otteniamo:

$$\alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n) = \bar{0}_W$$

Ora ci basta scegliere $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Poiché per ipotesi gli scalari α_i non erano tutti nulli, anche i β_i non sono tutti nulli.

Abbiamo quindi trovato una combinazione lineare non banale dei vettori $T(u_i)$ che dà il vettore nullo in W . Questo dimostra la tesi.

Osservazioni: Altre proprietà delle applicazioni lineari

- Se $T : V \rightarrow W$ è un isomorfismo, allora la sua applicazione inversa $T^{-1} : W \rightarrow V$ è anch'essa un'applicazione lineare e quindi è un isomorfismo.
- Siano $T : V \rightarrow W$ e $T' : W \rightarrow U$ due applicazioni lineari. Allora l'applicazione composta $T' \circ T : V \rightarrow U$ (definita da $(T' \circ T)(v) = T'(T(v))$) è un'applicazione lineare.

9.2 Kernel**Definizione (Kernel (o nucleo))**

Data un'applicazione lineare $T : V \rightarrow W$, si definisce **Kernel** (o **nucleo**) di T l'insieme:

$$\ker(T) = \{ u \in V \mid T(u) = \bar{0}_W \}.$$

In altre parole, il kernel di T è l'insieme di tutti i vettori di V che vengono mandati nel vettore nullo di W tramite T .

Proposizione: Proprietà fondamentali delle applicazioni lineari

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. T è **suriettiva** se e solo se l'immagine coincide con il codominio:

$$\text{Im}(T) = W.$$

2. T è **iniettiva** se e solo se il nucleo è banale (contiene solo il vettore nullo):

$$\ker(T) = \{\underline{0}_V\}.$$

3. Se $S \subseteq V$ è un sottoinsieme di generatori, allora l'immagine del sottospazio generato da S è uguale al sottospazio generato dalle immagini dei generatori:

$$T(L(S)) = L(T(S)).$$

Dimostrazione

Punto (ii) — iniettività e nucleo banale.

($\Rightarrow$) Supponiamo che T sia iniettiva. Poiché T è lineare, $T(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$. Sia ora $u \in V$ con $u \neq \underline{0}_V$. Per iniettività deve valere $T(u) \neq T(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$. Quindi non esiste vettore non nullo mandato in $\underline{0}_W$, ovvero

$$\ker(T) = \{\underline{0}_V\}.$$

($\Leftarrow$) Supponiamo ora che $\ker(T) = \{\underline{0}_V\}$ e mostriamo che T è iniettiva. Siano $u, v \in V$ tali che $T(u) = T(v)$. Allora

$$T(u) - T(v) = \underline{0}_W \implies T(u - v) = \underline{0}_W,$$

quindi $u - v \in \ker(T) = \{\underline{0}_V\}$. Di conseguenza $u - v = \underline{0}_V$ e quindi $u = v$. Questo dimostra l'iniettività di T .

Punto (iii) — $T(L(S)) = L(T(S))$.

Inclusione $T(L(S)) \subseteq L(T(S))$.

Sia $w \in T(L(S))$. Allora esiste $u \in L(S)$ tale che $T(u) = w$. Poiché $u \in L(S)$, esistono vettori $u_1, \dots, u_n \in S$ e scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tali che

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

Applicando T e usando la linearità otteniamo

$$w = T(u) = \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n),$$

cioè w è una combinazione lineare di vettori di $T(S)$. Quindi $w \in L(T(S))$. Abbiamo dimostrato $T(L(S)) \subseteq L(T(S))$.

Inclusione $L(T(S)) \subseteq T(L(S))$.

Sia $z \in L(T(S))$. Allora esistono vettori $w_1, \dots, w_m \in T(S)$ e scalari $\beta_1, \dots, \beta_m \in K$ tali che

$$z = \beta_1 w_1 + \dots + \beta_m w_m.$$

Per definizione di $T(S)$, per ogni w_i esiste $v_i \in S$ con $w_i = T(v_i)$. Quindi

$$z = \beta_1 T(v_1) + \dots + \beta_m T(v_m) = T(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_m v_m).$$

Poiché $\beta_1 v_1 + \dots + \beta_m v_m \in L(S)$, ne segue che $z \in T(L(S))$. Abbiamo dunque $L(T(S)) \subseteq T(L(S))$.

Combinando le due inclusioni si ottiene l'uguaglianza:

$$T(L(S)) = L(T(S)).$$

□

Proposizione: Il nucleo è un sottospazio vettoriale

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Allora $\ker(T)$ è un sottospazio vettoriale di V .

Dimostrazione

Per prima cosa osserviamo che T è lineare, quindi $T(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$. Dunque $\underline{0}_V \in \ker(T)$, cioè $\ker(T)$ non è vuoto.

Siano ora $u, v \in \ker(T)$. Per definizione $T(u) = \underline{0}_W$ e $T(v) = \underline{0}_W$. Mostriamo che $u + v \in \ker(T)$ e $\alpha u \in \ker(T)$ per ogni $\alpha \in K$.

Chiusura per addizione.

$$T(u + v) \stackrel{(1)}{=} T(u) + T(v) = \underline{0}_W + \underline{0}_W = \underline{0}_W,$$

quindi $u + v \in \ker(T)$.

Chiusura per moltiplicazione per scalare. Sia $\alpha \in K$. Poiché $T(u) = \underline{0}_W$,

$$T(\alpha u) \stackrel{(2)}{=} \alpha T(u) = \alpha \underline{0}_W = \underline{0}_W,$$

quindi $\alpha u \in \ker(T)$.

Avendo verificato che $\ker(T)$ è non vuoto, chiuso rispetto all'addizione e chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalare, concludiamo che $\ker(T)$ è un sottospazio vettoriale di V . $\square$

Proposizione: Conservazione della linearità dell'indipendenza

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare iniettiva. Se $u_1, \dots, u_n$ è una n -upla di vettori linearmente indipendenti di V , allora $T(u_1), \dots, T(u_n)$ è una n -upla di vettori linearmente indipendenti di W .

Dimostrazione

Dobbiamo mostrare che se $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$ è tale che

$$\alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n) = \underline{0}_W,$$

allora necessariamente $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$.

Per linearità di T si ha:

$$T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = \underline{0}_W.$$

Questo implica che

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n \in \ker(T).$$

Poiché T è iniettiva, $\ker(T) = \{\underline{0}_V\}$. Dunque:

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \underline{0}_V.$$

Ma i vettori $u_1, \dots, u_n$ sono linearmente indipendenti, quindi

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Pertanto, $T(u_1), \dots, T(u_n)$ sono linearmente indipendenti in W . $\square$

9.3 Teorema dell'Equazione Dimensionale

Teorema (Teorema dell'Equazione Dimensionale)

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Supponiamo che V sia uno spazio vettoriale finitamente generato, con $\dim V = n$.

Allora $\ker(T)$ e $\text{Im}(T)$ sono anch'essi finitamente generati e vale la seguente relazione:

$$\dim V = \dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

(La dimensione dello spazio di partenza è la somma della dimensione del nucleo e della dimensione dell'immagine).

Osservazioni: conseguenze del Teorema dell'equazione Dimensionale

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, con $\dim V = n$ e $\dim W = m$.

- Se $n > m$ ($\dim V > \dim W$), T **non può essere iniettiva**.
Dim: Sappiamo $\dim(\text{Im}(T)) \leq \dim W = m$. Dalla formula: $\dim(\ker(T)) = n - \dim(\text{Im}(T)) \geq n - m > 0$. Poiché $\dim(\ker(T)) > 0$, il nucleo non è banale e T non è iniettiva.
- Se $n < m$ ($\dim V < \dim W$), T **non può essere suriettiva**.
Dim: Sappiamo $\dim(\ker(T)) \geq 0$. Dalla formula: $\dim(\text{Im}(T)) = n - \dim(\ker(T)) \leq n$. Poiché $\dim(\text{Im}(T)) \leq n < m$, l'immagine non può coincidere con W .
- Se $n = m$ ($\dim V = \dim W$), T è **iniettiva** $\iff T$ è **suriettiva**.
Dimostrazione: Sia $\dim V = \dim W = n$. Dall'equazione dimensionale sappiamo che $n = \dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T))$.

($\Rightarrow$) (**Iniettiva** $\implies$ **Suriettiva**) Se T è iniettiva, allora $\dim(\ker(T)) = 0$. Sostituendo nell'equazione:

$$n = 0 + \dim(\text{Im}(T)) \implies \dim(\text{Im}(T)) = n$$

L'immagine $\text{Im}(T)$ è un sottospazio di W che ha la stessa dimensione di W (n). Per la proprietà dei sottospazi (punto 3 della prop. precedente), questo implica che $\text{Im}(T) = W$. Quindi T è suriettiva.

($\Leftarrow$) (**Suriettiva** $\implies$ **Iniettiva**) Se T è suriettiva, allora $\text{Im}(T) = W$, e quindi $\dim(\text{Im}(T)) = \dim W = n$. Sostituendo nell'equazione:

$$n = \dim(\ker(T)) + n \implies \dim(\ker(T)) = 0$$

Poiché $\dim(\ker(T)) = 0$, il nucleo è banale ($\ker(T) = \{\bar{0}_V\}$). Quindi T è iniettiva.

Di conseguenza, quando le dimensioni coincidono, T è iniettiva se e solo se è suriettiva, e quindi se e solo se è un **isomorfismo**.

Osservazione Gli isomorfismi conservano la L.I.

Sia $T : V \rightarrow W$ un **isomorfismo**. Sia V uno spazio vettoriale su campo K (ad esempio, con $\dim V = n$) e sia $S \subseteq V$ un sottoinsieme di vettori.

Allora S è **linearmente indipendente** $\iff$ l'insieme delle immagini $T(S)$ è **linearmente indipendente**.

(Questo è una conseguenza diretta del fatto che, essendo T un isomorfismo, T è iniettiva ($\ker(T) = \{\bar{0}_V\}$), che dimostra ($\Rightarrow$)), e anche la sua inversa $T^{-1} : W \rightarrow V$ è un isomorfismo, che dimostra ($\Leftarrow$)).

Capitolo 10

Lezione 10 - 24/10

Esempio

Isomorfismo $\phi_{\mathcal{B}}$ e Test di Indipendenza Sia $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ lo spazio dei polinomi di grado ≤ 2 . Sia $\mathcal{B} = (1+x, 1-x, x^2)$ una sua base.

L'isomorfismo delle coordinate è $\phi_{\mathcal{B}} : \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Vogliamo trovare la mappatura per un generico polinomio $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$. Dobbiamo trovare gli unici scalari $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ tali che:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 = \alpha_1(1+x) + \alpha_2(1-x) + \alpha_3(x^2)$$

Raggruppando per potenze di x :

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 = (\alpha_1 + \alpha_2) \cdot 1 + (\alpha_1 - \alpha_2) \cdot x + \alpha_3 \cdot x^2$$

Uguagliando i coefficienti, otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = a_0 \\ \alpha_1 - \alpha_2 = a_1 \\ \alpha_3 = a_2 \end{cases}$$

Risolviamo per $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$:

- Sommando la prima e la seconda equazione: $2\alpha_1 = a_0 + a_1 \implies \alpha_1 = \frac{1}{2}a_0 + \frac{1}{2}a_1$
- Sottraendo la seconda dalla prima: $2\alpha_2 = a_0 - a_1 \implies \alpha_2 = \frac{1}{2}a_0 - \frac{1}{2}a_1$
- Dalla terza equazione: $\alpha_3 = a_2$

Quindi, l'isomorfismo $\phi_{\mathcal{B}}$ mappa il polinomio nelle sue coordinate:

$$\phi_{\mathcal{B}}(a_0 + a_1x + a_2x^2) = \left(\frac{1}{2}a_0 + \frac{1}{2}a_1, \frac{1}{2}a_0 - \frac{1}{2}a_1, a_2 \right)$$

Applicazione: Vogliamo testare la lineare indipendenza dell'insieme $S \subseteq V$:

$$S = \{p_1, p_2, p_3\} = \{x^2 + 7x - 5, \quad 2x - 3, \quad 70 + 5x - 3x^2\}$$

Esempio

Per l'osservazione "Gli isomorfismi conservano la L.I.", S è L.I. $\iff$ l'insieme delle sue immagini $\phi_{\mathcal{B}}(S)$ è L.I. in $\mathbb{R}^3$.

Calcoliamo i vettori delle coordinate:

$$\bullet \quad p_1 = -5 + 7x + 1x^2 \implies a_0 = -5, a_1 = 7, a_2 = 1$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(p_1) = \left(\frac{-5+7}{2}, \frac{-5-7}{2}, 1 \right) = (1, -6, 1)$$

$$\bullet \quad p_2 = -3 + 2x + 0x^2 \implies a_0 = -3, a_1 = 2, a_2 = 0$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(p_2) = \left(\frac{-3+2}{2}, \frac{-3-2}{2}, 0 \right) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}, 0 \right)$$

$$\bullet \quad p_3 = 70 + 5x - 3x^2 \implies a_0 = 70, a_1 = 5, a_2 = -3$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(p_3) = \left(\frac{70+5}{2}, \frac{70-5}{2}, -3 \right) = \left(\frac{75}{2}, \frac{65}{2}, -3 \right)$$

Per verificare se questi 3 vettori in $\mathbb{R}^3$ sono L.I., li inseriamo come **righe** di una matrice A e ne calcoliamo il rango.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -6 & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 0 \\ \frac{75}{2} & \frac{65}{2} & -3 \end{pmatrix}$$

L'insieme S è linearmente indipendente se e solo se $\dim(L(\phi_{\mathcal{B}}(S))) = 3$, che a sua volta è vero se e solo se $\text{rango}(A) = 3$.

10.1 Rango

Definizione (Rango di una Matrice)

Sia A una matrice a coefficienti in un campo K .

Il **rango** di A (scritto $\text{rango}(A)$ o $\text{rk}(A)$) è un numero intero non negativo che corrisponde a:

- La dimensione dello spazio vettoriale generato dalle **colonne** della matrice (detto rango per colonne).
- La dimensione dello spazio vettoriale generato dalle **righe** della matrice (detto rango per righe).

Per il **Teorema del Rango**, questi due valori (dimensione dello spazio delle righe e dimensione dello spazio delle colonne) sono sempre uguali.

10.2 Teorema del Rango

Teorema (Teorema del Rango)

Sia A una matrice a coefficienti in un campo K . Il rango per righe di A (la dimensione del sottospazio generato dalle righe) è uguale al rango per colonne di A (la dimensione del sottospazio generato dalle colonne).

Di conseguenza, il rango di una matrice è uguale al rango della sua trasposta:

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(A^t)$$

Osservazione Spazio delle Righe e Spazio delle Colonne

Prendiamo una matrice $A \in M_{4,5}(K)$ (una matrice con 4 righe e 5 colonne).

- Le sue **righe** a^i (che sono 4) sono vettori in K^5 . Esse generano un sottospazio vettoriale $W_R = L(a^1, a^2, a^3, a^4) \subseteq K^5$.
- Le sue **colonne** a_j (che sono 5) sono vettori in K^4 . Esse generano un sottospazio vettoriale $W_C = L(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \subseteq K^4$.

Come hai giustamente osservato, W_R e W_C sono sottospazi vettoriali **diversi**, in quanto appartengono a spazi vettoriali "ambiente" diversi (K^5 e K^4).

Il Teorema del Rango ci dice che, nonostante i due sottospazi siano diversi e vivano in spazi diversi, essi hanno **la stessa dimensione**:

$$\dim(W_R) = \dim(W_C) = \text{rango}(A)$$

Proposizione: Invarianza dello Spazio delle Righe

Sia $A \in M_{m,n}(K)$ e sia $B \in M_{m,n}(K)$ una matrice ottenuta da A mediante un numero finito di operazioni elementari sulle righe.

Siano $\mathcal{R}(A) = L(a^1, \dots, a^m)$ lo spazio generato dalle righe di A , e $\mathcal{R}(B) = L(b^1, \dots, b^m)$ lo spazio generato dalle righe di B .

Allora i due spazi delle righe coincidono:

$$\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(B)$$

Di conseguenza, il loro rango (che è la dimensione di questo spazio) è identico:

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(B)$$

Dimostrazione

La dimostrazione si basa sulla **doppia inclusione** degli spazi generati. È sufficiente dimostrare che *una singola* operazione elementare non altera lo spazio delle righe. Se questo è vero, applicando la logica un numero finito di volte (poiché B è ottenuta da A con un numero finito di operazioni), la tesi rimane valida.

Sia B ottenuta da A con una sola operazione.

1. $\mathcal{R}(B) \subseteq \mathcal{R}(A)$ (Come hai scritto tu: $\{b^1, \dots, b^m\} \subseteq L(a^1, \dots, a^m)$).

Dobbiamo mostrare che ogni riga b^k di B è una combinazione lineare delle righe $a^1, \dots, a^m$ di A . Analizziamo le tre operazioni elementari:

- **Scambio** ($R_i \leftrightarrow R_j$): Le righe di B sono le stesse righe di A , solo in ordine diverso. Lo spazio generato è banalmente lo stesso.
- **Prodotto** ($R_i \rightarrow \lambda R_i$, con $\lambda \neq 0$): La nuova riga $b^i = \lambda a^i$. Le altre righe $b^k = a^k$ (per $k \neq i$). Chiaramente, ogni riga di B è C.L. delle righe di A .
- **Combinazione** ($R_i \rightarrow R_i + \lambda R_j$): La nuova riga $b^i = a^i + \lambda a^j$. Le altre righe $b^k = a^k$. Anche in questo caso, ogni riga di B è C.L. delle righe di A .

In ogni caso, ogni riga $b^k \in \mathcal{R}(A)$. Poiché $\mathcal{R}(A)$ è un sottospazio vettoriale (chiuso per combinazioni lineari), qualsiasi C.L. di righe di B (cioè $\mathcal{R}(B)$) è contenuta in $\mathcal{R}(A)$. Abbiamo dimostrato $\mathcal{R}(B) \subseteq \mathcal{R}(A)$.

2. $\mathcal{R}(A) \subseteq \mathcal{R}(B)$ (Come hai scritto tu: $\{a^1, \dots, a^m\} \subseteq L(b^1, \dots, b^m)$).

Il punto cruciale è che ogni operazione elementare di riga è **invertibile** con un'altra operazione elementare:

- L'inversa di $R_i \leftrightarrow R_j$ è $R_i \leftrightarrow R_j$.
- L'inversa di $R_i \rightarrow \lambda R_i$ è $R_i \rightarrow \lambda^{-1} R_i$.
- L'inversa di $R_i \rightarrow R_i + \lambda R_j$ è $R_i \rightarrow R_i - \lambda R_j$.

Poiché B è ottenuta da A , possiamo ottenere A da B applicando le operazioni inverse. Per la stessa identica logica del punto 1 (applicata alle matrici $B \rightarrow A$), concludiamo che ogni riga a^k di A è una combinazione lineare delle righe di B . Questo implica $\mathcal{R}(A) \subseteq \mathcal{R}(B)$.

Conclusione: Avendo dimostrato la doppia inclusione $\mathcal{R}(A) \subseteq \mathcal{R}(B)$ e $\mathcal{R}(B) \subseteq \mathcal{R}(A)$, i due sottospazi sono uguali: $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(B)$.

Poiché il rango è la dimensione dello spazio delle righe, $\text{rango}(A) = \dim(\mathcal{R}(A)) = \dim(\mathcal{R}(B)) = \text{rango}(B)$.

10.3 Rango di matrici a gradini

Proposizione: Rango di Matrici a Gradini

Sia $A \in M_{m,n}(K)$ una matrice ridotta a gradini. Il rango di A è uguale al numero di righe non nulle, che è uguale al numero di pivot.

Dimostrazione

Sia p il numero di righe non nulle (e quindi il numero di pivot) della matrice A . Le righe non nulle siano $a^1, \dots, a^p$, mentre le righe $a^{p+1}, \dots, a^m$ sono tutte uguali al vettore nullo $\bar{0}$.

Lo spazio delle righe di A è:

$$\mathcal{R}(A) = L(a^1, \dots, a^p, a^{p+1}, \dots, a^m) = L(a^1, \dots, a^p)$$

(poiché i vettori nulli non contribuiscono allo span).

La tesi $\text{rango}(A) = p$ equivale a dimostrare che l'insieme delle p righe non nulle $\{a^1, \dots, a^p\}$ è **linearmente indipendente**.

Procediamo per induzione sul numero p di pivot.

- **Base ($p = 0$):** Se $p = 0$, la matrice non ha pivot (e non ha righe non nulle). A è la matrice nulla. Lo spazio delle righe è $L(\emptyset) = \{\bar{0}\}$, la cui dimensione è 0. Quindi $\text{rango}(A) = 0$, che è uguale a p . La tesi è vera.
- **Passo induttivo ($p-1 \implies p$):** Supponiamo (Ipotesi Induttiva) che qualsiasi matrice a gradini con $p-1$ pivot abbia rango $p-1$.

Sia ora A una matrice con $p > 0$ pivot. Visualizziamo la sua struttura:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & p_1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & p_2 & \dots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & p_p & \dots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow a^1 \\ \leftarrow a^2 \\ \vdots \\ \leftarrow a^p \\ \leftarrow \bar{0} \\ \vdots \end{array}$$

Come hai suggerito, consideriamo la matrice A' ottenuta da A **cancellando la prima riga** a^1 . La matrice A' è ancora una matrice a gradini, e ha $p-1$ righe non nulle (le righe $a^2, \dots, a^p$).

Per l'ipotesi induttiva, $\text{rango}(A') = p-1$. Questo significa che le sue righe non nulle, l'insieme $S = \{a^2, \dots, a^p\}$, sono linearmente indipendenti.

Ora, come hai notato (l'attenzione!), dobbiamo dimostrare che:

$$a^1 \notin L(a^2, \dots, a^p)$$

(Ecco perché, come hai chiesto): Sia j_1 la colonna in cui si trova il primo pivot p_1 (quello della riga a^1). Per definizione di matrice a gradini, tutte le righe sottostanti hanno uno zero in quella colonna. Quindi: $(a^1)_{j_1} = p_1 \neq 0$, mentre $(a^k)_{j_1} = 0$ per ogni $k = 2, \dots, p$.

Prendiamo una qualsiasi combinazione lineare v delle righe di S :

$$v = \alpha_2 a^2 + \dots + \alpha_p a^p$$

Calcoliamo la componente j_1 di questo vettore v :

$$(v)_{j_1} = \alpha_2 (a^2)_{j_1} + \dots + \alpha_p (a^p)_{j_1} = \alpha_2 \cdot 0 + \dots + \alpha_p \cdot 0 = 0$$

Poiché $(a^1)_{j_1} \neq 0$ mentre $(v)_{j_1} = 0$, è impossibile che $a^1 = v$. Questo dimostra che a^1 non può essere scritto come C.L. delle altre righe non nulle.

(Conclusione): Per un **teorema fondamentale sull'indipendenza lineare**, se abbiamo un insieme L.I. $S = \{a^2, \dots, a^p\}$ e aggiungiamo un vettore a^1 che non appartiene allo span di S , il nuovo insieme $\{a^1\} \cup S = \{a^1, a^2, \dots, a^p\}$ è ancora linearmente indipendente.

Dato che lo spazio delle righe $\mathcal{R}(A)$ è generato da queste p righe linearmente indipendenti, la sua dimensione è p .

$$\text{rango}(A) = \dim(\mathcal{R}(A)) = p$$

Osservazione Definizione di Rango

Sia $A \in M_{m,n}(K)$. Il **rango** di A ($\text{rango}(A)$) è la dimensione dello spazio vettoriale generato dalle sue righe, che (per il Teorema del Rango) è uguale alla dimensione dello spazio vettoriale generato dalle sue colonne.

$$\text{rango}(A) = \dim(L(a^1, \dots, a^m)) = \dim(L(a_1, \dots, a_n))$$

In altre parole, il rango è:

- il massimo numero di **righe** linearmente indipendenti;
- (ed è uguale a) il massimo numero di **colonne** linearmente indipendenti.

10.4 Teorema di Rouché Capelli

Teorema (di Rouché-Capelli)

Sia Σ un sistema di equazioni lineari $Ax = b$, con $A \in M_{m,n}(K)$ (m equazioni in n incognite). Sia $C = (A|b)$ la matrice completa associata al sistema.

Il sistema Σ è **compatibile**

$$\iff$$

il rango della matrice incompleta è uguale al rango della matrice completa:

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(C)$$

Dimostrazione

Sia $C = (A|b)$ la matrice completa. Applichiamo l'algoritmo di riduzione a gradini (Gauss) alla matrice C per ottenere la sua forma ridotta $C' = (A'|b')$.

Ricordiamo due fatti fondamentali:

1. Le operazioni elementari di riga non alterano il rango:

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(A') \quad \text{e} \quad \text{rango}(C) = \text{rango}(C')$$

2. Il sistema originale $Ax = b$ ha le stesse soluzioni del sistema ridotto $A'x = b'$.

Il sistema Σ (e quindi $A'x = b'$) è **incompatibile** se e solo se, nella matrice ridotta C' , esiste una riga i che corrisponde a un'equazione assurda, del tipo:

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = \beta_i \quad \text{con } \beta_i \neq 0$$

Questo significa che, in C' , esiste una riga i la cui parte in A' è tutta nulla, ma il cui termine noto β_i non è nullo:

$$(0, 0, \dots, 0 \mid \beta_i \neq 0)$$

Questa riga ha un **pivot** nella colonna dei termini noti (l'ultima colonna).

Analizziamo i ranghi:

- Se Σ è **incompatibile**: Esiste quel pivot nell'ultima colonna di C' . Le righe non nulle di A' (il cui numero è $\text{rango}(A')$) non hanno quel pivot. Di conseguenza, C' ha più pivot di A' . Questo implica $\text{rango}(C') > \text{rango}(A')$, e quindi:

$$\text{rango}(C) > \text{rango}(A)$$

(Nota: non può essere $\text{rango}(C) < \text{rango}(A)$ perché A è una sottomatrice di C).

- Se Σ è **compatibile**: Non esistono righe del tipo $(0, \dots, 0 \mid \beta_i \neq 0)$. Questo significa che gli unici pivot di C' si trovano tutti nella parte sinistra, cioè nella matrice A' . Le righe non nulle di A' e di C' coincidono. Quindi $\text{rango}(C') = \text{rango}(A')$, e di conseguenza:

$$\text{rango}(C) = \text{rango}(A)$$

Abbiamo dimostrato entrambe le implicazioni.

Teorema (Rappresentazione Cartesiana di un Sottospazio)

Sia $W \subseteq K^n$ un sottospazio vettoriale con $\dim(W) = h$.

Allora esiste un sistema lineare omogeneo $\Sigma_0 : Ax = \bar{0}$ composto da $n - h$ equazioni in n incognite, con $\text{rango}(A) = n - h$, tale che l'insieme delle sue soluzioni S_0 coincida con W .

$$S_0 = W$$

Dimostrazione

Sia $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_h\}$ una base di W .

Scriviamo le componenti dei vettori della base (rispetto alla base canonica di K^n) come colonne:

$$w_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad w_h = \begin{pmatrix} a_{1h} \\ a_{2h} \\ \vdots \\ a_{nh} \end{pmatrix}$$

Sia $A = (w_1 | \dots | w_h)$ la matrice $n \times h$ che ha questi vettori come colonne. Poiché sono una base, $\text{rango}(A) = h$.

Un generico vettore $x = (x_1, \dots, x_n)^t$ appartiene a W se e solo se è combinazione lineare di $w_1, \dots, w_h$.

Come hai scritto tu, costruiamo la matrice C (orlata) accostando x alle colonne di A :

$$C = (A|x) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1h} & x_1 \\ a_{21} & \dots & a_{2h} & x_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nh} & x_n \end{pmatrix}$$

Per il Teorema di Rouché-Capelli (visto come test di appartenenza), $x \in W$ se e solo se:

$$\text{rango}(C) = \text{rango}(A)$$

Poiché $\text{rango}(A) = h$, la condizione è:

$$x \in W \iff \text{rango}(C) = h$$