Д/з правила техники безоп. с едкими ср-вами и характерист. их ф-в.

Проведение ПСО:

1) замена загрязненной в моющем растворе при температуре 50 с° экспоз. 15 мин

2) Ополаскивание в моющем растворе каждого предмета 30 сек, промывая под проточной водой

3) полоскание в дистиллированной воде

4) просушивание, на полотенце или в сушильном шкафу при темп 80

Книжка дезинфекции
ПБ) с дезинфицирующими ср-вами

С дез ср-вами ~~имеют~~ работать имеют право только 18+, при отсутствии противопоказаний и выполнении этой работы ~~не~~ не ~~ре~~ред. предвар осмотра. В последующем сотрудники проходят ~~пер~~ ежегодный медосмотр.

Оформляется на работу сотрудник прошедший инструктаж по ПБ при работе с дезинфицирующими. ~~Работник~~ заносится в журнале проведения инструктажей. На работе место-ство. работодатель обучает ПБ и принципам оказ. перв. мед. помощи ~~при~~ в случ. отравл. химикатами.

Хранение и прием дез ср-в, перевод в отдельном и хорошо проветр. помещ. Дез ср-ва

хранятся в орг. упаковках с
и этикетками в сух. темном месте
для приг. исп. эмалиров., стекл.,
пласт емкости для разведения
фару хранят с плотно закрытыми
крышками, на ногор., разворач. уна
пахание, концентрац. дез. ср-ва
дату приготовл. раствора, ФИО ори-
готовившего сотрудника.

Для работы с дез ср-вами необход.
иметь, индивидр. больш под имеющ.
Во время приг растворов обяз
исполь индивид. ср-ва защиты
1) Рез перч.
2) маску или респ.
3) Защитн очки

При работе с жидкостями
нельзя допуск их попад на кожу,
слизь, поэтому запрещ. при

раб спецодежду. чтобы есть инструкция
По заверш работы сотр. сдает
спецодежду в спец. отвод место,
хранение и стирка в домашних. усл.
недопустимо.

Затем обед моют открытые
участки тела водой, и при необ-
ход. наносят увлажн. крем.

Характеристика ср-в

Выбор ср-в зависит от конкр.
ситуации, а также от предполагаемого спектра
антимикробной активности.

1) Ср-ва на основе спиртов
(этанол, изопропанол)
Основ. исп. для обраб. небольших
поверхностей, а также для обработки
рук персонала в ЛПО (мед орг.)
и быту

2) Ср-ва на основе активн. форм кислорода (перокисды)

Препараты на осн. перекис. водор. (H_2O_2), надуксусной кислоты (ПФУК)

Широко исп. для дезинф. и стерилизации мед. изделий, а также для обеззараж. помещ. и оборудов., в т.ч. мед. приборов.

Имеют широкий спектр действия, спорицидную активность (при опред. концентрац. и режимах)

3) Хлорсодержащие

Ср-ва на осн. гипохлорита натрия, или пальцы, хлорамины.

Класс ср-в для обеззараж. поверхн.

а) санитарно-техн. оборуд., систем водоснабж., а также для обеззараж. выделений

Высок. эффект прот. вирусов.

микроорг., вызыв. множ. бактер. и туберкулеза, и бактериальные св. в требуют высок. соблюдения мер безопасн. ч-ка порозовлной активности введением жидк.

4) Соединения на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС)

Это катионные поверхностно активные вещества (ПАВ). Исп. для обраб. объект внешн. среды, прибор. в теплу. и генер. удобрен. МВ, не обладают коммун-ват нарнет.

5) Обладают широким спектром. действ. низкой токсичн., но требуют более длит. время экспозиции

а) Состав на сен. гуанидинов

Наим. гексаметилен бигуанид (ПГМБ) и его производные

Исп. для дезинф. поверхн. в лат. антисептиков, а также для обработки. Долг остаточ. действие, хорош. переносимость

б) Водорастворим. сод в осн. прим в кач. антисепт. для обраб кожи, рук. и мелкого инструментария

Ключ. причины при раб с ДС:

1) сохранение цвета
2) содерж полиэкрана
3) время экспозиции выдерж
4) учет условий применен.
5) Безопасность и удобство