Микрофлора рук.

Резидентная - нормальная это микроорганизмы постоянно живущие и размножающиеся

Транзиторная - не колонизирующаяся микрофлора, приобрет. мед. персоналом в процессе работы, в результ. контакта с инф. объектами окруж. среды

1) Патогенная микрофл. - микрофлора вызыв. клинич. выраж. заболев. у здоровых людей

2) Усл. патогенная - микрофлора вызыв. заболев. только в присутств. специфического предрасполагающего фактора

3) Микробы аппортунисты – приспособленцы – это флора вызыв. генерализированные заболевания только у больных с выраж. сниж иммунитета

Транзитори. микрофлора представл. преимуществ. микроорг. наход. во внешней среде и опасны в эпидемиологическом отношении. (сальмонеллы, ротовирусы, шигеллы, вирусы гепатита А. и т.д)

Усл. патогенные (Грам полож) стафилококки и эпидермальный

Грам – кишечная палочка, клебсиеллы и т.д.

Грибы – кандиды (кандидоз)

Транзит. микроф. сохраняется на руках не более 24 часов и может быть удалена путем обычного мытья рук и обработке антисептиком

Наиболее загрязн. участки кожи рук:

1) подногтевое пространство
2) около ногтевые валики
3) подушечки пальцев

Наиболее сложно промываемые участки рук.:

1) подногтевое простр.
2) межпальцевые промежутк.
3) выемка большого пальца

Уровни

Уровни деконтаминации дезинф. рук.

1) Гигиенич. обраб рук. – удал. загрязнений, удаление/уничтожение транзиторной микрофлоры

1 способ – кожным антисептиком проводим:

а) перед непоср. контактом с пац. перед надев. стерильных перч. и после снятия перчаток.

б) При постановке центрального внутрисосудистого катетера при постановке мочевых катетеров или других ~~со~~ инвазивных устройств если эти манипуляц. треб. хирург. вмеш.

1) ~~После~~ После контакта с неповрежденной кожей пац., измер. пульса, артер. давл., перемещ пац.

при конт с мед оборуд или
предм. наход. вблизи с пац

2) гигиенич. мытье с мылом
и водой примен. для удал
загрязн и сниж кол-ва микро

Обработка рук хирургов —
удаление/уничтож транзитор.
микрофлоры и сниж числ.
резидентной флоры. ~~Ф~~ Обраб все
кто уч. в опер.

Обработка в 2 эт.

1) мытье с мылом и водой
в теч. 2 мин, высушивание
стер полот/салфеткой
2) Обработка антисепт. (кисти,
запястья, предплечья)
кол-во антисептика указано
в инструкции.

Стерильные перч. ~~высохн~~ надев. сразу после полного высых антисепт на коже рук

! При наруш. целостности перч. и загрязн. кожи рук кровью

1) снять перч., ~~вы~~
2) вымыть руки с мылом и водой
3) тщат. высуш. руки полотенцем (однораз.)
4) обработ. кожи антисепт дважды

Алгоритм при уколе/порезе (про фил. вич. инф.) СанПиН № 3.3686-21

! Санитарно эпидемиологич. по профил. инф болезней VI профилактика ВИЧ инф. ст. № 589.

При аварийной ситуации необход в случ. порезов и уколов немедл. снять перч., вымыть руки с руки с. водой, обраб- 70% спиртом, смазать рану 5% раств. йода, и заклеить место пластырем

При попад крови или других жидкостей на слизистую глаз, носа, рта — обильно промыть водой. При попадании крови или жидк. на халат/одежду: снять одежду и погруз. в дез раств.

При налич риска зараж ВИЧ инф. немедл. надо начать прием антиретровирусных препаратов АРТ, прием должен начинаться в первые 2ч после аварии но не позднее 72ч. Аварийная ситуация должна учитываться в журнале учета аварийных ситуаций при проведении манипуляций (прилож. 14.)