
Основы сестринского дела · лекция 3

Инфекционная безопасность и ИСМП

Цепочка инфекции, контаминация и деконтаминация, факторы передачи, ИСМП/ВБИ, экзогенные и эндогенные механизмы распространения

1. Цепочка инфекции

СУТЬ
Инфекция возникает, только когда сходятся три звена: источник, путь передачи и восприимчивый человек.



Разорвать любое звено — инфекции не будет: дезинфекция, стерилизация, руки, СИЗ, изоляция, вакцинация

Цепочка инфекции: разорви любое звено — и заражения не будет

1. **Источник инфекции** (возбудитель).
2. **Механизм и факторы** (пути передачи возбудителя).
3. **Восприимчивость** организма человека.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Все меры инфекционной безопасности — мытьё рук, дезинфекция, стерилизация — бьют по второму звену: перерезают путь от источника к человеку.

2. Контаминация и деконтаминация

Контаминация — процесс загрязнения или микробного обсеменения любых объектов в ЛПУ.

Деконтаминация — процесс удаления или очистки посторонних микроорганизмов и материалов с обрабатываемой поверхности.

Факторы передачи

- руки медперсонала
- вода
- препараты крови
- пищевые продукты

- предметы ухода за больными
- бельё
- медицинский инструмент и аппаратура

ВАЖНО
Руки персонала стоят в списке первыми: это главный фактор передачи в больнице.

3. ИСМП / ВБИ

СУТЬ
ИСМП — любая инфекция, которую пациент (или сотрудник) получил из-за медпомощи или работы в медорганизации.

ИСМП — инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Старое название — **ВБИ** (внутрибольничная, больничная, внутригоспитальная инфекция).

ИСМП/ВБИ — любое клинически выраженное заболевание микробного происхождения, которое поражает больного в результате его поступления в лечебное учреждение или обращения за медпомощью, **вне зависимости** от появления симптомов во время пребывания в стационаре или после выписки, а также инфекционные заболевания **сотрудников** ЛПУ вследствие их работы в данной организации.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Симптомы могут появиться уже дома после выписки — это всё равно ИСМП, если заразился в больнице.

4. Источники и механизмы распространения

СУТЬ
Экзогенные источники приходят извне, эндогенные — уже есть внутри организма пациента.



Механизмы распространения ИСМП

Экзогенные (занесены в организм извне)	Эндогенные (внутри организма)
1) **Аэрозольный** — воздушно-капельный, воздушно-пылевой	1) **Гематогенный** (с кровью)
2) **Контактный** — через предметы ухода, изделия медназначения, руки персонала	2) **Лимфогенный** (с лимфой)
3) **Фекально-оральный** — пищевой, водный	3) **Контактный**
4) **Артифициальный** (искусственный) — парентеральный путь, через медманипуляции	

ВАЖНО

Артифициальный механизм создаём мы сами — уколами, катетерами, операциями. Поэтому так важна стерильность инструментов.

📌 Что запомнить

- Цепочка инфекции: источник → механизм/факторы передачи → восприимчивый организм.
- Контаминация — загрязнение/микробное обсеменение; деконтаминация — удаление микроорганизмов с поверхности.
- Факторы передачи: руки персонала, вода, препараты крови, пища, предметы ухода, бельё, инструменты и аппаратура.
- ИСМП (ВБИ) — инфекция из-за медпомощи, даже если проявилась после выписки; сюда же — заражение сотрудников на работе.
- Экзогенные механизмы: аэрозольный, контактный, фекально-оральный, артифициальный. Эндогенные: гематогенный, лимфогенный, контактный.

🃏 Вопросы для самопроверки

Три звена цепочки инфекции
Источник, механизм/факторы передачи, восприимчивый организм

Контаминация
Загрязнение или микробное обсеменение объектов в ЛПУ

Деконтаминация
Удаление/очистка посторонних микроорганизмов и материалов с поверхности

Расшифруйте ИСМП
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи

Старое название ИСМП
ВБИ — внутрибольничная инфекция

Артифициальный механизм
Искусственный, парентеральный — через медманипуляции

Эндогенные механизмы
Гематогенный, лимфогенный, контактный

Фекально-оральный механизм — пути
Пищевой, водный