1) $640 \times 480 \times 3 = 921600$



2) пункты „не зависимы".

3) нет инвариантности по сдвигу.

$X \in \mathbb{R}^3$ $\quad \Theta_i \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$

$h_1 = \Theta X$, S_L

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (x_1, x_2, x_0)^T$$

S_L ; S_R.

$\Theta(S X) = S (\Theta X)$.

$\Theta S = S \Theta$ циркулянт.

$$\Theta = \begin{pmatrix} k_0 & k_1 & k_2 \\ k_2 & k_0 & k_1 \\ k_1 & k_2 & k_0 \end{pmatrix}$$

$$(\tilde{\Theta} X)_i = \sum_{j=0}^{2} K_{(j-i) \bmod 3} \cdot X_j = \tilde{\Theta} * X$$

$$h_0^2 (\tilde{\Theta} X)_0 = \sum_{j=0}^{2} K_j X_j$$



0: $K_0\ K_1\ K_2$

1: $K_2\ K_0\ K_1$

$$\tilde{\Theta} = \begin{pmatrix} K_0 & K_1 & K_2 \\ K_2 & K_0 & K_1 \\ K_1 & K_2 & K_0 \end{pmatrix}$$

$\tilde{\Theta}^T * X$

$\sqrt{\sigma(\theta)\ \sigma(x)}$

$X =$

$\tilde{\Theta}_0 =$ 

$\tilde{\Theta}_1 =$ 

$\Theta_2 =$ [7|0|0|0]

$x \in \mathbb{R}^n$ $\quad \Theta =$ K C



$x \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ $\quad \Theta =$ K_1 C K_2



$x \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^z$





conv 2D

Depth wise - conv.



$w-2$

$K(5,5,3,32)$ $w-4$

$$w_1 = w - K_w + 1$$



$$K = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ \vdots & & & \\ k_{n1} & & \cdots & k_{nn} \end{pmatrix}$$



max pooling.
Avg pooling.

n

1) Padding
2) Stride

W, H = X

K_w, K_h K

w', h'

$W' = \lfloor (W - K_W + 2P + 1) / S \rfloor$ если pad.

$W' = \lfloor (W - K_W + 1) / S \rfloor$ если нет pad.

$W = 8. \quad K_W = 3 \quad P = 0. \quad S = 1$

$\lfloor W - K_3 + 1 \rfloor = 6. \quad P = 1$

$8 - 3 + 2 + 1 = 8.$ $\quad P = \lfloor K_W / 2 \rfloor$

$S = 2.$

$(8 - 3 + 2 + 1)/2 = 4.$

---

n

$n \left(\quad \right) = \Theta$

z

$m \cdot z = n.$

$k = m$