

**VERSIÓN PARA DUEÑOS DE MASCOTAS**

# Piojos de los perros

Por [Jennifer E. Thomas](#), DVM, Universidad Estatal de Oklahoma

Revisado en junio de 2018 | Modificado en septiembre de 2024

Los piojos son pequeños insectos no voladores que viven en el pelo o las plumas de animales y personas. Existen dos tipos básicos de piojos. Los piojos mordedores (orden Mallophaga) infestan tanto a aves como a mamíferos. Se alimentan principalmente de restos de piel y secreciones de sus huéspedes. Los piojos hematófagos (orden Anoplura) son parásitos cutáneos exclusivos de mamíferos. Normalmente, los piojos son específicos de cada especie; es decir, no se transmiten fácilmente de una especie animal a otra.

Los piojos hembra pegan sus huevos, llamados liendres, a los pelos del huésped cerca de la piel. El lavado y el lavado habituales no desalojan las liendres. Las liendres son pálidas, translúcidas y de forma casi ovalada. Una vez que las liendres eclosionan, los piojos pasan por etapas ninfales antes de alcanzar la edad adulta. Las ninfas inmaduras se parecen mucho a los piojos adultos, solo que más pequeñas. La mayoría de los piojos tardan entre 3 y 4 semanas en pasar de liendre a adulto con capacidad reproductiva, aunque este período varía según la especie.

Los perros pueden infestarse con tres especies de piojos: *Linognathus setosus* (piojo hematófago), *Trichodectes canis* (piojo mordedor) y *Heterodoxus spiniger* (piojo que se alimenta de sangre). Los perros con mala salud pueden infestarse gravemente. *Heterodoxus spiniger* es poco común

en Norteamérica. *Trichodectes canis* puede servir como hospedador intermediario para [las tenias](#) intestinales .

Las primeras señales de que su perro puede tener piojos incluyen rascarse, morderse y frotarse las zonas infestadas. Un perro con piojos suele tener un pelaje áspero y seco. Si hay muchos piojos, el pelo también puede estar enmarañado. Los piojos chupadores causan pequeñas heridas que pueden infectarse. Generalmente, el diagnóstico se realiza al observar piojos o liendres en la mascota infestada. La separación del pelo suele revelar los piojos. Los piojos masticadores son activos y se pueden ver moviéndose por el pelo. Los piojos chupadores suelen moverse más lentamente. A menudo se encuentran con sus piezas bucales incrustadas en la piel.

Usar un peine de dientes finos para desalojar las liendres es un proceso tedioso que no mata los piojos que han eclosionado. Los perros, gatos y otras mascotas suelen tratarse con productos de aplicación tópica, champús, collares, aerosoles o polvos que matan los piojos. Su veterinario puede recomendar un producto de control adecuado para su mascota e indicarle cómo usarlo.

Los piojos que se desprenden o se desprenden del huésped mueren en pocos días, pero los huevos pueden continuar eclosionando durante 2 a 3 semanas. Por lo tanto, [los tratamientos para el control de piojos](#) deben repetirse de 7 a 10 días después del primer tratamiento. La inspección minuciosa del pelaje de su mascota debe continuar diariamente durante al menos 2 semanas después de ver el último piojo. Asegúrese de recoger con cuidado cualquier piojo (vivo o muerto) que se le haya retirado a su mascota y deséchelo rápidamente en un

### Piojo mordedor o masticador (orden Mallophaga) y piojo chupador de sangre (orden Anoplura)

---


recipiente hermético (como una bolsa de plástico con cierre hermético). Los demás perros que hayan estado en contacto con un perro infestado deben recibir tratamiento para prevenir la propagación de los piojos.

En infestaciones graves de piojos, el perro puede dañarse la piel al rascarse. Las infecciones bacterianas y las heridas por rascado son comunes. Si se presentan estas afecciones, su veterinario podría recetarle un antibiótico u otro medicamento. Su veterinario también tratará cualquier otro problema nutricional o de salud.

Además de eliminar los piojos de su mascota, asegúrese de que no infesten la ropa de cama, el collar, los utensilios de aseo (incluidos cepillos o peines) ni otros objetos similares en su entorno. Lave la ropa de cama con frecuencia con agua caliente y jabón o trátela con un espray adecuado hasta que la infestación esté controlada. Limpiar e inspeccionar cuidadosamente estos objetos puede ayudar a que su mascota siga sintiendo la irritación causada por los piojos.

Los piojos que infestan a perros, gatos y otras mascotas no suelen sentirse atraídos por los humanos. Por lo tanto, si bien se recomienda tener cuidado al tratarlos, los dueños deben comprender que rara vez se contagian de sus mascotas.

**Ver también contenido profesional sobre [piojos](#).**



Biting louse



Blood-sucking louse

