



Soluções - **ACETATOS**: Sucessões e Séries de funções

Exer. 4.17 (a) *Sugestão*: aplique o Critério de Weierstrass.

(b) *Sugestão*: aplique o Teorema 4.12 (1).

Exer. 4.18 (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{16^n x^{2n}}{(2n)!}$ (b) $2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \right)^2$

Exer. 4.19 *Sugestão*: aplique o Critério de Weierstrass: Sendo a série de funções dada $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$, note que

$|f_n(x)| \leq a_n$, considerando: (a) $a_n = \frac{\sqrt{2}}{n^{3/2}}$; (b) $a_n = \frac{\ln 2}{n^2 + 1}$; (c) $a_n = \frac{1}{n^2}$;
(d) $a_n = \frac{(1 + \frac{1}{n})^n}{n^2 + 1}$; (e) $a_n = \frac{1}{n^2}$; (f) $a_n = \frac{1}{n^{5/4}}$.

Exer. 4.34 —

Exer. 4.35 (cf. Soluções do Exer. 1 da Ficha de Exercícios nº 6)

Exer. 4.38 (cf. Soluções do Exer. 2 da Ficha de Exercícios nº 6)

Exer. 4.39 (cf. Soluções do Exer. 3 da Ficha de Exercícios nº 6)

Exer. 4.40 (cf. Soluções do Exer. 4 da Ficha de Exercícios nº 6)

Exer. 4.41 1. (a) $y = c_1 e^{3x} + c_2 x e^{3x} + 2x e^{3x} (\ln x - 1)$, com $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

2. (a) (Solução geral de uma EDO linear homogénea com coeficientes constantes)
 $y = c_1 + c_2 \cos(3x) + c_3 \sin(3x)$, $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$.

2. (b) (Solução geral de uma EDO linear completa com coeficientes constantes)
 $y = c_1 + c_2 \cos(3x) + c_3 \sin(3x) - \frac{1}{15} \sin(3x)$, com $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$.

2. (c) Atendendo à hipótese considerada e ao cálculo da alínea anterior, pelo Princípio de Sobreposição, podemos garantir que uma solução particular da EDO $y''' + 4y' = f(x) + \cos(3x)$ é $y_p = e^{x^2} - \frac{1}{15} \sin(3x)$.

Uma vez que a EDO homogénea associada é a mesma equação da alínea (a), a solução geral da EDO dada é da forma $y = c_1 + c_2 \cos(3x) + c_3 \sin(3x) + e^{x^2} - \frac{1}{15} \sin(3x)$, com $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$.

Exer. 4.42 1. (a) Verdadeira. Por hipótese, a série de potências dada é convergente em $] -3; 3[$. Em particular, a série correspondente a $x = 2$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 2^n$, converge. Logo pela condição necessária de convergência, tem-se que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n 2^n = 0.$$

1. (b) Verdadeira. (cf. Teorema 4.23 - Unicidade de representação em série de potências)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (x-1)^n, \text{ donde se conclui que}$$

$$f^{(n)}(1) = \frac{(-1)^{n+1}}{n} n! = (-1)^{n+1} (n-1)!, \text{ ou seja } f^{(100)}(1) = (-1)^{101} 99! = -99!.$$

2. *Errata:* onde está b , deverá estar n

Domínio de convergência: $D =]-1, 7]$, sendo a série absolutamente convergente para todo o $x \in]-1, 7[$ e simplesmente convergente para $x = 7$.

$$3. f(x) = \frac{x}{1-x^2} = x \cdot \frac{1}{1-x^2} = x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (x^2)^n = x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1}, \text{ com } -1 < x < 1.$$