



FICHA DE EXERCÍCIOS 2  
*Primitivação (Integrais indefinidos)*

**Exercícios propostos**

1. Calcule os seguintes integrais indefinidos:

(a) $\int (3x^2 + 5x + 7) dx$	(b) $\int \sqrt[3]{x} dx$	(c) $\int (x^3 + 1)^2 dx$	(d) $\int \frac{\arctg x}{1 + x^2} dx$
(e) $\int \frac{3x^2}{1 + x^3} dx$	(f) $\int \frac{1}{x^7} dx$	(g) $\int \frac{x + 1}{2 + 4x^2} dx$	(h) $\int 4x^3 \cos x^4 dx$
(i) $\int \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$	(j) $\int \sin x \cos^5 x dx$	(k) $\int \operatorname{tg} x dx$	(l) $\int \frac{\ln x}{x} dx$
(m) $\int e^{\operatorname{tg} x} \sec^2 x dx$	(n) $\int x 7^{x^2} dx$	(o) $\int \sin(\sqrt{2}x) dx$	(p) $\int \frac{x^2 + 1}{x} dx$
(q) $\int \frac{x}{(7 + 5x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$	(r) $\int \frac{x^3}{1 + x^8} dx$	(s) $\int \frac{5x^2}{\sqrt{1 - x^6}} dx$	(t) $\int \frac{1}{x^2 + 7} dx$

2. Determine a primitiva  $F$  para a função  $f(x) = \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}$ , no intervalo  $] -\infty, 0[$ , tal que  $F(-1) = 1$ .

3. Sabendo que a função  $f$  satisfaz a igualdade  $\int f(x) dx = \sin x - x \cos x - \frac{1}{2}x^2 + c$ , com  $c \in \mathbb{R}$ , determinar  $f(\frac{\pi}{4})$ .

4. Seja  $f$  a função de domínio  $\mathbb{R}^+$  tal que  $f(x) = \frac{1}{x^2} + 1$ . Determine a primitiva de  $f$  que se anula em  $x = 2$ .

5. Calcule, usando a técnica de integração por partes, os seguintes integrais indefinidos:

(a) $\int x \cos x dx$	(b) $\int x^2 \cos x dx$	(c) $\int e^{-3x}(2x + 3) dx$	(d) $\int \ln^2 x dx$
(e) $\int e^{2x} \sin(x) dx$	(f) $\int \sin(\ln x) dx$	(g) $\int \arcsen x dx$	(h) $\int x \arcsen x^2 dx$
(i) $\int \arctg x dx$	(j) $\int \arctg \frac{1}{x} dx$	(k) $\int \sqrt{x} \ln x dx$	(l) $\int \sin x \cos x dx$

6. Usando integração quase-imediata e/ou integração por partes, calcule:

(a) $\int \sec^3 x dx$	(b) $\int \frac{\operatorname{tg}^3 x}{\cos^2 x} dx$	(c) $\int \operatorname{tg}^2 x dx$	(d) $\int \cos^2 \theta d\theta$
(e) $\int \sin^2 x dx$	(f) $\int \sin^3 t dt$	(g) $\int \operatorname{tg}^3 x dx$	(h) $\int \sin(3x) + \cos(5x) dx$
(i) $\int \operatorname{tg} x \sec^2 x dx$	(j) $\int \sin^5 x \cos^2 x dx$	(k) $\int \sin^2 x \cos^4 x dx$	(l) $\int \cos x \cos(5x) dx$

7. Calcule os seguintes integrais indefinidos:

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \int \frac{x+2}{x^2+5x-6} dx & \text{(b)} \int \frac{1}{(x-1)(x+1)^3} dx & \text{(c)} \int \frac{1}{x^3+8} dx & \text{(d)} \int \frac{x^4-4x^2+3}{x^2-9} dx \\ \text{(e)} \int \frac{x^3+3x-1}{x^4-4x^2} dx & \text{(f)} \int \frac{x^4}{x^4-1} dx & \text{(g)} \int \frac{1}{x(x^2+1)^2} dx & \text{(h)} \int \frac{x+1}{x^2+4x+5} dx \end{array}$$

8. Calcule, usando a técnica de integração por substituição, os seguintes integrais indefinidos:

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \int x^2 \sqrt{1-x} dx & \text{(b)} \int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[3]{x}} dx & \text{(c)} \int x(2x+5)^{10} dx & \text{(d)} \int \frac{1}{x^2 \sqrt{9-x^2}} dx \\ \text{(e)} \int \frac{1}{x \sqrt{x^2-1}} dx & \text{(f)} \int \frac{1}{x \sqrt{x^2+4}} dx & \text{(g)} \int \sqrt{3-2x^2} dx & \text{(h)} \int \frac{x^2}{\sqrt{1-2x-x^2}} dx \\ \text{(i)} \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2-7}} dx & \text{(j)} \int \frac{1}{\sqrt{2x+3} + \sqrt[3]{(2x+3)^2}} dx & & \end{array}$$

9. Calcule

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \int \frac{x+1}{\sqrt{3-x^2}} dx & \text{(b)} \int \sin^4 x dx & \text{(c)} \int \frac{1}{x^2+2x+5} dx & \text{(d)} \int \frac{1}{\sqrt{2+x^2}} dx \\ \text{(e)} \int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx & \text{(f)} \int \frac{x}{x^2-5x+6} dx & \text{(g)} \int \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} dx & \text{(h)} \int x \sqrt{(1+x^2)^3} dx \\ \text{(i)} \int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx & \text{(j)} \int x \ln x dx & \text{(k)} \int \frac{1+e^x}{e^{2x}+4} dx & \text{(l)} \int x \arctg x dx \\ \text{(m)} \int \frac{\sin x}{(1-\cos x)^3} dx & \text{(n)} \int (2x^2+3) \arctg x dx & \text{(o)} \int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x-3}} dx & \text{(p)} \int \sqrt{1+e^x} dx \\ \text{(q)} \int \frac{1}{\sqrt{e^x-1}} dx & \text{(r)} \int \frac{\sin^3 x}{\sqrt{\cos x}} dx & \text{(s)} \int \frac{\ln x}{x(\ln^2 x+1)} dx & \text{(t)} \int x^3 e^{x^2} dx \\ \text{(u)} \int \frac{2x-1}{(x-2)(x-3)(x+1)} dx & & & \end{array}$$

10. Calcule os seguintes integrais indefinidos:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx & \text{(Miniteste 2, Cálculo I, 09/10)} \\ \text{(b)} \int \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx & \text{(Exame Época Normal, Cálculo I, 09/10)} \\ \text{(c)} \int \frac{3x-1}{x^3+x} dx & \text{(Exame Final, Cálculo I, 10/11)} \\ \text{(d)} \int \frac{1}{e^{2x}+2} dx, \text{ usando a mudança de variável } e^x = t. & \text{(Exame de Recurso, Cálculo I, 12/13)} \end{array}$$

11. Determine a função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = 2$  e  $f''(x) = 12x$ , para todo o  $x \in \mathbb{R}$ .

(Miniteste 2, Cálculo I, 09/10).

12. Determine a função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $f'(x) = \frac{2e^x}{3+e^x}$  e  $f(0) = \ln 4$ .

(Exame Final, Cálculo I, 10/11)

## Exercícios Resolvidos

1. Considere a função  $g$  definida em  $\mathbb{R}^+$  por  $g(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$ .

(a) Determine a família de todas as primitivas de  $g$ .

(b) Indique a primitiva da função  $g$  que se anula para  $x = e$ .

**Resolução:**

$$(a) \int \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \frac{(\ln x)^3}{3} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

(b) Para cada  $c \in \mathbb{R}$ ,  $G(x) = \frac{(\ln x)^3}{3} + c$  é uma primitiva de  $g$ .  
Pretendemos então determinar  $c \in \mathbb{R}$  tal que  $G(e) = 0$ .

$$G(e) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3} + c = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{1}{3}$$

Assim,  $G(x) = \frac{(\ln x)^3}{3} - \frac{1}{3}$  é a primitiva de  $g$  que se anula para  $x = e$ .

2. Calcule  $\int (x+1)\sin x \, dx$ , usando primitivação por partes.

**Resolução:** Fazendo

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sin x & \text{temos} & & f(x) &= -\cos x \\ g(x) &= x+1 & \text{temos} & & g'(x) &= 1 \end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int (x+1)\sin x \, dx &= -(x+1)\cos x + \int \cos x \, dx \\ &= -(x+1)\cos x + \sin x + c, \quad c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

3. Calcule  $\int x\sqrt{x+1} \, dx$

**Resolução:**

Consideremos a substituição  $x+1 = t^2$ , com  $t \geq 0$ . Definindo  $\varphi(t) = t^2 - 1$ ,  $t \geq 0$ , temos que  $\varphi$  é invertível, diferenciável e  $\varphi'(t) = 2t$ . Então

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{x+1} \, dx &= \int (t^2 - 1) \cdot t \cdot 2t \, dt \\ &= \frac{2t^5}{5} - \frac{2t^3}{3} + c. \end{aligned}$$

Atendendo a que  $x+1 = t^2$ , com  $t \geq 0$ , vem que  $t = \sqrt{x+1}$ . Assim,

$$\int x\sqrt{x+1} \, dx = \frac{2(x+1)^2\sqrt{x+1}}{5} - \frac{2(x+1)\sqrt{x+1}}{3} + c, \quad \text{com } c \in \mathbb{R}.$$

4. Calcule  $\int \frac{x+2}{(x-1)^2(x^2+4)} \, dx$

**Resolução:**

O cálculo deste integral indefinido passa por decompor em frações simples a fração

$$\frac{x+2}{(x-1)^2(x^2+4)}$$

Isto é, passa por escrever a dita fração na seguinte forma

$$\frac{x+2}{(x-1)^2(x^2+4)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+4} \quad (*)$$

com  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$  constantes reais a determinar.

Temos então que

$$\frac{x+2}{(x-1)^2(x^2+4)} = \frac{(A+C)x^3 + (-A+B-2C+D)x^2 + (4A+C-2D)x - 4A+4B+D}{(x-1)^2(x^2+4)}$$

donde resulta a igualdade de polinómios

$$x+2 = (A+C)x^3 + (-A+B-2C+D)x^2 + (4A+C-2D)x - 4A+4B+D.$$

Atendendo à condição de igualdade de polinómios resulta que

$$\begin{cases} A+C=0 \\ -A+B-2C+D=0 \\ 4A+C-2D=1 \\ -4A+4B+D=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-\frac{1}{25} \\ B=\frac{15}{25} \\ C=\frac{1}{25} \\ D=-\frac{14}{25} \end{cases}$$

Voltando a (\*), podemos escrever

$$\frac{x+2}{(x-1)^2(x^2+4)} = \frac{-\frac{1}{25}}{x-1} + \frac{\frac{15}{25}}{(x-1)^2} + \frac{\frac{1}{25}x - \frac{14}{25}}{x^2+4}$$

Assim

$$\begin{aligned} \int \frac{x+2}{(x-1)^2(x^2+4)} dx &= -\frac{1}{25} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{15}{25} \int (x-1)^{-2} dx + \frac{1}{25} \int \frac{x-14}{x^2+4} dx \\ &= -\frac{1}{25} \ln|x-1| - \frac{3}{5(x-1)} + \frac{1}{25} \int \frac{x}{x^2+4} dx - \frac{14}{25} \int \frac{1}{x^2+4} dx \\ &= -\frac{1}{25} \ln|x-1| - \frac{3}{5(x-1)} + \frac{1}{50} \ln(x^2+4) - \frac{7}{25} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + c, \quad c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$