

$$\therefore \int_0^T xf(x)dx = \frac{T}{2} \int_0^T f(x)dx.$$

八、(1) $\because f'(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \right] < 0$, $\therefore f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$ 在 $(0, +\infty)$ 上的递减。

$$(2) g'(x) = n(1-x)^{n-1} [1 - (n+1)x], \text{ 在 } (0, 1) \text{ 内, } W = \left\{ \frac{1}{n+1} \right\},$$

而 $g\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}$, $g(0) = g(1) = 0$, 由 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续必有最大值。故

$$\max_{x \in [0, 1]} g(x) = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}. \text{ 由 (1) 知 } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \text{ 单减, 知 } \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} \text{ 单增,}$$

$$\therefore \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{1}{e}, \text{ 从而 } \max_{x \in [0, 1]} g(x) \leq \frac{1}{e}.$$

九、令 $F(x) = f(x) - g(x)$ 。若在 (a, b) 内同一点 x_0 处取到最大值 M , 则 $F(a) = F(x_0) = F(b) = 0$, 由 Roll 定理得证。若在 (a, b) 内不同点取到最大值 M , 不妨设 $f(x_1) = g(x_2) = M$, 则 $F(x_1) = M - g(x_1) > 0$, $F(x_2) = f(x_2) - M < 0$, 由根的存在定理, $\exists x_3 \in (a, b)$, 使得 $F(x_3) = 0$, 因此 $F(a) = F(x_3) = F(b) = 0$, 由 Roll 定理得证。

2013 级试卷

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 隐函数方程 $e^y + xy - e = 0$ 表示的曲线在对应 $x = 0$ 点处的法线方程为 ()。

$$A. y = -\frac{1}{e}x + 1 \quad B. y = \frac{1}{e}x + 1 \quad C. y = -ex + 1 \quad D. y = ex + 1$$

2. 下列反常积分收敛的是 ()

$$A. \int_{-\infty}^0 e^x dx \quad B. \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \quad C. \int_{-\infty}^0 e^{-x} dx \quad D. \int_{-\infty}^0 \cos x dx$$

3. 设 $f(x)$ 满足 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$, 若 $f'(x_0) = 0$, ($x_0 \neq 0$) 则函数

$f(x)$ 在点 x_0 ()

A. 取得极大值 B. 取得极小值 C. 某个邻域内单调增加 D. 某个邻域内单调减少

4. 函数 $y = x + \frac{x}{x^2 - 1}$ 的图象 () .

A. 有水平渐近线和垂直渐近线 B. 有倾斜渐近线和垂直渐近线
C. 无水平渐近线, 无垂直渐近线 D. 无倾斜渐近线, 有垂直渐近线

5. 若 $f(x) = e^x \cos 2x$, 则 $f''(x) - 2f'(x) + 6f(x) = ()$.

A. $e^x \sin 2x$, B. $-e^x \sin 2x$, C. $e^x \cos 2x$, D. $-e^x \cos 2x$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 假设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ($x > 0$), 则 $y = f(x)$ 的图形的拐点坐标为 _____。

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2} + \frac{2}{n} \sqrt{1 + \left(\frac{2}{n}\right)^2} + \cdots + \frac{n}{n} \sqrt{1 + \left(\frac{n}{n}\right)^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 函数 $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{|x|(x^2 - 4)}$ 的第二类间断点是 _____。

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{\tan x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. $\int_{-1}^1 \frac{(\arctan x)^2 + \sin x}{1+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、试解下列各题 (每小题 7 分, 共 35 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \ln(1+x^2)}$

2. 设 $y = \sqrt{x + \sqrt{x}} + e^{\arctan x^2} + x^x$ ($x > 0$), 求 dy .

3. 求函数 $f(x) = xe^x$ 的具有拉格朗日型余项的 n 阶麦克劳林公式.

4. 求 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx$.

5. 求 $\int \cos(\ln x) dx$.


四、(5 分) 证明不等式: $\frac{\arctan x}{\ln(1+x)} < 1+x$ ($x > 0$).

五、(6 分) 讨论方程 $\int_{\frac{\pi}{2}}^x \sin^5 t dt + \int_x^{\pi} \cos^5 t dt = 0$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 内实根的个数.

六、(6 分) 设函数 $f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$, 其中 a, b, c 为实常数, 且

$c = b + \sqrt{3} = a + 2\sqrt{3}$, 求函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, c]$ 上的最大值与最小值.

七、(6分) 已知抛物线 $y = x(x-1)$ 与直线 $y = 0, x = c, (c > 1)$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积恰好等于直角三角形 OCP 绕 x 轴旋转一周所得锥体的体积, 求 c 的值.(如图所示)



八、(6分) 设 $f(x)$ 在 $[0, c]$ 上连续, 在 $(0, c)$ 内可导,

$f(0) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (0, c)$,

使得 $f(c) = (1 + \xi)f'(\xi)\ln(1 + c)$ 。

九、(6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

$f(a) = f(b) = 0$, 证明: $\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx$ 。

2013 级参考解答

一、DABBC 二、1. $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4}\right)$; 2. $\frac{1}{3}\left(2^{\frac{3}{2}} - 1\right)$; 3. $x = -2$; 4. 1; 5. $\frac{\pi^3}{96}$ 。

三、1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \ln(1 + x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{6}$

2. $dy = \frac{1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{x} + \sqrt{x}} + e^{\arctan x^2} \left[\frac{2x}{1 + x^4} + x^x (\ln x + 1) \right] dx$

3. $f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{(k-1)!} + \frac{(\theta x + n + 1)e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}$

4. $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx = \int_{x=\tan t}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec t}{\tan^2 t} dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt = -\frac{1}{\sin t} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \sqrt{2} - \frac{2}{3}\sqrt{3}$

5. $\int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx$

$\therefore \int \cos(\ln x) dx = \frac{x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)}{2} + C$

四、 $F(x) = (1+x)\ln(1+x) - \arctan x$,

$F'(x) = \ln(1+x) + \frac{x^2}{1+x^2} > 0, F(x) > F(0) = 0$

五、 $F(x) = \int_{\frac{\pi}{2}}^x \sin^5 t dt + \int_x^{\pi} \cos^5 t dt$,

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^5 t dt < 0, F(\pi) = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^5 t dt > 0,$$

$$\exists \xi \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right), F(\xi) = 0, F'(x) = \sin^5 x - \cos^5 x > 0, x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \text{ 实根个数为 } 1.$$

$$\text{六、 } f(x) = (x-b-\sqrt{3})(x-b)(x-b+\sqrt{3}) = (x-b)^3 - 3(x-b),$$

$$f'(x) = 3(x-b)^2 - 3, f'(x) = 0 \Rightarrow x = b \pm 1, f(a) = f(c) = 0, f(b \pm 1) = \mp 2,$$

$$m = -2, M = 2$$

$$\text{七、 } V_1 = \pi \int_0^c x^2(x-1)^2 dx = \pi \left(\frac{1}{5}c^5 - \frac{1}{2}c^4 + \frac{1}{3}c^3 \right), \quad V_2 = \frac{\pi}{3}c^3(c-1)^2,$$

$$V_1 = V_2 \Rightarrow c = \frac{5}{4}$$

八、 $f(x), \ln(1+x)$ 符合柯西中值定理条件, 由柯西中值定理:

$$\frac{f(c)}{\ln(1+c)} = \frac{f'(\xi)}{\frac{1}{1+\xi}}, f(c) = (1+\xi)f'(\xi)\ln(1+c)$$

$$\text{九、 } \forall x \in [a, b], f(x) - f(a) = \int_a^x f'(x) dx \Rightarrow |f(x)| \leq \int_a^x |f'(x)| dx,$$

$$f(x) - f(b) = \int_x^b f'(x) dx \Rightarrow |f(x)| \leq \int_x^b |f'(x)| dx.$$

$$|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx, \quad \therefore \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx$$

2014 级试卷

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(-x)} = -2$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 ().

$$A. y = -\frac{1}{2}x; \quad B. y = \frac{1}{2}x; \quad C. y = -2x; \quad D. y = 2x.$$

2. 已知 $\frac{1}{1-x} = ax^2 + bx + c + o(x^2), (x \rightarrow 0)$, 其中 a, b, c 为常数, 则 ().

$$A. abc = 1; \quad B. abc = 2; \quad C. abc = 3; \quad D. abc = 4.$$

3. 设圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 所围成图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体, 则体积为 ()